





3 2044 106 451 230

FL 3
497
EL 2

154





207.35.4

W. JUNK
VERLAG, BUCHHANDL.
NATURWISSEN, MATHEMAT.
BERLIN W. 15

Johann
F. J. J. J. J.



JOAN. SIGISM.
ELSHOLTII
FLORA
MARCHICA,

Sive,

CATALOGUS PLANTARUM,
Quæ partim in hortis Electora-
libus Marchiæ Brandenburgicæ
primariis, Berolinensi, Aurangibur-
gico, & Potsdamensi excoluntur:
partim sua sponte passim
proveniunt.



h **BEROLINI,**

Ex officina Rungiana.

Sumptibus Danielis Reichelii, Bibliop.

clb lbc LXIII.

ARBOR ETUM

HARVARD

UNIVERSITY

Feb. 1908
17743

*Just. Lipsius lib. 1. De milit. Roman.
Dial. 1.*

Ut in vere anni flores gignuntur, au-
tumnus tamen est, qui dat fru-
ctus: sic literati in florida ætate
amœniora dant, in senili utili-
ora.

Nobil.

Excellentiss. & Experientissimis

Marchionatus Electoralis Bran-
denburgici

MEDICIS,

Itemq; aliis Rei Herbariæ peritis,
Collegis, Fautoribus, Amicis


FLORAM MARCHICAM,

Observantiæ tesseram offert, atq;
ad liberalem communicationem, si quas
præterea stirpes vernaculas propria observatio
suppeditavit, ipsos peramanter
invitat

A U C T O R.

In Floram Marchicam
Cl. V. JOANNIS SIGISMUNDI
ELSHOLTII,

Philos. atq; Medic. Doct. Sereniss. Elector.
Brandenburg. Medici Ordinarii, Hortorumq;
Electoralium Præfecti, & Practici apud Be-
rolinenfes celeberrimi.

 *Nter Naturam varium certamen, &
Artem,
Vertitur, & dubio pondere nutat ho-
nos.*

*Una per immensum spargit miracula Mundum,
Et serit in multis ad dita dona locis:*

*Altera constringit. Spatio densantur in arcto
Munera, conveniunt germina sylva coit.*

Quid mirum est Asiam latis florescere campis,

Quid nos Europæ pulchra vireta movent?

*Quid nova pars terræ proprias tenet avia plan-
tas,*

Quid sibi præscriptos Africa laudat agros?

Omnia qui jugit, qui Sole reponit in uno,

Cui Patriæ tellus, humor & aura favet,

Vicerit. Huic alius concluditur Orbis in Orbe,

Zonaq; disjunctas perficit una plagas.

In toto mirum non est consistere Mundum,

In spatio mirum est, & brevior libro.

Hamburgi scr.

Michael Kirstenius,

Med. D. & Gymnas. P. P.

IN



IN
FLORAM MARCHICAM
INTRODUCTIO,
De varietate conscribendi plantarū
Catalogos.

S Tirpium, quas Natura parens certis locis profert, indices conficiendi & edendi ratio quanquam Antiquitatis exemplo forte non penitus destituatur: nostro tamen, & superiori seculo in usum magis tracta videtur. Ea vero cum varia sit, & satis late pateat: si de varietate illa conscribendi plantarum Catalogos hic quædam præfati fuerimus, nec operam nos lufuros, nec ab instituto illud nostro alienum fore arbitramur.

Catalogus origine Græca vox est, & Latinis aut sermonem sonat, aut scripturam, quæ rerum numerum vel ordinem recenset: adeoq; nobis libellum notabit, in quo nomina rerum consignata reperiuntur, sive nuda, sive notis illustrata breviculis. Componere vero catalogos in iis rebus cogimur, quarum numerus major est, quam ut retineri memoria facile possit: unde nomina militum in codicem referri Vegetius jubet, & librorum indices Bibliothecæ exigunt numerosiores. Quod si ulla unquam in re, in herbaria sanè exaratis cata-

logis, ob infinitum fere plantarum numerum, longe maxime opus est.

In istis vero condendis qui defudarunt, aut universale quid moliti fuere, aut via processerunt particulari. Illorum non ita multi extant, nisi velimus exempli loco adducere Hortum medicum & philosophicum Joachimi Camerarii, qui forma catalogi digestus est. Pertinet huc Conradi Gesneri Catalogus plantarum quadrilinguis, & suo modo etiam Davidis Kyberi trilingue rei herbariæ Lexicon. Nuda nomina, sed appositis iconibus, exhibet Botanicum Francofurtanum, itemq; ex magnis operibus desumptæ & seorsim editæ Icones stirpium Leonhardi Fuchsi, Matthiæ de l'Obel sive Lobelii, Jacobi Theodori Tabernæmontani: quibus tamen scriptis vereor ut proprie nomen Catalogi competat. Speciem Indicis præ se fert etiam Botanotheca Guil. Laurembergii, quæ per Classes plantæ digeruntur, itemq; Joan. Bauhini Historiæ plantarum generalis Prodrômus: sicut ausu adhuc feliciore nuper idem tentavit Joan. Jonstonus libro, cui titulus: Notitia Regni Vegetabilis. Universalem vero Herbariorum omnium, quotquot extabant, indicem sive Pinacæ concinnavit, & anno supra millesimum sexcentesimo XXIII. Basileæ Caspar Bauhinus vulgavit: opus sane aureum, & in hoc genere adhuc sine pari, adeo ut per excellentiam Catalogus stirpium universalis merito jure dici debeat.

Par-

Particulares elenchos qui confecere, aut integram mundi partem sibi sumserunt : aut regnum, aut ducatum, aut comitatum aliquem. Exempli loco tametsi commentarios Nicolai Monardes de medicamentis Occidentalis Indiæ, aut Caroli Clusii de plantis Hispanicis, Pannonicis, Austriacis, aut Prosperi Alpini de Plantis Ægypti, aut Guilelmi Pisonis de plantis Brasiliæ, aut Thomæ Hariotti de Insula Virginia, aut Jacobi Cornuti de plantis Canadensibus allegare non liceat : nihilo minus catalogi nomen jure suo merentur Joannis Thalii Sylva Hercynia, Joannis Franci Hortus Lusatiæ, Caspar. Suencfeldii Stirpes Silesiæ, Joannis Lœselii Plantæ Borussiæ : quorum etiam Conradi Gesneri Hortos Germaniæ non absurde refero.

Strictioribus adhuc limitibus industriam suam definire, qui enumerationem stirpium in certaduntaxat regionis parte sive territorio provenientium susceperunt. Ita plantas, quæ circa Basileam sponte nascuntur, peculiari catalogo complexus est Caspar Bauhinus : quæ circa Altorfium Ludovicus Jungerman, & nuperrime Mauritius Hofmannus : quæ circa Gedanum, Nicolaus Oelhafen : quæ circa Brunsvigam, Joannes Chemnitius : quæ circa Cantabrigiam Angliæ, Anonymus : quæ circa Hallam Saxonum, Carolus Schæffer nuper admodum. Stocchornium & Nessum montes in Bernatum ditione Benedictus Aretius de-

scripsit, & stirpes in eis nascentes recensuit. Idem in monte Pilati Lugdunensi describendo præstitit Joannes du Choul montium Lugdunensis agri Præfectus. Baldi vero montis Veronensis plantas Franciscus Calceolarius, ac Joannes Pona pharmacopœi typis publicaverunt. Circa Balneum Bollenſe, quas plantas tellus sponte profert, earum catalogum Joannes Bauhinus dedit: circa thermas autem Hirschbergenses, Casparus Suenfeld, quem paullo ante citavimus.

Hortorum fines omnium strictissimi, qui tamen copia plantarum nec cedunt montibus integris, & angustiam varietate compensant. Cæterum singulorum encomia viretorum, quibus nostra ætate floridum caput Europa superbissime erigit, nunc non persequar: quotusquisque enim, præter Byzantinos Othomannorum, non stupeat Hortos Viennenses Augultiff. Imperatorum: Vaticanos Pontificis, & Cardinalium Romanorum: Parisinos Regis Galliarum: Toletanos & Bruxellenses Regis Hispaniæ: aulicos Principum Electorum, Ducum, & Episcoporum per Germaniam, & speciatim quidem Heidelbergenses, Salisburgenses, atq; nuper Eystetenſes: Mantuanos Ducum Gonzagarum: Parmenses Farnesiorum: Florentinos Mediceorum, atq; alios. Nobis impræſenti ſufficiat illos attigiſſe, qui ob stirpium insignem varietatem possessores suos eo compulerunt, ut nomina ipsarum in indices referrent, ac typorum ope aliis communicarent.

In-

Inter illos superiori seculo PATAVINUS primus emicuit, in gratiam Medicinæ Studioforum anno XXII. Serenissimi Senatus Veneti decreto exstructus. De ipso vero non pigeat audire testimonium Joannes Veslingii in epistola quadam ad Petrum Servium, Jacobi Philippi Tomasini lib. I. Gymnas. Patavin. cap. XXXII. inserta: *Est ille omnium, inquit, quot per Italiae tractus videre licuit, structurâ pulcherrimus, quemq; vel eo magis commendes, quo minus tessellato emblemate, fontium artificio, marinis corallijs, conchyliorumq; crustis, & signorum pompa: sed nativa potius venustate consurgit universus.* Ejus catalogus sub annum clō Ic XCI. Venetiis italico idiomate cum horti areis, auctore Jacobo Antonio Cortuso, prima vice lucem aspexit. Mox in Germania una cum conjectaneis synonymicis plantarum Melchioris Guilandini quarti in ordine Præfecti latine recusatus, atq; auspicio tandem Joan. Veslingii A. clō Ibc XLIII. Cretensibus plantis auctior prodiiit. Cæterum de origine prima horti hujus Antenorei legi dignum est problema XX. Petri Belonii lib. De negl. stirp. cultura.

Messana urbs Siciliae & studiis & mercatura celebris, in usum Medicorum hortum alit longe pulcherrimum, cujus plantas Petr. Castellus Medicinæ ibidem Professor atq; Præfectus indice complexus est, & additis præcipuorum auctorum cognominibus in lucem produxit. Libellus Messanae anno clō Ibc XL. impressus extat.

Anno clb lbc IIX. Joannes Robinus Botanicus Regio hortum Henrici IV. *Parisiensem* cum figuris plantarum ducentis & quatuordecim Lutetiæ exaratum dedit: at vero habetur etiam Catalogus absq; iconibus stirpium illarum, quibus Viridarium Parisiense regium A. clb lbc XXXVI. fuit instructum. Quod si iconum habeatur ratio, cunctorum industriam hac parte superavit Basilius Beslerus, qui singulas Eystetensis Horti plantas in æs ad vivum prorsus delineari, & exemplaria libri nonnulla coloribus ad invidiam elegantibus illustrari, auspicio Ill. Principis Conradi Episcopi Eystetensis curavit, qui ipse ausu hoc & se digna liberalitate gratiâ non tantum omnium iniit, verum etiam Reverendissimo nomini suo gloriæ nunquam intermōituræ decus addidit.

Extat quoque Catalogus horti regii *Warsaviensis* utriusq; tam suburbani, quam qui arci adjacet: simul cum plantis vernaculis. Quin immo temperiem cœli Danici non esse teneris stirpibus adeo inimicam, numerosus nominum apparatus ostendit, quem in Catalogo horti regii *Hafniensis* impressio conspiciere licet. Porro viridario *Oxonienſi* magna Britannia superbit, *Lugdunensi* Batavia: nec minus suo se *Græninga* jactat. Horum trium catalogi typis quoq; habentur exarati, qui nuper in unum collecti fasciculum cum plerisq; præcedentiū, Hafniæ a Simone Paulli publici juris facti sunt. Quin & Ludovicus Jungerman

man cognitione plantarum dum viveret, nemini secundus A. clb lbc XLVI. prælo commisit Catalogum plantarum, quæ in horto Medico & agro *Altorfino* reperiuntur: viridarium *Hessense* in Ducatu Brunsvicensi situm, scripto Germanico in lucem duodecimo abhinc anno Joannes Royer Ducis hortulanus protraxit. Plantas denique Horti Electoralis *Regiomontani* in Borussia Michael Titius, itemq; Horti publici *Amstelodamensis* libello nuperrime edito Hermannus Cornelius recensuit.

Privatorum Horti pauciores extant. Petrus tamen *Hondius* olim edidit libellum Belgicum, cui titulus: *Dapes inemptæ*, in quo viretum suum satis prolixè describit. Ante hos quatuor annos etiam stirpes proprii Horti recensuit Dionysius *Fonquet*, Medicus Parisiensis. Id quod præstitisse dicitur quoque Joan. *Hermannus* Pharmacopœus Bruxellensis. Alii præter enarratos catalogi num prælum senserint, inquirere jam non libet, præcipuos vero per Europam hos esse constat: nec dubium ullum est, quin temporis successu, & usu magis introducto plures sint hinc inde emerfuri.

Emergit sane vel hodie nostra aliquali opera novus & (quod præfiscini dictum sit) inter reliquos quoq; locum sibi vendicaturus stirpium Catalogus. Is autem licet ante paucos annos iussu Serenissimi Electoris FRIDERICI GUILLIEL.

ELMI Domini nostri clementissimi, intra limites unius Horti Berolinensis aulici primum natus fuerit: ex vicinia tamen tantum augmenti paulatim sensit, ut non hortensis amplius, sed provincialis fere nunc videri possit. Nihilominus cum Marchionatus Brandenburgensis finibus arctis haut claudatur, sed latissime pateat: plusculas hinc inde plantas præter jam observatas in locis sylvosis, palustribus, & inaccessis latere credendū est, quas successu temporis aut nos, aut alii facile superaddent: præsertim cum extremas omnes Provinciæ oras necdum simus scrutati, sed meditullium duntaxat, & loca Sedi Electorali proxima.

Ad onomatothesium autem plantarum in hoc Catalogo quod attinet, quotquot negotium ejusmodi exsequendum hætenus subiere, maximam partem transte nimis libero incessisse mihi videntur: dum nomina absque auctore, aut rarissime ipso addito proposuerunt. Unde sæpe numero usu venit, ut quam plantam designent, tantum non intelligatur: multo minus vero, ab aliquone Auctorum antea ea annotata, an ab auctore catalogi primum observata fuerit, clare percipi queat. Accuratus propterea cæteris elaboratus est Messanensis Catalogus, adjecta quoque Botanicorum principum synonyma continens: itemq; Catalogum Joannis Chemnitii, & Joan. Lœselii, tum Mauritiï Hofmanni supra laudati.

Nos sane majoris perspicuitatis ergo haut volandum libere, sed inhærendum vestigiis certi aucto-

ctoris nobis esse existimavimus. Cumq; ita persuasus sim, nostra hac ætate perfectiorem Synopsin illo Casp. Bauhini paulo ante memorato Pinace vix inveniri: hunc mihi unice sequendum delegi. Utor igitur meris nominibus inde depromtis, & adjicio præcipua plantarum cognomina ex Trago, Matthiolo, Lobelio, Dodonæo, Tabernæmontano, Clusio, Beslerio, & interdum aliis, in gratiam illorum, quibus ad manus Pinax non est. Quod si tamen omnino contingat, ut cætera quoq; minorum auctorum synonyma requirantur, tunc pinax ipse adeundus fuerit atq; consulendus.

Adjicio itidem Germanicam stirpium nomenclaturam, quæ ipsa cum incredibili confusione prematur, selegi ex cæteris primarium nomen, idq; unicum plerumq;, & quod homonymia minime omnium laboret: cætera auctoribus, & plebi relinquo. Inserui etiam pauculas stirpes, quæ apud nos habentur, & tamen ab auctore nostro aut revera omissæ sunt, aut omissæ videntur. Neq; enim velim cuiquam persuadere, Casp. Bauhinum nihil ignorasse, aut rem herbariam penes ipsum adeo substituisse, ut summum perfectionis gradum attigerit: quin potius, ne ignaviæ nos posterius nostri accusent, summa ope niti decet, ut subinde aliquid a nobis quoq; conferatur.

Deniq; cum in Catalogo præsentis Hortensis atq; Sylvestris Flora suavi matrimonio coiverint: quo ab excultis spontaneæ dignoscerentur, asterisco has signare volui. Nunc autem Elenchum ipsum subjungimus.

Abi-

PLANTARUM CATALOGUS.



Bies alba sive femina, C.B. Weiße Zanne. Abies, Matth. Lob. Tab. Picea, Dod. Sponte quidem apud nos rarius provenit: rubra vero satis frequens, quam tamen Piceam Bauhinus constituit.

Abrotanum mas augustifolium majus, C.B. Stabwurz / Hebraute. Abrotanum mas, Dod. Matth. Lob. Tab. Eyf. primum, Trag.

Abrotanum campestre, C.B.* Wilde Stabwurz / wilde Hebraute. Ambrosia, Lon. altera, Matth. tertia, Tab. tenuifolia, Lob. Cujus cauliculi rubent, frequentior.

Abrotanum femina foliis teretibus, C.B. Ganz graw Cypressenkraut. Abrotanum femina, Matth. Lob. Tab. Clus. Eyf. Cupressus herba, Cord. Chamæcyparissus Plinii, Trag. Santolina altera, Dod.

Abrotanum femina folijs minus incanis, C.B. Grawlicht Cypressenkraut. Abrotanum secundum, Clus. Polii altera species non ita incana, Column.

Abrotanum femina viridis, C.B. Ganz grün Cypressenkraut. Abrotanum femina Salmantica sexta, Clus.

Absinthium Dioscoridis, C.B.* Wilde Wermuth. Absinthium vulgare, Trag. Fuch. Lob. Tab. Eyf. majus & vulgare, Clus. latifolium, Dod. Ab-

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum, C. B. Garten oder Römisch Wermuth. Absinthium tenuifolium, Dod. Ponticum, Matth. Tab. Ponticum album, Eyft.

Acacia folijs Scorpioidis leguminosa, C. B. Indianische Acacia. Acacia, Dod. vera, Clus. Spina acaciæ Dioscoridis, Lob.

Acanthus sativus vel mollis Vergilij, C. B. Welsch Bärenklaw. Acanthus, Matth. levis, Eyft. verus, Trag. sativus, Dod. Lob. Tab.

Acarna flore luteo patulo, C. B. * Aearne. Aearnæ varietas, Lob. Carlina sylvestris, Tab. sylvestris minor, Dod. sylvestris minor Hispanica, Clus.

Acer montanum candidum, C. B. * Ahorn. Acer major, Dod. Lob. Cam. ep. Platanus, Trag. Fructus huic sunt alati.

Acer campestre & minus, C. B. * Maßholder. Acer, Trag. Lob. minor, Dod. latifolium, Clus. Fructus huic lunulati.

Acetosa pratensis, C. B. * Wild Sauramff. Acetosa, Lon. Oxalis, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Tob. Adest quoq; folijs crispis, quæ Oxalis crispa, Tab.

Acetosa arvensis lanceolata, C. B. * Wild Sauramff mit lanzformigen blettern. Oxalis minor, Matth. minima, Trag. ovina, Tab. tenuifolia sinuata vervecina. Lob.

Acetosa rotundifolia hortensis, C. B. Garten

ten=Sauramiff mit runden blettern. *Oxalis rotunda*, Tab. rotundifolia, Dod. Franca seu Romana, Ger. sativa Franca rotundifolia repens, Lob.

Acetosa Hispanica maxima. Großer Spanischer Sauramiff. *Acetosa Hispanica grandissimis foliis*, Cam

Acetosa Americana, folijs longissimis pediculis donatis, C. B. Sauramiff mit bläsigten samen. *Acetosa vesicaria peregrina*, Eyst.

Aconitum lycoctonum luteum, C. B. & Eyst. Eisenhütlein mit gelben blumen. *Aconitum secundum*, Matth. Tab. lycoctonum majus, Dod. luteum ponticum, Lob.

Aconitum caeruleum seu Napellus primus, C. B. Eisenhütlein mit blawen blumen. *Napellus*, Matth. Dod. arboreus, Eyst. major latifolius & angustifolius, Tab. verus caeruleus, Lob. Adest etiam flore variegato.

Aconitum racemosum, C. B. * Eisenhütlein mit traublicher frucht. *Christophoriana*, Dod. Lob. Clus. Tab. Eyst. cui etiam *Costus niger*.

Aconitum unifolium luteum bulbosum, C. B. Eisenhütlein mit knolliger wurzel. *Aconitum hyemale Belgarum*, Lob. hyemale Ponticum, Eyst. lycoctonum luteum minus, Dod. *Ranunculus cū flore in medio folio radice tuberosa*, Jo. Bauh.

Acorus verus, sive Calamus aromaticus officinarum, C. B. * Calmus. *Acorum*, Tab. Eyst. legitimum, Clus. hisp. *Acorus*, perperam *Calamus aromaticus officinarum*, Matth, Lob.

Aco-

Acorus adulterinus, C. B. * Falscher Calmus/
Gelbe Wasser-Zilie. *Acorum falsum*, Matth. *A-*
corus nostras palustris, Lob. *Iris palustris lutea*,
Tab. *Pseudoiris*, Dod. *Pseudoiris palustris*, Eyst.

Adonis hortensis flore minore atrorubente, C.
B. Brunelle. *Adonis recentiorum*, Lob. *Adoni-*
um, Tab. *Flos Adonis vulgo*, Clus. *Eranthemum*,
Dod. Eyst. Adest etiam flore miniato.

Aethiopis folijs sinuosis, C. B. Mohrenkraut.
Aethiopis, Matth. Dod. Tab. Eyst. sive *Phlomi-*
tis, Lob.

Ageratum folijs serratis, C. B. Leber-Balsam.
Ageratum, Matth. Tab. Eyst. *Septentrionalium*,
Lob. *Eupatorium Mesuz*, Trag. *Balsamita mi-*
nor, Dod.

Alcea vulgaris minor, C. B. * *Alcea* / *Sigmars-*
fraut. *Alcea*, Matth. Tab. *vulgaris*, Dod. Lob.
Clus. Eyst.

Alcea cannabina, C. B. *Alcea* mit hanffblet-
tern. *Alcea fruticans*, Eyst. *fruticosior*, Lob. *fru-*
ticosa cannabino folio, Clus.

Alcea arborescens Syriaca, C. B. Baum-*Al-*
cea / *Ketmia* / *Syrischer Pappelbaum*. *Alcea Syri-*
aca, Eyst. *arborescens*, Cam. *Althæa frutex secun-*
da, Clus. *Ketmia Syrorum*, quibusdam. *Flos co-*
lore variat.

Alcea vesicaria, C. B. & Dod. *Alcea* mit bla-
senblumen. *Alcea Veneta*, Trag. Eyst. *peregrina*,
Tab. *Solisequa*, Lob. *Malva Veneta*, Lon. *Hype-*
coun, Matth.,

Alcea Indica parviflora, C. B. *Alcea* *Bamia*, *Alcea* *Ægyptia*, Clus. *Bamia*, Alpin. Cam. Belli. *Bamia* *Alexandrina*, Cæsalp.

Alcea *Ægyptiaca villosa*, C. B. Mosch *Alcea*. *Bamia* *muschata*, Jo. Veslingii Not. ad Prosp. Alpin. de plant. *Ægypt*. *Abelmosch* *Ægyptiorum*, Ponæ. *Belmuscus* *Honorii Belli*. Semen odore moschum refert.

Alchimilla vulgaris, C. B. * & Clus. *Sinatu*. *Alchimilla*, Trag. Dod. Lob. Tab. Eyst. *Pes leonis*, Fuch. Lon. *Stellaria*, Matth.

Alliaria, C. B. * Matth. Dod. Lob. Tab. *Knoblauchkraut* / *Leuchel*. *Alliaria* & *Thlaspidium cornutum*, Trag. *Alliastrum*, Gesn. hort.

Allium sativum, C. B. & Dod. *Knoblauch*. *Allium*, Trag. Matth. Ruell. Lob. Lon. hortense, Fuch.

Allium sativum alterum, C. B. & Dod. *Schlangen-Knoblauch* / quoniam caput cum summa caulis parte sese contorquet serpentis instar. *Allium Creticum* vel *serpentinum*, Cam. *sativum amphicarpon*, Cord. feritur enim nucleis tam radicis, quam capitis. *Scorodoprasum secundum*, Clus.

Alnus rotundi folia, glutinosa viridis, C. B. * *Else* / *Erle*. *Alnus*, Dod. Matth. Trag. Lob. Tab. *vulgaris*, Clus. *Ligna* foco præbet, & *palos* sub aqua lapidescentes.

Alnus folio incano, C. B. *Wolligt Elsenbaum*.

Al-

Alnus hirsuta, Matth. An *Alnus altera*, Clus. Folia parte adversa glabra & viridia: averfa lanuginosa & albicantia. Ne cum *Aria Theophrasti* confundatur, cavendum.

Alnus nigra baccifera, C.B.* *Saulbaum*/Trag. *Alnus nigra*, Lob. *baccifera*, Tab. *Frangula*, Dod. Matth. *Arbor foetida*, Lon. *Cortex interior corpus* satis violenter evacuat.

Alnus nigra polycarpus, C. B.* *Saulbaum* mit grossen geferbten blettern/*Kreuzbeer*. *Lonic.* An *Alnus nigra baccifera rugosiore folio seu major*, Joh. Bauh. Cæteris auctoribus indicta videtur. Reperi primum in ripa fluvii *Stapeniz* prope oppidum *Prignicense Perleberg*, ubi vulgo *Potscherben* appellabatur.

Aloe vulgaris. C. B. *Alloe*. *Aloë*, Trag. Matth. Dod. Lob. Clus. *Eyst*, communis, Cam. *Græca*, quorundam. Hæc mira extra terram vivacitate vi- ret: unde laquearibus appendi consuevit. In Indiis nata amarescit, & succum notum *seplasiis* sup- peditat: is amaror in nostrate non deprehenditur.

Aloe folio in oblongum aculcum abeunte, C. B. *Americanische Alloe*. *Aloe Americana*, Dod. Clus. Tab. *Eyst*. *Aloe folio mucronato*, Lob. Succus ex ea colligitur, inquit *Camerarius* in horto, facultate cum priore non dissimili. In hortis Electoralibus habentur tres satis grandes, quarum tamē nulla hæctenq floruit: nihilominus cum tempore flores expectamus, freti aliarum exemplis.

Sane creditum haecenus fuit, Aloen Americanam in Europa vix ante centesimum annum flores proferre : unde evenit, ut de ejus flore Botanici Europæi ferè omnes tacuerint. Primus Carolus Clusius in Curis posterior, retulit historiam unius, quæ Avenioni 1599. M. Majo caulem protrudere & florere cæpit, & intra quatuor aut quinque dies ad tringinta palmos pervenit. Post Clusium annotavit similem historiam Petrus Borellus, Centur. I. Observ. I. de Aloe, quæ Monspeli in horto D. Perier Pharmacopœi A. 1647. caulem subito, & quidem cum fragore, strepitu atq; impetu protrusit, una cum floribus in summitate: ita ut triginta circiter palmorum mensuram caulis intra quatuor aut quinque dies acquisierit, inferiore parte femoris crassitiem æquante. Idem Borellus simile quid in urbe Piscenenfi Languedociæ paullo ante contigisse asserit, & quidem in conspectu Regis Ludovici XIII. & Cardinalis Richelii, multorumq; magnatum, ubi intra XXXVI. horas ad XXVIII. palmos excrevit talis Aloe, adeo ut stupendam hanc stirpem à pictore eximio delineari Rex jusserit. Porro verò delata quoq; fuit A. superioris seculi octogesimo tertio in hortum Stutgardiensem Cellissimi Principis VVirtembergici quædam Aloe, quæ sumtis paulatim incremensis tandem A. 1658. simili ratione caulem M. Majo protrudere, & in flores postea expandi cæpit usq; ad Septembrē proximē sequentem. Acquisiverat interea caulis

cras.

crassitiem duum pedum, & quatuor digitorum: altitudinem XXIII. pedum, & IV. digitorum. Emiserat etiam ramos XL. umbella florida ornatos, ita ut singulæ umbellæ, sicut in Icone impressa apparet, ducentis, trecentis aut quadringentis flosculis constarent.

Aloepalustris, C. B. * Wasser Aloe/ Sichelkraut. *Sedum aquatile*, Dod. *Stratiotes* sive *Militaris aizoides*, Lob. Fundo Spreæ fluminis copiose innascitur.

Alsine hederula folio, C. B. * Hünnerbiß mit kleinen Ephemblettern. *Alsine hederacea*, Tab. spuria prior, Dod. *Morsus gallinæ folio hederulæ*, Lob.

Alsine chamadryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus, C. B. * Hünnerbiß mit Gamanderblettern. *Alsine spuria altera*, Dod. foliis trifraginis, Lob. ic. Tab.

Alsine triphylos cærulea, C. B. * Hendelkraut flosculis cæruleis, Trag. *Alsine recta*, Tab. parva recta, Lob. ic.

Alsine altissima nemorum, C. B. * Sehr hoher Hünnerbiß. *Alsine major*, Dod. Tab. maxima, Lob. ic. *Morsus gallinæ* secundum genus, Trag.

Alsine media, C. B. * & Tab. Mittelmässiger Hünnerbiß/ Mewr. *Alsine*, Matth. Lob. Lon. minor, Dod. *Morsus gallinæ* primum genus, Trag.

Alsine minor multicaulis, C. B. * Kleiner

Hünerbiß mit vielen stengeln. *Alfene minor*, Fuchs. Tab. minima, Dod. Lob. Morfus gallinæ quarta species, Trag.

Alfene affinis Androsace dicta major, C. B. Hünerbiß Androsace genant. Androsace altera, Matth. Clus. Tab. annua spuria, Ger.

Alfene Spergula dicta major, C. B. * Hünerbiß Spergula genant. Spergula, Dod. Saginæ Spergula, Lob. icon.

Alfene hirsuta minor, C. B. * Kawer Hünerbiß: Alfene hispida minuta, Thalii.

Althæa Dioscoridis & Plinij, C. B. * Gemeine Zbisch/ Hemisch. Althæa, Matth. Trag. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Eyst. Bysmalva, Ger.

Althæa Theophrasti flore luteo, C. B. Zbisch mit gelben blumen. Althæa luteis floribus, Lob. Malva Theophrasti, Tab. Abutilon Avicennæ, Matth. Eyst.

Amaranthus simplicipanicula, C. B. Tausend- schön der gemeine. Amaranthus, Matth. vulgaris, Tab. spicatus, Eyst. angustifolius simplicispicata panicula, Lob.

Amaranthus maximus, C. B. Tausend- schön der größte. Amaranthus major paniculis rubris, Eyst. major floribus paniculosis. spicatis purpureis, Lob. major flore obsoleti coloris, Dod. Blitum, Matth. majus Peruanum, Clus.

Amaranthus panicula incurva, C. B. Tausend- schön mit gekrümmtem busche. Amaranthus cristata-

status, Eyft. holosericeis sanguineis reticulatis floribus, Lob.

Amaranthus panicula conglomerata, C. B. Tausendschön mit gedrungenem busche. Amaranthus purpureus major, Tab. saturo cocci colore, Dod. purpureus saturo coccineus, Lob.

Amaranthus folio variegato, C. B. Tausendschön mit bunten blettern/ Papagen = Federn. Amaranthus tricolor, Lob. Eyft. Blitum maculosum, & Herba papagalli, Dod.

Amaranthus coccineus. Ganz rother Amaranth. Nimirum caules, & folia, & flores, adeoq; tota stirps eleganter rubet: proditus ipse fuit primum a Joanne Parkesonio Anglo in Theatro Botanico, Londini 1646. edito.

Amygdalus sativa, C. B. Mandelbaum. Amygdalus, Dod. Trag. Tab. Amygdala, Matth. Lob. Eyft. Adsunt tum dulces, tum amaræ.

Amygdalo nana. Zwercfmandelbaum. Elegans hæc est, & ab altera proceritate differt, foliisque angustis: fructu non adeò.

Anagallis phæniceo flore, C. B. * Lichtrohter Gauchel/ Zeisigkraut. Anagallis mas, Matth. Dod. Trag. Fuch. Lon. phœnicea, Tab. phœnicea mas, Lob.

Anagallis cæruleo flore, C. B. Blawer Gauchel. Anagallis foemina, Matth. Dod. Trag. Fuch. Lon. cærulea, Tab. cærulea foemina, Lob. Clus.

Anagallis aquatica major folio subrotundo,

C. B. * Grosse Bachbungen mit rundlichen blettern. *Anagallis aquatica folio maximo*, Thal. Berula, Tab.

Anagallis aquatica minor folio subrotundo, *C. B.* * Kleine Bachbungen mit rundlichen blättern. *Anagallis aquatica sive Becabunga Germanorum*, Lob. Dod. minor prima, Tab.

Anagallis aquatica major folio oblongo, *C. B.* * Grosse Bachbungen mit länglichen blettern. *Berula major*, Tab.

Anagallis aquatica minor folio oblongo, *C. B.* * Kleine Bachbungen mit länglichen blettern. *Anagallis aquatica minor secunda*, Tab.

Anagyris non foetida minor, *C. B.* Baumbo-
nen. *Anagyris minus foetens*, Lob. altera, Matth. Tab. angustifolia, Eyst. Faba inversa, Trag. Lon. Eghelo, Dod.

Androsæmon maximum frutescens, *C. B.* Staudigt Mannsblut. *Androsænum*, Dod. *Clymenum Italarum*, Lob. *Siciliana*, Eyst. *Herba Siciliana*, Tab.

Androsæmon foetidum, *C. B.* Stinckend Mannsblut. *Androsæmon tragodes*, Eyst. minus, Cam. *Tragium*, Ponæ. *Creticum*, Bellon.

Anemone Geranij rotundo folio purpurascens, *C. B.* Anemone/Windrößlein. *Anemone prima*, Dod. papaveracea, Tab. latifolia altera, Clus. hisp. tuberosa bulbocastani radice, Lob.

Anem. latifolia simplici carneo flore, *C. B.* Anemo-

mone hortensis latifolia sexta simplici flore, Clus.

Anemone ænanthes folijs flore violaceo hexaphyllo, C. B. Anemone tertia, Dod. tenuifolia altera, Clus. hisp. angustifolia, Tab. tuberosa radice, Lob. tenuifolia flore purpureo violaceo, Eyst. Adest etiam flore rubro.

Anemone tenuifolia flore amplo atrorubente, C. B. Anemone hortensis tenuifolia 17. simplici flore, Clus. Vulgo, il Ré.

Anemone tenuifolia flore niveo, C. B. Anemone hortensis tenuifolia 13. simplici flore, Clus. qui addit, Constantinopoli primum missam fuisse nomine Galipoli laté.

Anemone tenuifolia flore exalbido majore, C. B. Anemone hortensis tenuifolia decima flore simplici, Clus.

Anemone latifolia maxima versicolor, C. B. Anemone latifolia flore multiplici, Clus. hisp. & pann. Chalcedonica major, Tab. maxima polyanthos Chalcedonica, Lob.

Anemone latifolia Pavo minus polyphylla, C. B. Anemone hortensis latifolia Pavo major 2. Clus. hortensis flore pleno coccineo variegata latifolia, Eyst.

Anemone latifolia flava, C. B. Anemone hortensis latifolia duplo flore flavo, Clus. Eyst.

Anemone tenuifolia multiplex rubra, C. B. Anemone multiplex rubra, Clus. hisp. quarta, Dod. flore multiplicato coccineo, Lob. colore tenuifolia, Eyst.

B 5

ARNOLD Arboretum
HARVARD
UNIVERSITY

Anemone tenuifolia multiplex purpurea, C. B. *Anemone tenuifolia pleno purpureo flore* Caccini, Clus. cur. post.

Anemone sylvestris alba major, C. B. *Anemone pannonica*, Dod. tertia, Matth. flore albo, Lob. Eyft. major alba, Tab.

Anemone nemorosa flore majore, C. B. * *Wald-Anemone*. *Anemone quinta*, Dod. *Ranunculus candidus*, Trag. *nemorosus*, Lob. Tab. *nemorosus albus*, Eyft. *sylvarum*, Clus.

Observandum, præter recensitas hæcenus, plures adhuc in hortis nostris cultas fuisse *Anemonæ* species, quas singulas minutim prosequi, opus foret hominis nimium curiosi, cum teste Carolo Clusio lib. II. Hist. plant. cap. LVII. Natura hic non minus ludat, quam in Tulipis aut Iridibus. Inde factum, ut *Anemonis* quoq; peculiaria inde re nomina Galliarum atque Belgii hortulani tentarint, qualia sunt: *La cour tisane*, *la regardé*, *la regata*, *la ranunculiere*, *Visconte*, *l'arbec*, *Sant Carl/Prinz*, *Albert* & similia, in quibus tamen eruendis aut servandis multum laborare non placuit.

Anethum hortense, C. B. Dille. *Anethomi*, Matth. Dod. Lob. Tab. Trag. Fuchs. & cæterorum.

Angelica sativa C. B. Matth. Trag. Lon. *Angelice*. *Angelica*, Lob. Tab. major, Dod.

Angelica sylvestris major, C. B. * *Wilde Angelice*

licke die grosse. *Angelica sylvestris*, Lob. Tab. Matth. Dod. Trag Fuchf.

Angelica sylvestris minor sive erratica, C. B. * Wilde Angelicke die kleine. *Podagraria*, Lob. Herba Gerhardi, Dod. *Ægopodium*, Tab. *Angelica vitium*, Trag.

Angelica aquatica, C. B. * Wasser Angelicke. *Archangelica*, Lob. Dod. Clus.

Angelica Americana baccifera. Americanische Angelicke. Nota jamdudum fuit horto Lugdunensi Batavo hoc nomine.

Anguria Citrullus dicta, C. B. Citrullen. *Anguria*, Matth. Dod. *Citrullus*, Tab. officinarum, Lob. *Cucumer vel cucumis citrullus*, Fuchf.

Anisum herbarijs, C. B. & reliquis. Anis.

Anonis spinosa flore purpureo, C. B. * Stachelichte Hauhechel / Stallkraut. *Anonis*, Dod. Fuch. *spinosa*, Eyst. *Ononis*, Matth. Tab. hortensis, Lob. *Resta bovis*, Trag.

Anonis spinis carens purpurea, C. B. * Hauhechel ohne stacheln. *Anonis non spinosa*, Eyst. *purpurea*, Tab. mitior prima, Clus.

Anonis non spinosa flore luteo variegato, C. B. Hauhechel mit gelbgestreiften blumen. *Ononis flore luteo variegato mitis*, Eyst.

Antirrhinum majus alterum folio longiore, C. B. Löwenmaul. *Antirrhinum*, Dod. Lob. Tab. secundum, Matth. flore rubro & flore albo, Eyst. Adest utrumq;.

An-

Antirrhinum arvense majus, C. B. * Wild Löwenmaul / Orant. *Antirrhinum primum*, Matth. minus, Tab. minimum, Lob. sylvestre, Dod. Eyft.

Anthyllis maritima Chamaesyca similis, C. B. Meer-Anthyllis. *Anthyllis Valentina*, Clus. Lob. ic. *Peplion* sive *Peplis*, Dod.

Aparine vulgaris, C. B. * Klebekraut. *Aparine*, Matth. Dod. Lob. Fuch. Trag. Lon.

Apium hortense, seu *Petroselinum vulgo*, C. B. Petersilge. *Apium hortense*, Matth. Dod. Lob. sativum, Tab.

Apium vel Petroselinum crispum, C. B. Krause Petersilge. *Apium crispum vel multifolium*, Tab. *Apium hortense crispatum*, Lugd.

Apium hortense latifolium, C. B. Scleri. *Scleri Italicorum*, cujus radice in coena cum oleo sale & pipere frequenter utuntur. Figuram exhibet C. B. in Prodr. & Matth. cum brevi descriptione.

Apium montanum folio ampliore, C. B. * Berg-Petersilge. *Oreoselinum*, Lob. Clus. primum, Tab. sive *Veelgutta*, Dod.

Apium sylvestre lacteo succo turgens, C. B. * Alsnack. *Apium sylvestre*, Dod. *Thysselinum Plinii*, Lob. *Olsenichium*, Cord. hist. *Thalii*, cui etiam *Meum Silesiacum palustre*. In sylvis paludosis circa Arensfelde.

Apium palustre, & *Apium officinarum*, C. B. *
Wass.

Wassermerck oder Eppich. *Apium palustre*, Matth. *Paludapium*, Tab. *Eleoselinum*, Dod. Lob

Apium Macedonicum, C. B. Macedonische Petersilge. *Petroselinum Macedonicum*, Matth. Lob, Dod. Tab.

Aquilegia sylvestris, C. B. * Wilde Aefelen. *Aquileia*, Dod. *Aquilina*, Matth. Lob. Tab. Invenitur flore exiguo caeruleo.

Aquilegia hortensis simplex, C. B. Einfache garten Aefelen. *Aquilina alba*, Tab. *rubra*, Lob. ic. Adest flore albo, carneo, caeruleo, variegato.

Aquilegia hortensis multiplex flore magno, C. B. Gefülte Aefelen mit grossen blumen. *Aquilegia multiplici flore*, Dod. *Aquilina pleno flore*, Clus. *Multiplex*, Tab. Adest flore albo, carneo, caeruleo, violaceo, maculato.

Aquilegia hortensis multiplici flore inverso, C. B. Gefülte Aefelen mit umbgekehrten blumen. *Aquilina nona*, Tab. *pleno inverso flore*, Clus. *hist. plenis multiplicibus floribus*, Lob. ic. *Aquilegia caerulea inverso flore*, Eyst.

Aquilegia flore roseo multiplici, C. B. Gefülte Aefelen mit rosenförmigen blumen. *Aquilina pleno roseo flore*, Clus. *Aquilegia stellata flore purpureo*, Eyst. Adsunt hujus quoq; aliquot varietates.

Ari.

Aristolochia longa vera, C. B. Lange Oster-luzie. *Aristolochia longa*, Dod. Lob. ic. Clus. hist. & hisp.

Aristolochia Clematidis recta, C. B. Steigende Osterluzie. *Aristolochia longa*, Trag. Matth. *longa vulgaris*, Eyft. *Clematidis*, Lob. Tab. Sarra-cennica, Dod.

Artemisia vulgaris major, C. B. Großer Ben-fuß. *Artemisia*, Matth. *vulgaris*, Clus. *latifolia*, Dod. *mater herbarum*, Lob. *rubra* & *alba*, Tab. Adest utraque: *rubra* vero solet vulgo vocari Rothe Bucke.

Artemisia vulgaris minor, C. B. Kleiner Ben-fuß. *Artemisia minor*, Matth.

Arum vulgare non maculatum, C. B. Pfaffenpint ohn flecken / Deutsch Ingwer / Zehrwurz. *Arum*, Tab. *Latifolium*, Eyft. Fuch. *Ari primum* genus, Trag.

Arum maculatum, *maculis candidis vel nigris*, C. B. Fleckig Pfaffenpint. *Arum*, Matth. Eyft. *maculatum*, Tab. *Officinarum*, Lob. *nigricantibus lituris signatum*, Dod.

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo *Colocasia*, C. B. Colocasia. *Arum Ægyptiacum*, Matth. Dod. Lob. *Colocasia*, Clus. Eyft.

Arundo vulgaris, sive phragmites Dioscoridis, C. B. * Gemein Rohr. *Arundo palustris*, Matth. Tab. *Harundo phragmitis*, Dod. *vallatoria*, Lob.

Arun-

Arundo sativa, C.B. Spanisch Rohr. *Arundo*, Matth. domestica, Tab. Italica major, Cam. donax five cypria, Dod. donax sativa, Lob. Intus cava est: non farcta, qualis Indica illa, ex quibus scipiones parant.

Arundo Indica latifolia, C. B. & Tab. Blumen Rohr das rote. *Arundo Indica florida*, Lob. *Canna Indica*, Clus. hisp. *Indica rubra*, Eyft.

Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato, C. B. Blumenrohr das gelbe. *Canna Indica lutea rubris maculis punctata vel flore croceo guttato*, Eyft. Tertia est in Prodro-mo C. B.

Asarum, C.B. ^{*}Haselwurz. *Asarum*, Matth. Dod. Tab. Eyft. *Asarum baccaris five baccatus*, Lob. ic. & Adv. Vulgago, Perpenſa quibusdam.

Asclepias flore albo, C. B. * Schwalbenwurz mit weissen blumen. *Asclepias*, Fuch. Lob. Tab. Vincetoxicum, Matth. Dod. *Hirundinaria*, Trag. Lon.

Asclepias nigro flore, C. B. Schwalbenwurz mit schwarzen blumen. *Asclepias flore nigro*, Tab. Clus. altera flore, nigro, Lob. Vincetoxici altera species, Dod.

Asparagus sativa, C. B. Garten Spargen. *Asparagus*, Matth. Trag. Fuch. *altilis*, Tab. hortensis, Dod. vulgaris, Lob. domesticus, Eyft.

Asparagus sylvestris tenuissimo folio, * C. B. Wilde Spargen. *Asparagus sylvestris*, Matth. Caltor.

Aspe-

Asperula five Rubeola montana odora, C. B. * Meserich/Waldmeister. *Asperula*, Lob. odorata, Dod. Clus. *Hepatica stellata*, Tab. *Matrisylva*, Trag.

Asphodelus albus ramosus mas, C. B. * Aphodil mit ästen. *Asphodelus primus*, Clus. major albus, Eyst.

Asphodelus albus non ramosus, C. B. Aphodil ohn äste. *Asphodelus Matth.* Ruell. Lon. alter, Clus. albus, Dod. Tab. major albus, Lob. *Hastula regia*, Trag.

Asphodelus luteus & flore & radice, C. B. Gelber Aphodil. *Asphodelus luteus*, Dod. luteus minor, Lob. Tab. *Asphodelus foemina five luteus*, Cam. epit. *Hastula regia minor*, Cast.

Asphodelus folijs fistulosis, C. B. Holblättiger Aphodil. *Asphodelus minor*, Clus. Dod. *Phalangium Narbonense*, Tab. *Phalangium Cretæ Salonenfis*, Lob.

Aster luteus angustifolius, C. B. * Gelb Sternkraut. *Aster Conyzoides Gesneri*, Lob.

Aster atticus caeruleus vulgaris, C. B. Blaw Sternkraut das gemeine. *Aster atticus*, Matth. Fuchsl. Lon. primus, Dod. minor flore caeruleo, Eyst. *Caeruleus Italicus five octavus*, Clus. *Italorum purpurascens*, Lob.

Aster atticus caeruleus major. Blaw Sternkraut das grosse. *Aster atticus major flore caeruleo*, Eyst. c. B. ad præcedentem retulit, cum ta-

men

men differentia inter utrumque sit notabilis admodum. Illi nimirum folia acuta & ferrata, huic obtusa & non ferrata: illi flores parvi, huic magni.

Astragalus villosus floribus globosis, C. B. Wirbelkraut. *Astragalus tertius* vel *Monspeliensium*, Clus.

Atriplex hortensis alba sive pallide virens, C. B. Garten Melde. *Atriplex domestica*, Matth. hortensis, Fuch. sativa, Trag. sativa alba, Lob. ic. alba viridis, Lon.

Atriplex hortensio rubra, C. B. & Lon. Rote Garten Melde. *Atriplex hortensis*, Dod. rubra, Tab. sativa, Lob. sativa folio rubicundo, Trag.

Atriplex mori fructu, C. B. Erdbeer Spinat. *Atriplex sylv. baccifera*, Clus. An *Atriplex baccifera Indica*, Hort. Leydens. & *Spinachia fragifera*, G. Viesch. p. 116. Hort. Floridi.

Atriplex sylvestris folio sinuato candicante, C. B. * Waldmelde mit weißglänzenden blettern. *Atriplex sylvestris*, Tab. sylvestris secunda, Matth. vulgator sinuata, Lob.

Atriplex sylvestris altera, C. B. * Kleine Waldmelde. *Atriplex sylvestris*, Fuch. Dod. Lon. sylvestris prima, Matth. agrestis, Trag.

Atriplex sylvestris latifolia, C. B. * Breite Waldmelde. *Atriplex sylvestris tertia*, Matth. sylvestris laceris laciniis, Lob. *Chenopodium primum*, Tab. *Pes anserimus*, Fuch. Dod. Lon.

Atriplex fatida, C. B. * Stinckende Melde.

Atriplex olida, Lob. *canina*, Trag. Lon. *Vulvaria*, Tab. *Garosmuun*, Dod. *Futuariæ* nomen extat apud Lobelium, qui *Adversar.* pag. 97. *ridiculum* affert experimentum.

Avena vulgaris seu alba, C.B. *Weisser oder glatter Haber.* *Avena*, Matth. Fuch. Lon. Tab. *vesca*, Lob.

Avena nigræ, C. B. *Schwarzer Haber.* *Avena altera*, Anguill. *sylvestrior nigra*, Cæsalp. *Bromos*, Amati. *Hæc præcedente vilior.*

Azedaracus, sive arbor fraxini folio flore seruleo, C. B. *Azedarach.* *Pseudosycomorus*, Matth. Tab. Eyst. *Zizypha candida Monspeliensium*, Lob. *Azedarac*, Clus. *Azedarach*, Dod. *An Azedaraeth*, Avicennæ.

Balsamina rotundifolia repens sive mas, C. B. *Balsamkraut mit runden blettern / Momordica.* *Balsamina*, Matth. *cucumerina punicea*, Lob. Tab. *Charantia*, Dod. *Momordica fructu luteo rubescente, & Balsamina mas fructu puniceo*, Eyst.

Balsamina fœmina, C. B. *Balsamkraut mit länglichen blettern.* *Balsamina*, Dod. *fœmina*, Tab. Eyst. *fœmina persicifolia*, Lob. *Balsamine altera*, Trag. Matth.

Balsamina lutea, C. B. * *Wild Balsamkraut.* *Noli me tangere*, Tab. Eyst. *Persicaria siliquosa*, Lob. *Impatiens herba*, Dod. *Hujus siliquæ maturæ si leviter tangantur, semen projiciunt.* *Simile quid*

quid observatur in Cucumere sylv. asinino dicto, in Sio erucæ folio, in Lathyri majori. Herba viva non quidem semine motum simulat, sed folia tacta contrahit: unde à quibusdam itidem Noli me tangere dicitur. At cavendum, ne ex generali illa & promiscua nominis impositione non sequatur stirpium diversarum confusio.

*Barba capra floribus oblongis, C. B. ** Geißbart mit flattrenden blumen. Barba capri, Fuch. capræ, Eyst. caprina altera, Lon. Drymopogon primus, Tab. Ulmaria flore sparso, Hort. Patav.

*Barba capra floribus compactis, C. B. ** Geißbart mit geschlossenen blumen. Barba caprina prima, Lon. Barbicapra, Lob. Regina prati, Dod. Ulmaria, Clus. flore collecto, Hort. Pat.

*Bellis sylvestris caule folioso major, C. B. ** Wilde Maßlieben die grosse. Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Eyst. Bellium majus, Tab.

*Bellis sylvestris media caule carens, C. B. ** Wilde Maßlieben ohn stengel. Bellis media, Matth. Tab. Clus. major sylvestris, Lob.

*Bellis sylvestris minor, C. B. ** Wilde Maßlieben die kleine/ Gänseblumen. Bellis minor, Matth. minor sylvestris, Fuch. Tab. pratensis minor, Adv. Primula veris, Brunf.

Bellis Indica fruticescens. Staudige Maß-
Ca lie

lieben aus Indien. *Bellis Indica maxima frutescens*, Hort. Patav. & Leydens.

Bellis hortensis flore pleno, eoque magno vel parvo, C. B. Garten Maßlieben mit gefüllten blumen groß und klein / weiß / roht / gesprengelt. *Bellis minor*, Matth. *minor hortensis*, Tab. *hortensis multiplici flore*, Lob. *minor flore multiplici albo & rubro*, Eyst.

Bellis lutea folijs profundè incisiss major, C. B.* Maßlieben mit ganz gelben blumen. *Bellis major lutea*, Trag. *Chrysanthemum*, Dod. *segetum*, Lob. *arvense*, Tab.

Berberis dumetorum, C. B. Berberis. *Berberis*, Lob. *vulgaris*, Clus. *Spina acida quarta*, Dod. *Oxyacantha*, Ruell. Trag. Fuch. Eyst. *Oxyacantha Galeni*, Tab. Crespinus, Matth.

Beta communis sive viridis, C. B. Gemeine Bete oder Weißkohl. *Beta agrestis*, Trag. Cum sequenti multum convenit: est tamen inter cæteras vilissima.

Beta alba vel pallescens, quæ Cicla Officinarum, C. B. Weißer Weißkohl. *Beta*, Tab. *candida*, Trag. Fuch. Dod. *alba*, Matth. Lob.

Beta rubra vulgaris, c. B. Rother Weißkohl. *Beta rubra*, Trag. Lon. Dod. *nigra*, Matth. Fuch. *rubra vulgatio*. Lob.

Beta rubra radice rapæ, c. B. Weißrüben / rohte Rüben. *Beta rubra*, Matth. Lob. *rubra Romana*, Dod. *Rapum rubrum*, Fuch. Hæc condita assis apponitur.

Be-

Beta major folijs latissimis, C. B. Grosse weisse Winter-Bete. Hæc hyemem perfert, sicut & antecedens *Beta alba*: viridis vero & rubra hyeme percutat.

Betonica purpurea, C. B. * Braune Betonie. *Betonica*, Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. vulgaris, Clus.

Betonica alba, C. B. & Tab. Weisse Betonie. *Betonica candida*, Lob. Trag. albo flore, Dod. Clus.

Betula, C. B. * Bircke. *Betula*, Matth. Dod. Lob. Tab. & cæteris. Succus ex caudice perforato bibitur verno tempore contra Calculum: materies foco aptissima.

Bistorta major radice minus intorta, C. B. * Natterwurk. *Bistorta*, Matth. Dod. major, Tab. Clus. britannica, Lob. *Serpentaria foemina* & *colubrina*, Fuch.

Bistorta major radice magis intorta, C. B. Sehr gekrümmete Natterwurk. *Bistorta*, Lon. minor, Tab. major, Eyst. *Serpentaria mas* seu *Bistorta*, Fuch.

Blattaria lutea folio longo laciniato, C. B. Mottenkraut mit gelben blumen. *Blattaria*, Matth. Dod. Tab. Lob. flore luteo, Eyst.

Blattaria alba, C. B. Mottenkraut mit weissen blumen. *Blattaria flore albo*, Lob. ic. Eyst. Cam. Adest etiam flore violaceo.

Blitum album majus, C. B. Weisser Meyer der

grosse. *Blitum album*, Matth. majus, Dod. majus album, Lob.

Blitum album minus, C. B. * Weisser Meyer der kleine. *Blitum*, Fuch. Lon. minus, Dod. minus album, Adv.

Blitum rubrum majus C. B. * Roter Meyer der grosse. *Blitum*, Tab. Lob. rubrum, Matth. rubens, Dod.

Blitum rubrum minus, C. B. * Roter Meyer der kleine. *Blitum nigrum*, Frag. rubrum minus, Advers. rubrum supinum, Lob. ic.

Botrys ambrosioides vulgaris, C. B. Traubenkraut. *Botrys*, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst. Patientia Italicorum, Cam.

Botrys ambrosioides Mexicana. Mexicaniſch Traubenkraut.

Brassica alba vel viridis, C. B. Gemein grün Kohl. *Brassica laevis*, Matth. prima, Tab. sativa, Dod. Lob.

Brassica rubra, C. B. Gemein Braun-oder Rott-Kohl. Tab. Lon. Adv.

Brassica simbricata, C. B. & Lob. Krauser Braun-Kohl. *Brassica crispa & nigra*, Dod. tophosa, Tab.

Brassica capitata alba, C. B. Weisser Kopfkohl. *Brassica capitata*, Matth. Tab. Lob. capitata albida, Dod.

Brassica alba capite oblongo non penitus clauso, C. B. Wersich oder Saphorenkohl. *Brassica Sabauda*, Tab. *Sabauda hyberna*, Lob. ic.

Bras-

Brassica capitata rubra, C.B. Dod. Tab. Kohler
oder Branner Kopfffohl.

Brassica gongyloides, C. B. Rübenfohl. *Brassica rapicaulis*, Cam. caule rapum gerens, Dod. Caulorapum, Tab. Lob. ob. Rapa *brassica peregrina*, Lob. ic. Rapum autem figura variat, & est vel rotundum, vel longum.

Brassica cauliflora, c. B. Dod. & Tab. Blumenfohl. *Brassica prolifera florida*, Tab. florida botrytis, Lob. Pompejana aut Cypria, Cam.

Brassica campestris perfoliata flore albo, c. B. * Feldfohl mit weissenblumē. *Brassica capestris prima*, Clus. *sylvestris perfoliata*, Dod. *Perfoliata siliquosa*, Lob. Invenitur quoq; apud nos flore luteo.

Brassica sylvestris folijs integris & hispida, C. B. * Wilder Kohl, Turritis, Lob. vulgator, Clus. Vaccaria, Tab.

Brunella major folio nō dissecto. c. B. * Gottheil. Brunella, Dod. Lob. Prunella, Tab. Officinarum, Eyst. *Consolida minor*, Matth.

Brunella ceruleo magno flore, C. B. * Gottheil mit grossen blauen blumen. *Brunella cærulea magno flore*, Eyst. *Prunella prima & major*, Clus. *An Prunella tertia*, Tab.

Bryonia alba baccis nigris, C. B. * Jaunrübe/wilde Rüben. *Bryonia nigra*, Dod. *Vitis alba baccis nigris*, Cast.

Buglossum latifolium, Bormio, C. B. Borrase. *Buglossum*, Matth. Fuch. *latifolium*,

Lob. vulgare, Clus. hisp. Borrage, Dod. floribus albis, Tab.

Buglossum angustifolium majus, C. B. Grosse Ochsenzunge. *Buglossum angustifolium*, Lob. vulgare, Matth. Tab. Italicum flore cæruleo, Eyst. *Anchusa Alcibiadion*, Dod.

Buglossum sylvestre minus, C. B. * Wilde Ochsenzunge. *Buglossum sylvestre*, Dod. *Echium*, Fuch. *Buglossa sylvestris altera*, Lon.

Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus, C. B. * Wilde Ochsenzunge mit liegenden Stengeln. *Alyssum Germanicum echiodes*, Lob. *Aparine major Plinii*, Tab.

Bupthalmum Dioscoridis, C. B. Ochsenauge. *Bupthalmum*, Matth. Lob. Tab. vulgare, Clus. *Chrysanthemum tenuifolium*, Eyst.

Bursa pastoris major folio sinuato, C. B. * Taschenkraut das grosse. *Bursa pastoris*, Matth. Lob. *Pastoria bursa*, Dod. major, Tab.

Bursa pastoris media, C. B. * Mittel Taschenkraut. *Bursa pastoris minor*, Tab.

Bursa pastoris minor, folijs incisjs, C. B. * Klein Taschenkraut. *Pastoris bursa minor*, Dod. minima, Lob. ic.

Bursa pastoris minor loculo oblongo, C. B. * Taschenkraut mit länglichen schötlein. *Paronychia vulgaris*, Dod. *alsinefolia*, Lob. *Alfne minima*, Tab.

Buxus arborescens, C. B. Hoher Buxbaum.

Bu-

Buxus, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst. vulgaris, Trag.

Buxus arborescens luteis foliorū marginibus.
Bergöldeter Burbaum.

Buxus folijs rotundioribus, C. B. Niedriger Burbaum. *Buxus humilis*, Dod. Chamæpyxos, Trag. Tab. Hac utimur plerumq; ad areolas hortorum muniendas.

Calamintha vulgaris, vel *Officinarum Germanie*, C. B. *Acfermünze/Bergmünze. *Calamintha*, Matth. montana, Dod. montana vulgaris, Tab Lob. Eyst.

Calamintha pulegij odore, sive *Nepeta*, C. B. *Poleyemünze/Nepete. *Calamintha altera*, Matth. arvensis secunda, Tab. *Pulegium sylvestre*, Dod.

Calamintha magno flore, C. B. Acfermünze mit grossen blumen. *Calamintha montana præstantior*, Lob. Tab. Eyst.

Calamintha arvensis verticillata, C. B. *Gewirbelte Acfermünze. *Calamintha arvensis*, Tab. aquatica, Matth. aquatica Belgarum, Lob. *Nepeta agrestis*, Trag.

Caltha vulgaris, C. B. Einfache Ringelblume. *Caltha*, Matth. Fuch. Lon. *Calendula*, Trag. Dod. sativa, Tab. simplici flore, Eyst. *Chrysanthemum*, Lob. Adest flore citrino, & aureo.

Caltha polyanthos major, C. B. Gefülte Ringelblume. *Calendula lutea flore pleno*, Eyst. Adest flore citrino, & flore aureo.

Cal-

Caltha prolifera majoribus floribus, C. B. Ringelblume mit grossen nebenblümlein / oder kleinen. *Calendula prolifera*, Tab. Eyst. *Chrysanthemum proliferum*, Lob. ic.

Caltha prolifera minoribus floribus, C. B. Ringelblume mit kleinen nebenblümlein. *Calendula prolifera* 2. Tab.

Caltha pumila. Zwerg-Ringelblume. *Caltha arvensis*, C. B. & Tab. *Calendula sylvestris minor*, Cæs. circa Monspelium sponte, Gesn. In Italia itidem spontaneam notavimus, foliis acutis: apud nos vero in viretis ex semine propagari capit, quod in Hispania ante hos decem annos legit, & inter alia valde rara ex longinqua peregrinatione redux secum attulit V. Exc. & in plantarum cognitione veratissimus D. D. Christianus Menzelius, Sereniss. Electoris Brandenburg. Archiater, & amicus ob communicationem aliquot stirpium liberalem non sine gratiarum actione hic nominandus.

Caltha palustris flore simplici, C. B. * Einfache Dotterblume. *Caltha palustris*, Dod. Lob. *Populago*, Tab. *Tussilago altera*, Matth. Reperitur apud nos flore majori plerumque, rarius minore.

Caltha palustris flore pleno, C. B. Clus. Volle Dotterblume. *Caltha palustris flore multiplici*, Eyst. *Populago multiflora*, Tab.

Campanula minor rotundifolia vulgaris, C. B.

C. B.* Waldblöcklein. *Campanula minor rotundifolia*, Lob. *sylvestris minima*, Dod. *minor sylvestris flore cæruleo*, Eyst. *minor alpina rotundioribus imis foliis*, Clus. *Rapunculus sylvestris minor*, Tab.

Campanula hortensis folio & flore oblongo, **C. B.** Gartenglöcklein/Marjetten. *Viola Mariana*, Lob. Dod. Tab. Clus. *Medium*, Matth. Eyst. *Adest flore argenteo, cæruleo, & purpureo*.

Campanula vulgaris folijs urticae, vel major & asperior, **C. B.** Glöcklein mit nesselbletiern/rauhe Marjetten. *Cervicaria major*, Dod. Tab. *hortensis*, Eyst. *Trachelium sive Cervicaria*, Lob. *Trachelium vulgare*, Clus. *Colitur flore cæruleo & albo in hortis, flore cæruleo tamen etiam sponte nascentem inter fagos reperi*.

Campanula pratensis flore conglomerato, **C. B.*** Wiesenglöcklein mit zusammen gedrungeenen blumen. *Trachelium minus*, Lob. Clus. *Cervicaria minor*, Tab. *tertia sive minor*, Dod.

Campanula Americana flore albo. Milchglöcklein aus America. Ex America non ita pridem fuit allata, nomine *Trachelii Americani* fl. albo. Radix fibrosa protrudit folia crassa atrovirentia, unciam longa, mediam lata, per marginem leviter serrata: sequitur caulis rotundus, atrovirens, satis crassus, erectus: ipsi ima parte folia frequentia nulla ordine adherent, media & suprema fere nudus est: pediculos tamen

ali

aliquot emittit digitum pene longos, quorum extremitatibus singulis singuli insident flores oblongi, quintuplici plica striati, colore exterius luteo-pallidi. Successu temporis ipsi se pandunt prorsus, & candorem intus niveum ostentant: & quamvis, ut cæteræ Campanulæ, unico folio constent, quin tamen segmentis singuli distinguuntur. Stamina singulis insident terna crassiora, & quina tenuia. Cæterum planta est perennis, & hyeme apud nos reponenda.

Cannabis sativa, C.B. Zahmer Hanff. Cannabis, Matth. Lob. Tab. major, Trag. fœcunda, Dod. mas, quorundam.

Cannabis erratica, C.B. * Wilder Hanff. Cannabis fœmina, Trag. sterilis, Dod. erratica paludosa sylvestris, Lob.

Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo, C.B. Wahre Cappern. Capparis, Matth. Trag. Lon. secunda, Tab. retuso folio, Lob.

Capparis portulacæ folio, C.B. Falsche Cappern. Capparis leguminosa, Lob. Tab. Capparis fabago, Dod. sylvestris sive fabaginea, Cam. ep.

Carduus pratensis latifolius, C.B. * Breitblättrige Wiesendistel. Carduus pratensis, Trag. Lob. ic. Adv. Brassica pratensis, Lon.

Carduus pratensis polycephalus, C.B. * Vielköpffige Wiesendistel. Carduus sextus, in Prodr.

Carduus in avena proveniens, C.B. * Haberdistel. Carduus arvensis, Tab. avenarius, Thal. sylvestris in avena, Trag. Car-

Carduus albis maculis notatus vulgaris, C. B. * Mariendistel. *Carduus Mariæ*, Trag. Fuch. Lon. Marianus, Tab. Leucographus, Dod. lacteus, Matth. Silybum, Lob.

Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris, C. B. Ballendistel. *Carduus sphærocephalus*, Dod. Tab. Eyf. Spina alba altera, Matth. Crocodilium, Lob. obs.

Carduus lanceatus latifolius, C. B. * Speerdistel. *Carduus lanceolatus*, Tab.

Carlina acaulos magno flore, C. B. Eberwurz. *Carlina humilis*, Dod. sessili flore, Cam. herbariorum, Lob. obs. *Chamaeleon albus*, Matth. Clus. Natale solum ipsi Alpes, imprimis Helvetiæ: semen jactum apud nos ægre provenit.

Caryophyllata vulgaris, C. B. * Lob. Clus. Benediktenwurz die gemeine / Negleinwurz. *Caryophyllata*, Matth. Tab. *Garyophyllata*, Trag. Lon.

Caryophyllata aquatica nutante flore, C. B. * Wasser Benediktenwurz. *Caryophyllata palustris*, Tab. montana, Eyf. montana prima, Clus. *Septentrionalium rotundifolia papposo flore*, Lob.

Caryophyllus maximus ruber, C. B. Gar grosse rote Nägelein. *Caryophyllus maximus plenus flore rnbro*, Eyf.

Caryophyllus maximus variegatus, C. B. Gar grosse gesprengelte Nägelein. *Caryophyllus* mul-

multiplex maximus, Tab. multiplex maximus variegatus, Eyft. major ruber & albicans flore pleno, Lob. ic. Adfunt varietates aliquot.

Caryophyllus altilis major, C. B. Grosse Nägelein vielerley farben. *Caryophyllus*, Lob. domesticus, Matth. multiplex, Tab. flore majore, Eyft. *Betonica altilis*, Fuch. Adfunt varietates multæ.

Caryophyllus altilis major flore pleno proliifero. Grosse Nägelein / da eine aus der ander wächst: Schwanger oder Mutter-Nägelein. Ita hunc appellare visum est, cujus flores singuli singulos alios, tanquam matres filias includunt, & tandem quoque protrudunt. Notavi ejus quatuor varietates. Est enim albus, ruber, subruber, punctatus. Numerus foliorum in matribus ad septuaginta, ad viginti in filiabus solet ascendere.

Caryophyllus altilis medius, C. B. Mittel Nägelein unterschiedlicher farben. Adest cum aliquot varietatibus.

Caryophyllus pleno flore minor, C. B. Kleine Nägelein unterschiedlicher farben. *Caryophyllus hortorum multiplex minor*, Lob. ic. Etiam hujus nonnullæ varietates.

Caryophyllus hortensis simplex flore majore, C. B. Einfache Nägelein mit grossen Blumen vielerley farben. *Caryophyllus sylvestris major vulgarior*, Lob. ic. Adest albus, carneus, miniatus, varicolor.

Caryophyllus simplex flore minore pallide rubente, C. B. Einfache Nägelein mit kleinen blaß-roten blumen. *Caryophyllus hortulanus*, Tab. sylvestris tertius flore pallido suaverubente, Lob. ic.

Caryophyllus simplex supinus angustifolius, C. B. Jungfer-Nägelein. *Caryophyllus virginicus*, Tab. Adest colore albo.

Caryophyllus barbatus hortensis latifolius, C. B. Bart Nägelein mit breiten blettern. *Caryophyllus Carthusianorum primus*, Tab. Armeria altera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ic. Flos Armerius albus, ruber, variegatus, Eyft.

Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius, C. B. Bart Nägelein mit schmallen blettern. *Caryophyllus Carthusianorum secundus*, Tab. Armerius flos alter, Dod. Armeria altera suaverubente flore, Lob. ic.

Hactenus Caryophylli hortenses, quibus propria nomina hortulani Belgæ atque Galli imposuerunt. Ea Catalogus Groeningensis ordine elementorum recensuit: Joan. Georgius Krause Augustanus juxta colores digessit: & Exc. D. Leonhardus Ursinus Prof. Lipsiensis Publ. magnitudinem quoq; pictis sex circulis exprimere tentavit: id quod institutum & ad Anemonas, Ranunculos, Narcissos, forte etiam Tulipas, & alias stirpes floreas extendi utiliter posset. Interea autem

dum

dum aliquis digerendi hunc laborem plenius
absolverit, primaria tantum nomina hic subji-
cimus.

Achat Oriental.	Clarabella.
Admiral Colbinger.	Columbin.
Admiral Coman.	Constanzer Mars.
Admiral von Seeland.	Concordia.
Admiral Suche.	Cölnische.
Admiral Tromp.	Demelie.
Alexander Magnus.	Don Cordua.
Altesse.	Diana.
Amarylle.	Englische Flagge.
Amelia.	Englische Morlyon.
Anglese.	Englische Rose.
Argenis.	Flämische Magd.
Belle belle.	Florabella.
Bella Catharina.	Franze Merveille.
Belle Clorinde.	General von Holland.
Bella Helena.	General Wigans.
Belle Madame.	Generalissimus.
Bella Margarita.	Glorieuse.
Belle Princesse.	Graff Floris.
Bella Susanna.	Graff von Holland.
Belmüller.	Graff von Mansfeld.
Belresteau.	Grotius.
Bullion.	Güldenstück.
Buchbinder.	Hannibal.
Cardinal.	Hautvester.
Cedonulli.	Hercules.

Hesse/

Hesse / Großer Hesse.	Massawer.
Holländer.	Neue Jama.
Hugenot.	Neuer Signor.
Jaspis.	Noblesse.
Jacobs-blum.	Orange von Clarmont.
Imperial.	Orange geflammt.
Incarnat.	Orange pantir.
Isabella.	Orange present.
Jubel von Holland.	Pallas.
Jupiter.	Patientia.
Kago.	Perle.
Keyser Cron.	Perlenfarbe.
Koch.	Pers Amelia.
König.	Petit Jean.
Königin.	Philoclea.
Kronbeck.	Piccolomini.
Latrepouze.	Prinz von Conde.
Madame Leonora.	Prinzen-jagt.
Leopoldus.	Princessin.
Lusthoff von Holland.	Purpur Wigans.
Lüttiger.	Puschke Rose.
Mahomet.	Rose.
Marcus Aurelius.	Rosabella.
Mazariini.	Rosa major.
Melander.	Rosalina.
Melville du monde.	Samtroht.
Morlyon vom Haag.	Sarenthaler.
Morlyon Nacre.	Scholler.
Müllerin.	Schöner Absolon.

Schwarz Imperial.	Ulmer Königin.
Scipio Africanus.	Walthen.
Sol.	Weisse Früzeitige.
Steinheimer.	Weisser Graff.
Sylvia.	Weisser Hirsch.
Trauriger Mars.	Weisser König.
Türkischer Kenser.	Weisser Kabe.
Türkische Kenserin.	Weisse Rose.
Venetianer.	Weisser Schwan.
Venus.	Wetterhan.
Viceroy.	Wittenberger.
Victoria.	Zarnetzi.

Caryophyllus sylvestris prolifer, C. B. * & Eyst. Feldnägelein mit nebenblumen. *Caryophyllus sylvestris minimus*, Tab. *Armeria prolifera*, Lob.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius, C. B. * Feldnägelein mit breiten blettern. *Caryophyllus montanus primus*, Tab. minor sylvestris fl. simplici, & fl. pleno, Eyst. *Armerius flos primus*, Dod.

Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B. * Feldnägelein mit schmallen blettern. *Caryophyllus montanus albus*, Tab.

Caryophyllus sylvestris humilis flore unico, C. B. * Feldnägelein mit einer einzeln blume. *Caryophyllus repens humilis minimus vulgarissimus rubellus*, Lob. ic. sylvestris primus, Clus. *Armerius flus tertius*, Dod.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto, C. B. *
 Federnägelein. *Caryophyllus plumarins albus*,
 Tab. sylvestris flore albo picto, Eyst. Superba,
 Trag. *Caryophyllæus minor*, Dod. Provenit flore
 albo, carneo, & purpureo.

Caryophyllus sylvestris alter flore laciniato
odontatissimo, C. B. * Wolriechende Federnä-
 gelein. *Caryophyllus sextus*, Clus. minor alter,
 Dod. sylvestris flore laciniato carneo, Eyst. Su-
 perba Austriaca, Lob. ic.

Caryophyllus pratensis flore laciniato sirapli-
ci, C. B. * Ruckucks Nägelein. *Caryophyllus pra-*
tensis, Tab. Armerius sylvestris, Dod. Flos cucu-
 li, Lon.

Caryophyllus pratensis flore pleno, C. B. Ge-
 fülte Ruckucks-Nägelein. *Odontitis Plinii*, Eyst.
 flore pleno, Clus. Cam.

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore,
 C. B. * Rauhe Hartnägelein. *Caryophyllus holo-*
steus, Lob. ic. *Holostium caryophyllum*, Tab.

Caryophyllus arvensis glaber flore majore,
 C. B. * Glatte Hartnägelein mit grosse blumen. *Ho-*
lostium Ruellii, Lob. *Gramen leucanthemon*,
 Dod. floridum majus, Tab.

Caryophyllus arvensis glaber flore minore,
 C. B. * Glatte Hartnägelein mit kleinen blumen.
Holostii Ruellii diversitas, Lob. ic. *Gramen flori-*
dum minus, Tab.

Caryophyllus montanus major flore globo-

*fo, C. B. ** Grosse Bergnägelein mit kuglicher blume. *Caryophyllus montanus*, Lob. *Armerium montanus tenuifolius major*, Clus. *Gramen polyanthemum majus*, Dod. *marinum majus*, Tab.

*Caryophyllus montanus minor, C. B. ** Kleine Bergnägelein. *Caryophyllus marinus minimus*, Lob. *Armerius montanus tenuifolius minor*, Clus. *Gramen polyanthemum minus*, Dod. *marinum minus*, Tab.

Castanea sativa, C. B. Castanien. *Castanea domestica*, Matth. In eadem arbore crescunt tum grandiores illæ, quas Maronas Itali vocant: tum minores. Seliguntur verò postea à venditoribus, ut majores majore quoque pretio distrahere possint.

Castanea folio multifido, C. B. Roß-Castanien. *Castanea equina*, Matth. Dod. Lob. Clus. Tab.

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu, C. B. * Ackerflette. *Caucalis flore minuto*, Cam.

Caucalis semine aspero flosculis rubentibus, C. B. * Ackerflette mit rothen blumen. Figuram exhibet in Prodr. *Daucoides minor*, Thal.

Centurium majus folio in lacinias plures diviso, C. B. Groß Tausendgülden-fraut. *Centaurium majus*, Lon. Lob. Tab. magnnm, Matth. Dod. *Rhapontica*, quæ hodie *Centaurea major*, Trag.

Centaurium minus, C. B. * Klein Tausend-
gülden-kraut / Erdgalle. *Centaureum minus*,
Matth. Dod. Tab. parvum, Lob.

Cepa vulgaris, C. B. Zwiebel. *Cepa*, Matth.
Fuch. Trag. rotunda, Dod. alba & rubra, Tab.
Lon. Cepe, Lob.

Cepa fissilis, C. B. & Matth. Winter-Zwiebeln.
Circa festum Jacobi semen est maturum, & feri de-
bet sequenti mense Septembri, ut verno tempore
culinæ mature serviant. Fissilis dicitur, quoniam
bulbus parte superiore findi solet.

Cepa sterilis, C. B. Trag. Winter-Zwiebeln
ohn saamen. *Cepa ascalonica*, Matth. ic. Per bul-
bos duntaxat propagatur, cum apud nos semen
non producat. Autumno bulbi terræ mandantur,
pro usu in ver proximū: circa festum Jacobi bulbi
iterum eximuntur & siccantur per mensem, ut de-
nuo terræ committi possint.

Cepæa, C. B. Matth. Lob. Tab. Clus. Cepee.
Adest flosculis albis.

Cerasa acida rubra. Röhle saure Kirschen.
Cerasa sativa rotunda rubra & acida, C. B. *Cerasus*
acida, Matth. Tab. tertia, Dod. *Cerasia*, Lob. aci-
da & vulgaria, Trag.

Cerasa acida nigricantia. Schwarze saure
Kirschen. *Cerasa acidissima sanguineo succo*,
C. B. austera, Matth. *Cerasiorum primum genus*,
Trag. Tardius cæteris fere omnibus maturescunt,
& per maturitatem fiunt obscure rubicunda, Ca-

staniembraun. Confractis nucleis usurpantur pro conficiendo vino cerasino.

Cerasa praeocia. Manfirschen / quoniam prima omnium mense Majo maturescunt. Rubicunda sunt, danturque in hoc genere etiam duplo majora, quæ propterea doppelte Manfirschen appellantur.

Cerasa rhenana. Rheinische Kirschen / & quidem colore tripliciter variante: tota rubra, ganz roht: tota flava, ganz gelb: rubra & media parte flava, halb roht halb, gelb.

Cerasa fertilis Batava. Woltragende Kirschen aus Holland. Hæ arbores alte non exsurgunt, sed copiosissimos fructus quotannis ferunt: fructus puniceus, lichtroht / & satis magnus est.

Cerasa vitrea. Glas Kirschen. *Cerasa carne tenera* & aquosa, C. B. aquea, Matth. Tab.

Cerasa albicantia. Eyer-Kirschen / a colore prorsus albido. *Cerasa alb. dulcia*, C. B. *Cerasia dulcia*, Trag.

Cerasa Hispanica. Spanische Kirschen. *Cerasa lativa majora*, C. B. *Cerasia Hispanica*, Lob. Tab. In hoc genere alia sunt *rotunda*, Runde spanische Kirschen / quæ obscure rubent aut nigricant: alia *angulosa*, Eckigte spanische Kirschen / quæ parte media rubent, altera flavescent. Illorum quædam, etiam evulso pediculo, binas drachmas pondere multum superant.

Cerasa palliata. Mantel Kirschen. Nomen acceperunt, quod fructus majori ex parte non appareant, sed sub foliis, quasi palliolis tecta delitescant. Color ipsis rubicundus sive brunnus, braunroht: ossicula vero exigua.

Cerasa racemosa. Traubel-Kirschen / viel an einem stiel. *Cerasus hortensis racemosa*, c. B. *racemosa*, Matth. uno pediculo plura, Lob. Tab. *Cerasi* quintum genus, Dod.

Cerasa cordata. Herz Kirschen / quoniam cordis figuram referunt. *Cerasa crassa* carne dura, c. B. *Cerasus altera*, Dod. *Cerasa maroba & duracina*, Matth. *Cerasia Pliniana*, Tab. Horum alia *nigricant*, Schwarze Herzkirschen: alia *rubent*, sed intermixta flavedine, Rohle Herzkirschen. In utrisq; , sicut & in cæteris datur quædam ratione magnitudinis differentia. Maxima pendent ~~maxima~~ *sicilianum*.

Cerasa volucrum. Vogel-Kirschen. *Cerasus* major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente, c. B. prior, Dod. *Cerasia nigra*, Tab. Fructus est exiguus, & dulcis, colore duplex. Alia enim sunt *Cerasa volucrum rubra*, Rohle Vogel-Kirschen: alia *nigra*, Schwarze Vogelkirschen: ex quibus Aqua cerasorum nigrorum in Officinis parari solet.

Cerasus hortensis pleno flore, c. B. Kirschen mit gefülter blüht. *Cerasus vulgaris duplici flore*, Lob. multiflora prima, Tab. flore pleno, Eyst.

Cerasus folio laurino, C. B. Lorbeer-Kirschen.
Cerasus Trapezuntina, Bellon. *Laurocerasus*, Clus.

Chamaecerasus dumetorum fructu gemino rubro, C. B. Heckfirschen. *Periclymenum rectum*, Tab. rectum primum, Clus. *Allobroguum*, Lob. *Xylosteum*, Dod. floribus albis vulgatus, Eyst.

Cerinthæ seu Cynoglossum montanum majus, C. B. Cerinthe. *Cerinthæ major*, Lob. Tab. Clus. *Maru herba*, Dod.

Cherophyllum sativum, C. B. Garten-Kerfel. *Cherifolium*, Dod. sativum. *Trag. Cerefolium*, Matth. Lob. Tab. *Gingidium*, Fuch.

Cherophyllum sylvestre, C. B. * Wild Kerfel. *Cerefolium sylvestre*, Tab. *Daucus sepiarius*, Ges. de coll.

Chamaedrys major repens, C. B. * & Dod. Grosser Gamander oder Bathengel. *Chamaedrys*, Lob. major prima & secunda, Tab. *Trissago seu Chamaedrys*, Matth.

Chamaedrys minor repens, C. B. Kleiner Gamander. *Chamaedrys*, Tab. Eyst. vera, *Trag. major*, Lob. ic. repens minor, Dod. vulgaris, Clus.

Chamaedrys spuria major angustifolia, C. B. * Falsch Gamander der grosse. *Chamaedrys sylvestris*, Dod. *Teucrium primum*, Matth. *Teucrii quarti species tertia*, Clus. *Veronica supina facie Teucrii pratensis*, Lob. ic.

Chamaedrys spuria minor rotundifolia, C. B. * Falsch Gamander der kleine. *Chamaedrys sylvestris*,
 stris,

stris, Clus. Teucrium pratense, Advers. tertium minus, Tab. spurium chamædryoides, Lob. ic.

Chamamelum vulgare, C. B. * Gemeine Kamillen. Chamamelum Tab. vulgare, Dod. Leucanthemum, Diosc. Fuch. Anthemis, Matth. Anthemis vulgatioresive Chamæmilla, Lob.

Chamamelum nobile seu odoratus, C. B. Römische Kamillen. Chamamelum Romanum, Tab. Romanum flore simplici, Eyf. Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob. Leucanthemum odoratum, Dod.

Chamamelum nobile flore multiplici, Römische Kamillen mit vollen blumen. Chamamelum Romanum flore multiplici, Tab. Leucanthemum niveum Anglorum flore multiplici, Lob. ic.

Chamamelum inodorum, C. B. * Karohn geruch. Cotula, Tab. non foetida, G. inodora, Adv. Camomilla fatua & quarta, T.

Chamamelum foetidum, C. B. * Stinkende Kamillen. Cotula foetida, Lob. ic. Eyf. Lor. alba, Dod. Parthenium, Tab. Fuch Chamomilla secunda, Trag.

Chamaepitys lutea vulgaris, sive folio trifido, C. B. Schlagkraut. Chamaepitys prima, Matth. Dod. major, Tab. Eyf. Ajuga sive Chamaepitysmas Dioscoridis, Lob.

Chamelea tricoccus, C. B. Seidelbast / Ziland. Chamelæa, Matth. Dod. tricoccus, Lob. Mezerion Arabum tricoccus, Tab.

Ch-

Chelidonium majus vulgare, C. B. * Groß-Schellkraut. *Chelidonium majus*, Matth. Dod. Lob. Tab. vulgare. Clus.

Chelidonia rotundifolia minor, c. B. * Klein-Schellkraut / Schorbucks-kraut. *Chelidonium minus*, Matth. Dod. Tab. Lob. Eyst.

Chondrilla juncea viscosa arvensis, C. B. * Chondrille. *Chondrilla juncea*, Tab. viminalibus virgis, Clus. viminea viscosa vinearum, Lob. ic. Cichorium sylvestre luteum, Dod. Virgis prædita est plerumque sesquicubitalibus.

Chondrilla verrucaria fol. intybaceis viridibus, C. B. Warzen Chondrille. *Cichorium verrucarium*, Matth. Zacintha, Gefn.

Chondrilla folijs laciniatis serratis purpurascete flore, C. B. Crupine. *Chondrilla Hispanica Narbonensis*, Tab. rara purpurante flore semine nitido deciduo, Lob. ic. Crupina, vulgi.

Chondrilla purpurea foetida, C. B. Stinkende Chondrille. *Chondrilla rubra foetida*, Eyst.

Chrysanthemum folijs matricariae, C. B. Ganz gelbe Goldblume. *Chrysanthemum*, Matth. & Chalcitis, Tab. Tinctorius flos quartus, Trag.

Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo, C. B. Halb gelbe und halb weiße Goldblume. *Chrysanthemum creticum mixtum*, Eyst. *Buphthalmi altera species*, Gef. hor.

Cicer sativum, C. B. Kichererbsen. *Cicer*, Matth. Tab.

Tab. fativum, Lob. arietinum, Dod. rubrum & album, Lon.

Cichorium fativum, C. B. Garten Weegwart / Hindleufft. *cichorium domesticum*, Matth. fativū caruleum, Lob. ic. latioris folii, Dod. Seris fativa, Lob. Adest flore caruleo, & flore albo.

Cichorium sylvestre sive Officinarium, c. B. * Wild Weegwart. *cichorium*, Tab. sylvestre, Dod. *cichorea sylvestris*, Matth. Seris sylvestris, Lob.

Cicuta major, c. B. * Grosse Schirling. *Cicuta*, Matth. Dod. Lob. Tab. *cicutaria vulgaris*, clus.

Cicuta minor petroselino similis C. B. * Petersilgen. Schirling / Hundspetersilge. *Cicuta minor*, Cam. *Cicutaria fatua*, Lob. *Petroselinum caninum* Tab. *Petroselini vitium*, Trag.

Cicutaria latifolia foetida, c. B. * Schirlingkraut mit breiten blettern. *Cicutaria foetida*, Tab. *latifolia foetidissima*, Lob. *Seseli Peloponense*, Matth.

Cicutaria palustris tenuifolia, C. B. * Schirlingkraut mit kleinen blettern. *Cicutaria palustris*, Lob. Tab. *Phellandrium*, Dod. *Ligusticum sylvestre*, Trag.

Cinara hortensis folijs non aculeatis, C. B. Gemeine Artschocken. *Cinara*, Eyst. *carduus non aculeatus*, Matth. *Scolymus non aculeatus*, Tab.

Cinara maxima Anglica, c. B. & Lob. ic. Groſſe Engliſche oder Kron-*Artschocken*. *Scolymus major*, Tab. *Scolymus* ſeu *Cinara maxima*, Eyſt.

Cinara hortensis aculeata, c. B. Stacheliche *Artschocken*. *Scolymus*, Frag. Lob. *Dioscoridis*, Cluſ. *Carduus hortensis foliis spinosis*, Caſt.

Cinara spinosa cujus pediculi eſitantur, c. B. Winter *Artschocken* / *Cardonem*. *Carduus aculeatus*, Matth. *Scolymus aculeatus*, Tab. Quemadmodum tres antecedentes ob capita coluntur, quæ prius, quam floris purpura prorumpat, in uſum culinarium præſcinduntur: ita in hac foliorum pediculi terra obruuntur, ut per hyemem ſtolones teneri cum ſale & pipere in cibos veniant.

Cistus mas folio oblongo incano, c. B. *Cistus* mit länglichen grauen blettern. *Cistus*, Dod. *mas*, Lob. *mas primus*, Cluſ. *mas latifolius*, Tab.

Cistus fœmina folio Salviae, c. B. *Cistus* mit Salbenblettern. *Cistus fœmina*, Matth. Dod. Lob. Cluſ. Tab.

Chamæcistus vulgaris flore luteo, c. B. *Zwerg-*Cistus*. *Chamæcistus primus*, Cluſ. *Flos solis*, Dod. *Helianthemum*, Lob. Eyſt. *Germanicum ſecundum*, Tab. *Panax chironium ſive Flos solis*, Matth.

Cistus ledon folijs rorismarini ferrugineis, c. B. *Poſt. *Ledum Sileſiacum*, Cluſ. *rorismarini folio*, Tab. *foliis rorismarini alterum*, Lob. *Rosmarinum ſylveſtre*, Matth. *Chamæpeuce*, Cord.

Cord. Ad inebriandum fortius a quibusdam cerevisiæ incoquitur, sed fraudulenter, nec absque noxa potantium.

Clematis daphnoides minor, C. B. * Kleiner Singrün. clematis, Matth. daphnoides, Dod. Lob. Tab. Clus. Pervinca, Trag. Flore est caruleo: in Horto etiam habetur flore candido.

Clematis daphnoides major, c. B. Dod. Großer Singrün. clematis sive Pervinca major, Lob. daphnoides latifolia, Clus. daphnoides major, Eyst.

Clematis daphnoides flore pleno, c. B. Singrün mit gefüllten Blumen. clematis altera flore pleno, Clus. daphnoides flore purpureo pleno, Eyst. Daphnoides polyflora, Lob.

Clematitis sylvestris latifolia, c. B. Breite Waldrebe. clematis tertia, Matth. Vitalba, Dod. Vitis nigra secunda, Tab. Viorna vulgi, Lob. Eyst. Atragene Theophrasti, Clus.

Clematitis sive Flammula repens, c. B. Kriechende Waldrebe mit weissen blumen. clematis urens, Tab. altera urens, Lob. Flammula, Dod. Viticella, Cæsalp.

Clematitis sive Flammula erecta, c. B. Aufrechte Waldrebe. Flammula, Matth. Tab. Clus. erecta, Eyst. altera, Dod. altera surrecta, Lob.

Clematitis carulea erecta, c. B. Aufrechte Waldrebe mit blauen blumen. Clematis carulea secunda, Tab. carulea Pannonica, Eyst. secun-

da, Clus. pan. altera minor longifolia, Clymenum quorundam, Lob.

Clematitis carulea vel purpurea repens, C. B. Kriechende Waldrebe mit blauen oder purpur-blumen. Clematis altera, Matth. Dod. Clus. peregrina carulea & purpurea, Lob. Tab. Eyst.

Clematitis trifolia flore roseo clavato, C. B. Passion-blume. Flos passionis, vulgi & du Bry. Granadilla, Monard. & Ferrar. Maracot, Indorum.

Clematitis Indica flore phœniceo. Indische Waldrebe. Gelleminum Indicum maximum flore phœniceo, Ferrar. Clematis Indica Contareni, Hort. Patav. Prædita est foliis, quæ forma quam proxime ad folia Azedaraci accedunt.

Clinopodium Origano simile, C. B. * Wirbeldost / oder Bettfuß. Clinopodium, Tab. vulgare, Matth. Acinos, Lob. Origanum quartum, Trag.

Clinopodium arvense Ocimi facie, C. B. * Salischer Bettfuß. Clinopodium vulgare, Lob. Clus. alterum Matthioli, Tab. Pseudoclinopodium, Matth. Ocimum sylvestre sive Acinos, Dod.

Cnicus sativus, sive Carthamum Officinarium, C. B. Wilder Safran. Cnieus, Matth. Dod. sativus, Eyst. Lob. vulgaris, Clus.

Cnicus sylvestris hirsutior sive carduus benedictus, C. B. Cardobenedicten. Carduus benedictus,

Stus, Matth. Lob. Tab. Eyft. Trag. *Carduus benedictus* & *Atractylis altera species*, Dod.

Cochlearia folio subrotundo, C. B. Löffelkraut.

Cochlearia, Dod. Matth. Batava, Lob.

Cochlearia minor erecta, C. B. Klein Löffelkraut. Semen ex Dania missum, nomine *Cochleariæ Danicæ*.

Colchicum commune, C. B. Gemeine Zeitlosen.

Colchicum, Matth. Dod. vulgare, Eyft. masculinum & foemininum, Tab. *Colchicum* sive stragulatorium & *Ephemerum crocifolium*, Lob.

Colchicum album strijs variegatum, C. B. Weiße Zeitlosen mit streiffen. *Colchicum mixtum autumnale*, Eyft.

Colchicum latifolium variegatum, C. B. Zeitlosen mit breiten blettern. C. B. *Colchicum quartum* sive *latifolium*, Clus. *Byzantinum polyanthos Frittlariæ facie autumnale*, Eyft.

Colchicum luteum majus, C. B. Gelbe Zeitlosen. *Colchicū luteū*, Lob. Tab. *Narciss. autumnalis major*, Dod. Clus. *autumnalis flore luteo*, Eyft.

Colchici multiflori, pleniflori, verni, aliquot spec.

Colutea vesicaria, C. B. & Eyft. Linsenbaum/ Deutsche Senßbletter. *Colutea*, Matth. Dod. Fuch. *Colutea Theophrasti*, Lob. Tab. Clus.

Colutea siliquosa sive scorpioides major, C. B. Linsenbaum mit frummen schöttein. *Colutea scorpioides*, Lob. Cam. prima, Tab. prima elatior, Clus.

Consolida media pratensis carulea, C. B.*

Gül.

Gulden Günsel mit blawen blumen. *Consolida media*, Matth. Tab. Eyft. Bugula, Dod. Clus. Bugula & Prunella quibusdam, Lob.

Consolida media pratensis purpurea, C. B.*

Gulden Günsel mit purpur-blumen. *Consolida media purpurea*, Fuch. *media secunda*, Tab. Bugula *carnei coloris flore*, Clus.

Consolida regalis hortensis flore majore & simplicis, c. B. Einfacher Kitterspor mit grossen blumen. *Consolida regalis sativa*, Tab. *regia sive calcaris flos recentiorum*, Lob. *Flos regius*, Dod. *Delphinium elatius flore cæruleo*, Clus. Adsunt aliquot coloris varietates.

Consolida regalis hortensis flore minore, c. B. Einfacher Kitterspor mit kleinen blumen. *Consolida regalis flore rubro*, Lob. ic. *regalis sativa flore rubro*, Tab. *Flos regius flore purpureo*, Dod. *Delphinium elatius simplicis flore*, Clus.

Consolida regalis flore majore & multiplici, c. B. Gefülter Kitterspor. *Consolida regalis flore pleno*, Cam. *Delphinium elatius pleno flore*, Clus. Adsunt hujus quoque aliquot varietates.

Consolida regalis arvensis, C. B.* & Tab. Wild Kitterspor. *Flos regius secundus vel sylvestris*, Dod. *Segetum consolida regia strigosior tota*, Lob. *Delphinium vulgare*, Clus.

Convolvulus major albus, C. B.* Grosse Winde. *Convolvulus major flore albo*, Eyft. *Volubilis major*, Tab. *Smilax lævis*, Matth. *Smilax lævis major*, Dod. Lob.

Cen-

Convolvulus minor arvensis, C. B. *

Kleine Winde. *Convolvulus minor*, Clus. *minor purpureus*, Lob. *Volubilis arvensis*, Tab. *Smilax lavis minor*, Dod. *Helxine cissampelos*, Marth. Adest flore candido, & flore roseo.

Convolvulus minor semine triangulo, C. B. *

Kleine Winde mit dreneckigen Samen. *Convolvulus niger*, Dod. *Volubilis nigra*, Tab. *Helxine cissampelos altera atriplicis effigie*, Lob.

Convolvulus cæruleus hederaceo anguloso folio, C. B. Himmelblawe Winde. *Convolvulus cæruleus*, Tab. *asureus seu cæruleus hederaceus*, Lob. *peregrinus vel Flos noctis*, Gesner. quoniam flores accedente sole constringuntur. *Campana cærulea*, Dod. *Nil Arabum*, Eyst.

Convolvulus purpureus folio subrotundo, C. B. Purpurblawe Winde. *Convolvulus Indicus flore violaceo*, Eyst. *Convolvuli species alia*, quæ ad *Nil Avicennæ* referri potest, Dod.

Convolvulus peregrinus cæruleus folio oblongo, C. B. Himmelblawe Winde mit länglichen blättern. *Convolvulus secundus*, in Prodr. *Campanula incognita cæruleo alba*, Bry. *Convolvulus non-convolvulus*, quoniam cauliculos non admodum convolvit, sed potius vinciri amat.

Conyza major vulgaris, C. B. Gemeine Dürrenwurz. *Conyza major*, Matth. *major altera*, Dod. *Baccharis*, Tab. *Baccharis Monspeliensium*, Lob.

*Conyza major Dioscoridis, C.B.** Grosse Dürrenwurz. *Conyza major, Dod. Cam. major vera, Lob. ic. Conyza mas, Theophr.*

*Conyza minor Dioscoridis, C.B.** Kleine Dürrenwurz / Veruffkraut. *Conyza minor, Clus. minor vera, Lob. ic. minor altera, Dod. Conyza fœmina, Theophr.*

*Conyza media Asteris flore luteo, C.B.** Mittel Dürrenwurz. *Conyza. Tab. tertia, Diosc. media, Matth. Dod. Lob. Eyst. media vulgaris, Clus.*

Corchorus, C.B. Melochia / Egyptisch Mueßkraut. *Corcoros Plinii, Lob. qui florentem pingit. Corcorus sive Melochia, Cam. qui barbulas foliorum & semen exprimit. Melochia Alpini, qui integram plantam exhibet. Melochia Egyptia, Velling. Hort. Patav. Oulus Judaicum Avicennæ quibusdam, & Moluchi Arabum, Rauwolf.*

Coriandrum majus, C.B. Coriander. Coriandrum, Matth. Lob. Tab. Dod. Fuch.

Cornus hortensis mas, C.B. Cornelbaum. Cornus, Trag. Matth. Dod. Lob. mas, Tab. vulgaris mas, Clus.

*Cornus fœmina. C.B.** Lob. Tab. Hartriegel. Trag. *Cornus sylvestris, Lon. Virga sanguinea, Matth. Dod. Ruell. Materies solidissima, & apta fabricandæ supellectili.*

Coronopus hortensis, C.B. Rordenfueß. Coronopus, Trag. Lon. Matth. Tab. Cornu cervinum, Lob. Herba sive Cornu cervinum, Dod. Gräffine Belgarum.

Coro-

Coronopus repens, C.B.* Kriechend Krähenfuß / Schweinefresse. *Coronopus repens* aut *arvensis*, Tab. *Coronopus Ruellii* & *Cornu cervi alterum*, Lob. ic.

Corylus sylvestris, C.B.* Wilde Haselnuß. *Corylus*, Dod. *sylvestris*, Lob. Matth. Clus. Ab hac sola cultura differt sequens.

Corylus sativa fructu albo minore, sive vulgaris, C.B. Gemeine weisse Haselnüsse. *Corylus domestica*, Clus. persimilis albo, Lob. *Nux avellana fructu rotundo*, Matth.

Corylus sativa fructu rotundo maximo, C.B. Grosse runte Haselnüsse. *Avellana major Lugdunensis*, Cam. urbana rotunda circa Lugdunum, Gel. hort. Hæc apud nos minus frequens: fructus vero aliunde illati, inter bellaria apponuntur.

Corylus sativa fructu oblongo rubente, C.B. Rote Haselnüsse / Bart- oder Lamperts-Nüsse. *Corylus domestica oblonga*, Clus. *Nux avellana domestica oblonga rubra*, Matth. *Avellana Lombardica*, quorundam. Datur in hoc genere quædam species, cujus nucleus non rubra, sed alba pellicula integitur.

Cotinus, C.B. Matth. Tab. Färberbaum / Färberlaub Austriacis. *Cotinus coriaria*, Dod. Eyst. *Coccigria Theophr.* Lob. *Coggygia Plinii*, Clus.

Cotylédon major, C.B. Groß Nabelkraut. *Cotyledon*, Dod. Lob. *Umbilicus Veneris*, Matth. Tab. *Cotyledon sive Umbilicus Veneris*, Clus.

Cotyledon media folijs subrotundis, C. B. Mittel Nabelkraut mit rundlichen blettern. *Cotyledon altera*, Dod. altera quarta, Clus. Umbilicus Veneris alter, Matth.

Cotyledon media folijs oblongis serratis, C. B. Mittel Nabelkraut mit länglichen blettern. *Cotyledon minus*, Eyst. minus sedi folio, Lob. Umbilicus Veneris minor, Tab. alter secundus, Matth.

Crocus sativus, C. B. Richter Saffrahn. *Crocus*, Trag. Lob. Tab. Dod. sativus autumnalis, Eyst. *Crocum*, Matth. hortense, Cam.

Crocus vernus latifolius albus variegatus, C. B. Frühlings Saffrahn. *Crocus sylvestris montanus flore albo*, Lob. *sylvestris vernalis alter*, Dod. *vernus major alter*, Clus.

Crocus vernus latifolius purpuroviolaceus, C. B. qui varietates aliquot sub se comprehendit.

Crocus vernus minor albicans, C. B. *Crocus sylvestris minor prior*, vel *sylvestris quartus*, Dod. *vernus serotinus primus*, Lob. ic. *vernus latifolius albus versicolore flore secundus*, Clus.

Crocus vernus minor purpurascens, C. B. *Crocus sylvestris quintus*, Dod. *vernus albus secundus*, Lob. *vernus latifolius albus versicolore flore primus*, Clus.

Crocus vernus latifolius flavus, C. B. *Crocus vernus polyanthos flore luteo*, Eyst. *vernus luteus primus*, Lob. *vernus latifolius flavo flore*, Clus.

Cro-

Crocus vernus latifolius aureus, c. B. *Crocus aureus*, Lob. *vernus latifolius flore aureo*, vel *Croci sexti alia species*, Clus.

Crocus vernus angustifolius magno flore, C. B. *Crocus vernus minor primus*, Tab. *vernus angustifolius primus*, Clus. *sylvestris minor Hispanicus flore patulo*, vulgo *Nozilicha minor*, Lob.

Crocus vernus angustifolius parvo flore, c. B. *Crocus vernus minor tertius*, Tab. *vernus angustifolius tertius*, Clus. *sylvestris vernalis sextus*, Dod. *sylvestris Hispanicus*, vulgo *Nozilicha major*, Lob.

Crocus vernus angustifolius variegatus, c. B. *Crocus aureus variegatus*, Eyst.

Crocus alpinus autumnalis, c. B. *Später Saffran*. *Crocus montanus autumnalis*, Lob. *sylv. autumnalis*, Dod. *montanus vernus*, Eyst. *Crocum montanum*, Clus.

Cruciata hirsuta, c. B. * *Krusette*. *Cruciata*, Dod. *minor*, Lob. *Gallii secundum genus*, Trag.

Cucumis sativus vulgaris, C. B. *Rufumern / nostratibus Gurken /* quamvis hæc vox corrupta possit videri ex *Anguria*, quæ alia species. *Cucumis*, Tab. *lativus*, Matth. *sativus & esculentus*, Lob. *vulgaris*, Dod.

Cucumis sativus major, C. B. *Grosse Gurken*. *Cucumis Turcicus*, Fach. ex *Hispanico semine natus*, Tab.

Cucumis flexuosus, C.B. Schlangen-Gurcken. *Cucumis longus*, Matth. *oblongus*, Dod. *anguina*, Tab. *flexuosus* sive *anguinus*, Lob.

Cucumis sylvestris asininus dictus, C. B. Spring-gurcken. *Cucumis asininus*, Tab. Eyft. *sylvestris*, Matth. Dod. *Cucumer Elaterii sylvestris*, Lob. *Fructus maturos si tangas, semina ejaculantur: sicut Balsamina lutea sive Noli me tangere.*

Cucurbita major sessilis flore albo, C.B. Grosser platrunter Kürbis mit weissen blumen. *Cucurbita latior*, Dod. *sessilis*, Matth. ep. *Zuccha rotunda*, Anguill.

Cucurbita major rotunda flore luteo, folio aspero, C.B. Grosser runter Kürbis mit gelben blumen und rauhen blettern. *Cucurbita Indica*, Matth: *Indica major & minor*, Tab.

Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli, C.B. Flaschen-Kürbis mit weichen blettern. *Cucurbita lagenaria*, Lob. *lagenaria major & minor*, Tab. prior, Dod. *Adfuerunt colore toto viridi, toto albo, viridi & albo medio.*

Cucurbita oblonga flore albo, folio molli, C.B. Lange oder Trompeten-Kürbis. *Cucurbita longior*, Dod. *longa*, Tab. *tubularis*, quorundam. *Cucurbita sive Zuccha omnium maxima anguina*, Lob.

Cucurbita capitata, C. B. Tab. Kopff-kürbis. *Cucurbita stellata sive sessilis*, Cam.

Cucurbita verrucosa, C. B. Warzen Kürbiß.
Quibus addantur, quæ adfuerunt: *Cucurbita ca-*
seiformis, *cydoniformis*, *citriformis*, *aurantifor-*
mis, *limoniformis*, *spongifera*, *compressa*, *clypea-*
ta, & *similes*.

Cuminum semine longiore, C. B. Kümmel.
Cuminum sativum, Matth. Lob. *Cuminum*,
Tab.

Cuminum pratense, Carvi Officinarum, C. B.
Garbe. Carvum, Matth. Lob. Dod. Tab. *Radix a-*
licubi etiam in usum culinæ cedit.

Cupressus, C. B. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst.
Cypressenbaum, *Cyparissus*, Cast.

Cuscuta major, C. B. * Filzkrout / Glachsseide.
Cuscuta, Matth. Clus. Casslytha, Lob. Tab. Cassu-
tha, Dod. Implicando sese adnascitur Lino, Rubo,
Urticæ, *Lupulo*, *Tanaceto*, & aliis.

Cyanus segetum, C. B. * Wilde Kornblume/
Koggeblume. *Cyanus flos*, Dod. major, Matth. vul-
garis, Lob. cæruleus, Tab. arvensis cæruleus, Eyst.

Cyanus hortensis flore simplici, C. B.
Garten Kornblume die einfache. Ad sunt aliquot
varietates.

Cyanus hortensis flore pleno, C. B. Garten Korn-
blume die gefülte. *Cyanus multiflorus*, Tab. flore
multiplici, Lob. ic. Floris color variat.

Cyanus flore pleno, odore Zibethi. Gefülte
Kornblume nach Zibeth riechend. In colore floris
triplicem notavi varietatem. Est enim totus
balus

albus, totus purpureus, albus cum fundo purpureo. Communiter dicitur Cyanus Orientalis, aut Indicus, aus Turcicus odoratissimus.

Cyanus repens latifolius, C. B. * Kriechende Kornblume mit breiten blettern. Cyanus repens, Lob. ic. minor altera, Tab. peramarus lupinus capitulis squamosis, Adv.

Cyanus repens angustifolius, C. B. * Kriechende Kornblume mit schmalen blettern. Cyanus minimus repens, Lob. ic. Cyanoides minor, Tab.

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens, C. B. Schweinebrodt mit runten blettern unten purpurfarbe. Cyclaminus, Matth. Tab. orbicularis rotundifolius, Dod. flore odorato, Clus. Cyclamen vulgare, Eyst. Panis porcinus & Arthanita, Off.

Cyclamen radice maxima folijs inferne rubentibus, C. B. Schweinebrodt mit runten blettern/unten roht. Cyclamen Romanum, Eyst.

Cyclamen folio anguloso, C. B. Schweinebrodt mit eckigen blettern. Cyclamen vernum, Lob. ic. Eyst. cyclaminus verno tempore florens, Clus. Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.

Cyclamen vernum album, C. B. Frühlings Schweinebrodt mit weissen blumen. Cyclamen vernum flore albo, Lob. clus. & quidem extant in Catalogo veteri MS. nomina quoque sequentia: Cyclamen Persicum majus. Cyclamen Persicum vernum flore albicante, corolla purpurea odoratum.

rum. Cyclamen Monspeliense venum flore albo,
& flore rubro. Cyclamen de Alepo venum Cy-
clamen autumnale Pisanum. Cyclamen autum-
nale Africanum flore purpureo odoratum.

Cymbalaria, C. B. Matth. Zymbelfraut. Cym-
balaria Italica hederaceo folio, Lob. foliis hede-
raceis flore cæruleo, Eyst.

Cynoglossum majus vulgare, c. B. * Grosse
Hunds;unge. *Cynoglossum*, Dod. Tab. vulgare,
Matth. Lob. Clus Eyst.

Cynoglossum medium, c. B. Mittel Hunds;un-
ge. *Cynoglossum pumilum*, Clus. pan. Narbonen-
se, Eyst. pusillum Narbonense, Lob. ic.

Cytisus incanus siliquis falcatis, C. B. Weiß-
flee. *Cytisus*, Dod. tertius cornutus, Tab. Maran-
thæ, Matth. Lob. Galeni Maranthæ cornutus,
Eyst.

Cytisus incanus folio oblongo Austriacus, c. B.
Weißflee mit länglichen blettern. *Cytisus quintus*
Clus. undecimus, Tab. incanus, Ger.

Dens canis latiore rotundioreq; folio, C. B.
Breitblettriger Hunds;ahn. *Dens caninus*, Dod.
purpurascende flore, Clus. Satyrium & *Dens cani-*
nus, Lob. *Dens canis* flore rubro, Eyst. *Pseudoher-*
modactylus, Matth. Tab. Adest etiam flore albo.

Dens canis angustiore longioreque folio, C. B.
Schmallblettriger Hunds;ahn. *Dens caninus* al-
bo flore, Clus. Eyst. *Erythronium* fl. albo angusti-
oribus foliis, Lob.

Dens leonis latiore folio, C.B.* Breit Löwen-
zahn/Pfaffenröhrlein. *Dens leonis*, Matth. Lob.
Dod. Tab. *Hieracium majus*, Trag. Caput mona-
chi, quorundam.

Dens leonis angustiore folio, C.B.* Schmall
Löwenzahn. *Aphaca angustioris folii*, Cæf.

Dictamnus albus vulgo sive Fraxinella, C.B.
Weisser Diptam. *Dictamnus albus*, Matth. Fra-
xinella, Dod. Clus. Eyf. *Polemonium*, Tab.

Pseudodictamnus verticillatus inodorus, C.B.
Falscher Diptam. *Dictamnus*, Matth. floribus
verticillatis, Lob. Eyf.

Digitalis purpurea folio aspero, C.B. Braun
Fingerhut. *Digitalis rubra*, Dod. Lob. Tab. folio
verbasci, quibusdam.

Digitalis alba folio aspero, C.B. Weiß Finger-
hut. *Digitalis alba*, Lob. Eyf. secunda, Dod.

Digitalis lutea magno flore, C.B. Gelb Fin-
gerhut. *Digitalis lutea*, Tab. flore luteo, Eyf. ter-
tia, Dod.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major,
C.B.* Kartendistel. *Dipsacus*, Tab. sylvestris, Dod.
Labrum Veneris, Lob. alterum, Matth.

Dipsacus folio laciniato, C.B.* Kartendistel mit
gelaſchten blettern. *Dipsacus secundus*, Tab.

Doronicum radice scorpij, C.B. Gemenſenwurz.
Doronicum, Eyf. primum, Tab. latifolium, Clus.
Doronici tertii varietas, Lob.

Doronicum Americanum, C.B. Americani-
sche

sche Genssenwurz. Descriptio habetur in appendice Pinacis.

Draba filiquosa cerulea. Blawe Draba. Solo floris colore differre videtur a Draba alba filiquosa repente, C.B. quæ est Draba tertia succulento folio, Clus. Arabis seu Draba altera, Lob. Obs.

Dracunculus hortensis, C.B. Matth. Tab. Eyf. Garten-Dragune. Draco, Lob. Draco herba, Dod. Tragum vulgare, Clus.

Dracunculus pratensis serrato folio, C.B.* Wiesen Dragune. Ptarmica, Matth. Lob. Clus. vulgaris, Eyf. Draco sylvestris sive Ptarmica, Dod. Pyrethrum sylvestre, Cord.

Dracunculus pratensis flore pleno, C.B. Wiesen Dragune mit vollen blumen. Ptarmica vulgaris pleno flore, Clus.

Dracunculus polyphyllus, C.B. Schlangenfraut. Dracunculus minor, Matth. Tab. Dracontium majus, Dod. Eyf. Anguina dracontia & Serpentaria colubrina, Lob.

Dracunculus palustris, sive radice arundinacea Plinij, C.B.* Wasser Schlangenfraut. Dracunculus aquaticus, Matth. Dod. Eyf. Anguina aquatica sive Dracunculus, Lob.

Echium vulgare, C.B.* & Clus. Echium das gemeine. Echium, Matth. Dod. floribus purpurantibus rubellis, Lob. Flore apud nos caeruleo provenit.

Echi

Echium scorpioides arvense, C. B. * Scorpion
Echium/ so auff den äckern wächst. *Scorpioides*
tertium, Dod. *tertium minus*. Dodonæi, Eyst. *Au-*
ricula muri cærulea, Tab. *Myosotis hirsuta re-*
ptans, Lob.

Echium scorpioides palustre, C. B. * Scorpion-
Echium/ so in sumpffen wächst. *Scorpioides*
foemina, Dod. *tertium majus*. Dodonæi, Eyst.
Euphrasia cærulea, Tab. Flore apud nos inveni-
 tur & cæruleo & niveo.

Epimedium, C. B. Dod. Lob. Cam. Anguill.
 Bischoffshut. *Lunaria Vicentinorum*, in quo-
 rum agris frequens nascitur. Magnitudine admo-
 dum variat.

Equisetum palustre longioribus setis, C. B. *
 Sumpffiger Roßschwan; mit langen borsten. *E-*
quisetum primum, Matth. *majus*, Lob. *secundum*,
 Tab. *Hippuris major*, Do l.

Equisetum palustre brevioribus setis, C. B. *
 Sumpffiger Roßschwan; mit kurzen borsten.
Equisetum palustre, Lob. ic. Foliorum extremita-
 tes in hoc fissas quoque inveni. ob quam varieta-
 tem vocari posset *Equisetum palustre setis bifidis*.

Equisetum palustre brevioribus foliis polysper-
mon, C. B. * Roßschwan; so viel samen trägt.
Polygonum foemina, Matth. Dod. Tab. *semine vi-*
dua, Lob. ic.

Equisetum pratense longissimis setis, C. B. *
 Wiesen Roßschwan; / Schaffchew / Rannekraut.
 Equi-

Equisetum alterum, Matth. palustre majus, Tab. Hippuris fontalis, Lob.

Equisetum arvense longioribus setis, C. B.*
 Acker-Rosßschwanz. *Equisetum alterum*, Lob.
 Hippuris minor, Dod. arvensis major, Tab.

Equisetum folijs nudum non ramosum, sive junceum, C. B.* Rosßschwanz ohn bletter. *Equisetum junceum*, Trag. Hippuris sine foliis & nuda, Tab.

Equisetum foetidum sub aqua repens, C. B.*
 Stinckend-Wasser-Rosßschwanz. *Equisetum quintum* in Prodomo, cum icone.

Erica vulgaris glabra, C. B.* Heidekraut. *Erica*, Tab. prima, Matth. Dod. Myricæ folio, Lob. Clus. Invenitur flore tum dilute purpureo, tum albescente.

Eruca latifolia alba, C. B. Garten-Kraucke. *Eruca sativa*, Matth. Lob. Dod. Italis corrupte Ruchetta vocatur, cujus folia acetariis admiscunt. A Sinapi hæc diversa planta est, quamvis apud Matthiolum Germanice vertatur, weisser Garten-Geriff.

Eruca sylvestris minor, luteo parvæ flore, C. B.* Kleine wilde Kraucke. *Eruca palustris minor*, Tab. Sinapi primum genus sylvestre, Fuch.

Eruca lutea latifolia, sive Barbarea, C. B.* Breitblettrige wilde Kraucke/ Winterkresse. *Barbarea*, Dod. Lob. Tab. Herba S. Barbaræ, Trag. Lon. Scribitur etiam in hortis.

Eruc-

Eruca maritima Italica siliqua haste cuspide simili, C.B. Meerrauce. *Eruca Kackile dicta*, Colum. *Cakile Serapionis*, Lob.

Eryngium vulgare, C.B.* & Clus. Manß-trew/ blawe Distel. *Eryngium*, Tab. campestre, Dod. campestre mediterraneum, Lob. montanum sive campestre, Matth.

Eryngium montanum amethystinum, C.B. Manßtrew blau als ein Amethyst. *Eryngium totum cæruleum*, Eyft. Cam.

Eryngium latifolium planum, C.B. Manßtrew mit breiten blettern. *Eryngium planum*, Matth. spurium primum, Dod. cæruleum primum & secundum, Tab. pannonicum latifolium, Clus. pan. Eyft.

Eryngium arvense folijs serræ similibus, C.B.* Manßtrew mit sägenformigen blettern. *Eryngium quartum*, Dod. montanum recentiorum, Lob. *Crithmum quartum*, Matth. Tab.

Erysimum vulgare, C.B.* Wegesenff/ Dottertraut. *Erysimum primum*, Tab. Irio, Matth. Irio sive *Erysimum*, Lob. Dod.

Erysimum cereale, C.B. Buchweize. *Erysimum Theophrasti*, Lob. *Fagopyron*, Dod. *Ocimum cereale*, Tab. Clus. pan. *Fru mentum Sarracenicum*, Matth. *Fagotriticum quorundam*.

Evonymus vulgaris granis rubentibus, C.B.* Spilbaum. *Evonymus*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Tetragonia*, Theophr. *Quadratoria*, Gazz. Ma-

Materies flavet, & ob duritiem ad varia opera expetitur.

Eupatorium cannabinum, C.B. * Wasserdoft. *Eupatorium vulgare*, Matth. Dod. *Cannabina aquatica mas*, Lob. *Herba S. Kunigundis prima*, Tab.

Eupatorium seu Cannabina aquatica folio non diviso, C.B. * Wasserdoft mit unzerschnittenen blettern. *Eupatorium cannabinum chrysanthemum*, Tab. *cannabinum fœmina Septentrionalium*, Lob. ic. *Conyza palustris*, Eyft.

Eupatorium veterum sive Agrimonia, C.B. * Odermennige. *Eupatorium*, Matth. Tab. *Dioscoridis & aliorum Græcorum*, Lob. *Agrimonia*, Dod.

Eupatorio veterum sive Agrimonie similis. Ein kraut der Odermennige ähnlich. *Agrimonia similis*, C.B. *Agrimonoides*, Column. *Diversa tamen ab hac planta est Pimpinella agrimonioides Horti Patavini*, quæ Bauhino indicta videtur.

Euphrasia officinarum, C.B. * Augentrost. *Euphrasia*, Matth. *ramosa & minus ramosa*, Eyft. *Euphrasia & Eufragia*, Dod. Lob. Tab. *Flos ex luteo albicat, rarius ex caeruleo purpurascit*.

Euphrasia pratensis rubra, C.B. * Rother Augentrost. *Eufrasia altera*, Dod. Lob. *Odontites*, Tab.

Faba, C.B. & Matth. Bone. *Faba major recentiorum*, Lob. *Boona sive Phaselus major*, Dod.

Fagus, C.B. * Matth. Dod. Lob. Tab. & cæte-

rorum. Büche. Fructus castaneis parvis similes, in cibum porcis gratissimum veniunt.

Ferrum equinum siliqua singulari, C.B. Hufeisenkraut/ Löffelsutteral. Ferrū equinum, Matth. Lob. Hedyсарum sive ferrum equinum, Tab. Sferrocavallo, Cam.

*Festuca graminea glumis hirsutis, C.B.** Graßsulch/ Draspe. Festuca altera, Dod. Lolium, Lon. Bromos sterilis altera, Lob. Bromos herba, Tab. Vitium est frumentorum, præcipue Secalis.

*Festuca avenacea sterilis elatior, C.B.** Haberulch. Ægilops prima, Matth. prima & Avena fatua, Tab. Bromos sterilis, Lob. ic. Bromos herba, Dod.

Ficus communis, C.B. Hoher Feigenbaum. Ficus, Matth. Dod. Lob. Tab.

Ficus humilis, C. B. Niedriger Feigenbaum. Ficus pumila, Matth. Dod. Chamæficus sive humilis ficus, Lob.

Ficus Indica folio spinoso fructu majore, C.B. Grösse Indianische Feigen. Ficus Indica, Matth. Dod. Lob. Eyst. Indica spinosa, Tab. Opuntia, Lon.

Ficus Indica minor. Kleine Indianische Feigen. An Ficus Indica folio spinoso fructu minore, C. B. quæ Indorum ferruminatrix, Lob.

*Filipendula vulgaris, C.B.** Roter Steinbrech. Filipendula, Dod. Matth. Tab. vulgaris, Eyst. Oenanthe, Lob. Fuch,

Filix non ramosa dentata, C.B.* Fahrenkraut
ohn zweige. Filix mas, Matth. Dod. Lob. Tab.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis, C.B.* Fahrenkraut mit zweigen. Filix foemina, Matth. Dod. Lob. Tab. Hujus radix non transverso ductu, sed calamitum incisa aquilam mentitur.

Filix Americana. Americanisch Fahrenkraut. Ita nominatur in Horto Parisiensi. Filix Virginiana, Hort. Lugd. Batav. & Groening.

Filix querna, C. B. * Eichenfaren. Dryopteris, Matth. Lob. Cam. ep. Filicula petræa foemina secunda, Tab. Osmundula, Lon.

Fœniculum vulgare Germanicum, C.B. Fenchel. Fœniculum, Trag. Fuch. Tab. commune, Gesn. hort.

Fœniculum dulce, C.B. Matth. Weisscher Fenchel. Fœniculum Romanum, Tab. vulgatus dulce, Lob.

Fœnum græcum sativum, C.B. Beckshorn. Fœnum græcum, Matth. Lob. Dod. Lon. Fœnogræcum, Fuch.

Fragaria vulgaris, C. B.* Erdbeer / Vesingkraut. Fragaria, Matth. Dod. Lob. Fragum & Trifolium fragiferum, Tab. Fraga fructu rubro, Eyst. In hortis culta majores fructus producit, & interdum florem plenum.

Fragaria fructu albo, C.B. Weiss Erdbeer. Fragum album, Tab. Fraga candida, Trag.

Fragaria sterilis, C.B.* & Gesn. Erdbeerfraut ohn frucht. *Fragaria sylvestris* minime vesca sive sterilis, Lob. ic.

Fraxinus excelsior, C.B.* Esche. Fraxinus, Matth. Dod. Lob. Tab. Materia levis est, enodis, recta: unde ad hastas & perticas expetitnr.

Fritillaria praecox purpurea variegata, C.B. Früzeitige Fritillarie mit purpurgescheckten blumen. *Fritillaria*, Eyst. dilutior, Clus. sive Lilionarcissus purpureus variegatus, Lob. Meleagris, Dod.

Fritillaria alba praecox, C.B. Früzeitige Fritillarie mit weissen blumen. *Fritillaria alba*, Clus. Eyst. alba altera, Lob.

Fritillaria polyanthos flavoviridis, C.B. Gelbgrüne Fritillarie mit vielen blumen. *Fritillaria polyanthos lutea*, Eyst.

Fritillaria flore magno pleno, C.B. Volle Fritillarie. *Fritillaria flore pleno*, Eyst. Cam.

Fritillaria serotina floribus ex flavo virentibus, C.B. Späte Fritillarie die gelbgrüne. *Fritillaria Aquitanica*, Clus. minor obsoleto colore inodora, Eyst.

Fritillaria flava rubris maculis distincta, C.B. Gelbe Fritillarie mit rohten schecken. *Fritillaria lutea* Someri, Lob. Suert. *Fritillariae tertium genus*, Clus.

Fritillaria flore minore, C.B. Kleine schwarze Fritillarie. *Fritillaria Pyrenæa*, Clus. nigra *Pyrenæa*, Lob. *Pyrenæa* obsoleto luteo colore, Eyst.

Variat

Variat admodum, & in Hort. Berolinensi prove-
niebat flore ex purpureo plane nigricante, sine
tessulis, anno 1661.

Frumentum Indicum Mays dictum, C. B.
Türkischer Weizen. *Frumentum Indicum*, Matth.
Turcicum, Dod. *Milium Indicum Plinianum*,
Lob.

Fumaria officinarum, & Dioscoridis, C. B. *
Erdrauch / Alpraute. *Fumaria*, Matth. Dod. Ca-
puos, Lob.

Fumaria lutea, C. B. Erdrauch mit gelben blu-
men. *Fumaria lutea montana*, Lob. *Fumaria co-
rydalis*, Matth. *Fumaria montana*, Tab. In nostra
floris pars antica flavet, postica purpurascit.

Fumaria bulbosa radice cava major, C. B.
Knollig Erdrauch mit holer wurzel / oder Hol-
wurz. *Fumaria altera*, Matth. *Aristolochia rotun-
da vulgaris*, Trag. Fuch. *Radix cava major*, Dod.
Radix cava herbariorum, Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa radice non cava major, C. B.
Knollig Erdrauch / an welchen die wurzel nicht
holl. *Aristolochia rotunda vulgaris radice solida*,
Trag. rotunda, fl. albo, Eyft. licet pingant fl. pur-
purante & luteo.

Fungorum vescorum, & noxiorum plurimæ
species. E vescis quatuor cum primis genera 2-
pud nos sunt usitata. Merckeln / Meitscher / Pül-
ze / Psifferlinge. Inter non vescos celebres sunt,
& usitati:

Fungus rotundus orbicularis, C. B. * Posist.
 Fungus orbicularis, Dod. ovatus & Crepitus lupi,
 Trag. Lon. glomeratæ rotunditatis, Lob. belg. Lu-
 picrepitus, Cast. Hunc maturum confringunt, a
 pulvere contento liberant, & exsiccatum pro si-
 stendo sanguine in vulneribus Chirurgi usur-
 pant.

*Fungus membranaceus auriculam referens si-
 ve Sambucus*, C. B. * Judasohr / Gliederschwam.
 Fungus ad Sambucum, Trag. Fungorum pernici-
 osorum primum genus, Clus. Auricula Judæ vul-
 go, a figura: macerant autem in aqua rosacea, &
 oculis inflammatis pro refrigerio imponunt.

Galega vulgaris, C. B. * Ziegenraute / Geißraute.
 Galega, Lob. Dod. Ruta capraria, Tab. Gale-
 ga sive Ruta capraria, Matth. In horto floribus
 quoque candicantibus colitur, aut cinereis, cum
 iponte nascenti flos sit cæruleus.

Galega Ægyptiaca siliquis articulatis, C. B.
 Geßban. Sesban, Alpin. Clus. Seban & Sesban
 Indicum, Cam. Seysban, Belli.

Galega affinis Sophora dicta, C. B. Sophora.
 Sophora, Alp. Sofera lentisci foliis, Belli. Hoxo-
 coquomaclit, Cam. Clus. cur. post.

Gallium luteum, C. B. * Wallstroch mit gelben
 blumen. Gallium, Dod. Fuch. Lon. primum, Tab.
 Galium, Matth. luteum, Lob.

Gallium album minus, C. B. * & Tab. Wall-
 stroch mit weissen blumen.

Gallium palustre album, C. B. * Sumpffig
Wailstroh. *Gallium palustre*, Dod. album, Tab.
Lon.

Genista angulosa & scoparia, C. B. * Ginst/
Pfrimmentraut. *Genista*, Trag. Dod. Tab. vul-
garis, Clus. *scoparia vulgi*, Lob. Eyft. Sunt, qui
flores hujus nondum apertos muria condiunt, &
Capparum loco utuntur.

Genista tinctoria Germanica, C. B. * Berber-
pfrimmen. *Genista tinctoria*, Dod. tinctoria vul-
garis, Clus. *Genistella tinctoria*, Tab. Eyft.

Genista humilis sive Chamaegenista sagittalis,
C. B. Erdpfrimmen. *Genista sagittalis pannonica*,
Cam. *Genistella montana*, Lob. *Chamaegenista*
altera, Clus. *Chamaespartium*, Trag. Lon. Tab.

Gentiana cruciata, C. B. * Creuz Enzian. *Gen-*
tiana minor, Matth. Lob. Tab. *Cruciata*, Trag.
Fuch. Dod. Lon. Eyft.

Gentianella alpina verna major, C. B. *Gentia-*
nelle. *Gentiana alpina*, Lob. *verna minor*, Clus. *mi-*
nima verna flore cæruleo, Eyft.

Geranium batrachoides folio Aconiti, C. B.
Storchschnabel mit Eisenhut blettern. *Geranium*
sive batrachium cæruleum, Tab. secundum vel *ba-*
trachiodes alterum, Clus. Adest flore cæruleo, flo-
re albo, flore albo lineis cæruleis variegato.

Geranium sanguineum maximo flore, C. B.
Storchschnabel mit blutrohten blumen. *Geraniū*
sanguinarium, Eyft. *septimum hæmatodes*, Clus.

Gruinum sanguinale hæmatodes supinum radice reptrice, Lob. ic.

Geranium batrachoides, Gratia Dei Germanorum Lobelij, C.B. * Storchschnabel / Graze de genant. *Geranium batrachoides*, Dod. sanguinarium, Tab. quartum, Matth.

Geranium batrachoides flore variegato, C.B. Storchschnabel mit geschleckten blumen. *Geranium Anglicum variegatum*, Eyft.

Geranium montanum fuscum, C. B. Berg Storchschnabel mit braun schwarzen blumen. *Geranium montanum*, Dod. fuscum, Lob. Eyft. maculatum, Tab.

Geranium tuberosum majus, C.B. Storchschnabel mit knolliger wurzel. *Geranium tuberosum*, Dod. primum, Matth. bulbosum Matthioli, Tab. bulbosum, Dio. coridis primum, Lob.

Geranium folio Malve rotundo, C.B. Storchschnabel mit pappelblettern. *Geranium alterum*, Trag. Matth. columbinum, Tab. Pes columbinus, Dod. Lob.

Geranium folio Althææ, C.B. Storchschnabel mit Althe-blettern. *Geranium sextum*, Matth. inalaoides, Lob. Monspeliacum, Tab. a Calceolario missum, Dod.

Geranium cicutæ folio moschatū, & inodorū C. B. * Storchschnabel mit Schirlingsblettern / Die semfraut. *Geranium supinum*, Dod. moschatum, Eyft. myrrhinum, Tab. Myrrhida Plinii, Lob. ic. &

rostrum ciconiæ, Adv. Plerumque moschum olet, nonnunquam odore caret: odoratum solet in hortos quoque transferri.

Geranium Cicutæ folio minus & supinum, C.B.* Kleiner Storchschnabel mit Schirlingsbletern. *Geranium septimum sive gruinum*, Dod. minus vel arvense, Tab. moschatum inodorum, Eyst. Myrrhida vulgatum Plinii, Lob. ic.

Geranium Robertianum primum, C.B.* Gemein Storchschnabel / Ruprechtskraut. *Geranium tertium*, Matth. Lon. Fuch. Robertianum, Lob. Dod. Tab.

Geranium latifolium longissima acu, C.B. Cretischer Storchschnabel. *Geranium Creticum*, Cam. Tab. Clus. Creticum annuum hæmatodes, Lob.

Gladiolus floribus uno versa dispositis, C.B. Schwertel, *Gladiolus*, Dod. Narbonensis, Lob. Germanicus, Tab. Victoralis rotunda, Eyst. *Gladiolus bulbosus*, quorundam. Adest procerior, & humilior: flore rubro, candicante, & purpureo.

Gladiolus foetidus, C.B. Stinckend Schwertel. *Spatula foetida*, Tab. Dod. Trag. Fuch. *Xyris*, Matth. Lob. *Gladiolus tuberosus*, aut geniculatus, quorundam.

Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica, C.B. Süßholz / Leckrize, *Glycyrrhiza*, Fuch. siliquosa, Lob. altera, Matth. vulgaris, Dod.

Glycyrrhiza sylvestris floribus luteopallescentibus, C. B. * Wild Süßholz. *Glycyrrhiza sylvestris*, Cam. *Fœnum græcum sylvestre*, Trag. *sylvestre primum*, Dod. *Glaux vulgaris*, Lob. Clus.

Gnaphalium vulgare majus, C. B. * Groß Ruhrkraut. *Gnaphalium vulgare*, Matth. Lob. Tab. *Filago*, Dod.

Gnaphalium medium, C. B. * & Tab. Mittel Ruhrkraut. *Filago minor*, Dod. Lob. ic.

Gnaphalium latifolium Americanum, C. B. Americanisch Ruhrkraut. *Gnaphalium Americanum argyrocome*, Clus. *latifolium peregrinum*, Eyf. *Centunculus Americanus*, & *Centuncularis*, quorundam.

Gnaphalium montanum flore rotundiore, C. B. Berg-Ruhrkraut. *Gnaphalium montanum album*, & *purpureum*, Lob. Tab. *montanum variegatum*, Eyf. *Lagopus secundus*, Trag.

Gossypium frutescens semine albo, C. B. Baumwoll. *Gossypium*, Dod. Lob. Tab. *Xylon sive Gossypium*, Matth. *Bombax officinarum*.

Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis, C. B. * Hundsgraß/ Pehden/ Quecken/ Graßwurz. *Gramen*, Dod. Ruell. *caninum*, Tab. *canarium medicatum*, Lob.

Gramen caninum supinum minus, C. B. * Liegend Hundsgraß. *Gramen caninum supinum*, Lob. ic. *caninum supinum secundum*, Tab.

Gramen tremulum majus, C. B. Zitter Graß.
Gra-

Gramen leporinum & tremulum, Tab. Phalaris pratensis minor, Lob. ic. Amourettes tremblantes, Clul.

Gramen pratense paniculatum molle, C. B.* Weich wiesen Straußgras. Gramen paniculatum molle, Lob. adv. part alt.

Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio, C. B.* Groß wiesen Straußgras. Gramen pratense primum, Dod. pratense vulgatus, Lob. alterum & vulgare, Tab.

Gramen panicula multiplici, C. B.* Wiesen-
gras mit vielfachen strausse. Gramen minus duriusculum, Tab. Describitur etiam in Prodr.

Gramen segetum altissimum panicula sparsa, C. B.* Hoch Ackergras mit flattrigem strausse. Gramen segetum panicula speciosa latiore, Lob. ic. Gramen segetale, Tab.

Gramen segetum panicula arundinacea, C. B.* Ackergras mit einem Rohrstrausse. Gramen pratense tertium, Dod. harundinaceum arvense, Tab. Agrorum venti spica, Lob. ic.

Gramen paniculatum folio variegato, C. B. Straußgras mit gestreiften oder bunten blettern. Gramen Hispanicum, vulgi. striatum, Lon. pictum, Tab. sulcatum, Lob. ic.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica, C. B.* Schwimmend Wassergras. Gramen fluviatile, Tab. aquis innatans, Lob. ic.

Gramen typhoides molle, C. B.* Kolbengras.

Gramen alopecuroides, Lob. ic. *alopecurinum primum*, Tab.

Gramen phalaroides spica molli, sive *Germanicum*, C.B. * Graß mit weichen Canarien ähren. Est vigesimum septimum in Prodr.

Gramen alopecuros minor spica longiore, C.B. * Fuchschwanz. *Alopecuros*, Tab. *Cauda vulpina* *Monspeliensium*, Lob. ic.

Gramen pratense tomentosum panicula sparsa, C.B. * Stachßgras. *Gramen tomentosum* & *Linagrostis*, Tab. *eriphorum*, Dod. *Juncus bomycinus*, Lob. ic.

Gramen sparteum pennatum, C.B. * Sedergras. *Gramen nonum vel junceum*, Dod. *plumeum*, vulgi. *Spartum Austriacum pennatū*, Clus. *Juba* in nostrate est candida. pennarumq; manucodiatæ æmula adeo, ut primū aspicientibus imponat. Prope urbem extra portam S. Georgii sponte nascitur: ob elegantiam tamen colitur etiam in hortis.

Gramen junceum folio articulato sylvaticum, C.B. * Wald Binsengras. *Gramen junceum primum vel sylvaticum nemorosum*, Tab.

Gramen junceum folio articulato aquaticum, C.B. * Wasser Binsengras. *Gramen aquaticum*, Tab. *aquaticum alterum*, Lob. ic.

Gramen cyperoides latifolium spica rufa, sive *caule triangulo*, C.B. * Breit Cypergras. *Gramen cyperoides*, Lob. Tab. *Graminis quartum genus*, Trag.

Gramen cyperoides angustifolium spinis longis erectis, C.B. * Schmall Cypergras. *Gramen palustre majus*, Lob. ic.

Gramen cyperoides palustre majus spica divisa, C.B. * Sumpffig Cypergras. *Gramen cyperinum palustre minus*, Tab. cyperinum parvum aquaticum, Lob. ic.

Gramen cyperoides miliaceum, C.B. * Hirsen Cypergras. *Cyperus graminea*, Lob. ic.

Gramen arundinaceum spica multiplici, C.B. * Rohrgras. *Gramen arundinaceum majus*, Tab. Calamagrostis, Lob.

Gramen hirsutum latifolium majus, C. B. * Haaricht Gras. *Gramen hirsutum nemorosum* Lob. ic. sylvaticum quartum sive pilosum, Tab.

Gramen dactylon esculentum, C.B. * Schwadengras. *Gramen mannae*, Matth. mannae primū, Dod. Tab. mannae esculentū, Lob. Copiose in paludosis, praesertim circa Culstrinum & Spandoviā provenit: Seri tamen potest quoq; in usum culinæ, si cum lacte coquatur, optimi saporis pulmentū præbet, & nostratib; admodū familiare. Spontanei nostri semen flavet: culti vero semen, quod ex Misnia quandoq; adferretur, albicat, & bonitate saporis alteri tantillū cedit.

Gramen dactylon folio latiore, C.B. * Falsch Schwadengras. *Ischaemon primum*, Tab. vulgare Lob. Plinii, Clus. Sanguinaria Nevenaræ, Trag.

Gramen paniceum spica aristis longis armata, C.B.

C. B. * Senichgras. Gramen paniceum secundum, Tab. Panici effigie gramen aristis circumvalatum, Lob. ic.

Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa,
C. B. * Baldgras mit flattrigem Hirsenstrauße.
Gramen miliaceum, Lob. ic. Tab. pratense quartum, Dod.

Gramen Sorghi panicula erectum, C. B. * Sörgengras. Gramen sorghinum, Tab. sorghi effigie, Lob. ic. pratense quintum, Dod.

Gramen hordeaceum minus & vulgare, C. B. * Gerstengras. Hordeum spurium, Tab. spontaneum spurium, Lob. sive triticum murinum, Dod.

Gramen loliaceum spica longiore, C. B. * Sulchgras. Lolium, Matth. Dod. Tab. Lolium & triticum temulentum, Lob. Zizanium, Constant.

Gramen Parnassi albo simplici flore, C. B. * Leberblümlein. Gramen Parnassi, Dod. Eyst. hederaceum, Tab. Gramen Parnassi hederaceum recentiorum, Lob.

Gratiola centauroides, C. B. * Wild Aurin/Grazede. Gratiola, Matth. Dod. Lob. Tab. Gratiola Dei, quorundam.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris, C. B. Kleine Stachelbeer. Grossularia vulgaris, Clus. Uva crispa, Dod. Lob. Tab. Uva spina, Matth.

Grossularia spinosa sativa, C. B. Grosse Spina

nische Stachelbeer. *Grossularia majore fructu*, Clus. Fructus maturi flavent.

Grossularia spinosa sativa altera folijs latioribus, C. B. Braune Stachelbeer. *Grossularia fructu obscure purpurascete*, Clus.

Grossularia acinis hirsutis. Kaubbeer. C. B. videtur hanc ad priorem retulisse.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, C. B. Rothe Johannesbeer. Ribes, Officin. vulgaris domestica, Matth. Arabum, Lob. vulgaris fructu rubro, Eyst. Ribesium fructu rubro, Dod.

Grossularia hortensis majore fructu rubro, C. B. Eine grosse art rothe Johannesbeer. Ribes major fructu rubro, Eyst. rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus.

Grossularia hortensis fructu margaritis simili, C. B. Weisse Johannesbeer. Ribes fructu albo, Eyst. vulgaris fructu albo, Clus.

Grossularia vulgaris fructu dulci, C. B. & Clus. Susse Johannesbeer / Kleine Rosinen vulgo: non tamen sunt Passulae minores, quippe quae in Vite nascuntur. Ribes minor fructu dulci, Eyst. candidioribus foliis, Lob.

Grossularia non spinosa fructu nigro, C. B. Albesinge / Alandbeer / ob odorem Helenii amulum. Ribes nigra, Lob. ic. Tab. vulgaris nigro fructu, Clus. fructu nigro, Eyst. Ribesium fructu nigro, Dod. Rustici in vino ardente macerant baccas. & contra calculum utuntur.

Ha-

Halimus seu Portulaca marina, C.B. Meer-Portulac. Halimus vulgaris, Matth. Eyst. Portulaca marina, Dod. Lob. Tab.

Hedera arborea, C.B. Ephew/Alaub. Hedera, Dod. arborea, Matth. corymbola communis; Lob. Tab.

Hedera terrestris, C.B. * Matth. Dod. Tab. Gunderman/Gundelrebe/Snudedrage. Humilis hedera & Corona terræ, Lob. Chamæcissos, Trag. Fuch. Hujus foliis frequenter adnascitur Excrementum pilulare passim quidem, sed nominatim ad fundamenta ædiculæ, in qua ardeæ aluntur in vivario urbi vicino. Pilularum aliæ nucem juglandē parvam æquant, aliæ sunt minores, non raro binæ coaluerunt. In singulis ramis unicum, quandoque duo folia occupantur ab hoc excremento. Continent vero in se pilulæ singulæ binas aut ternas aliæ per filamenta duriuscula connatas, quarum singulæ cultro apertæ includunt singulos vermiculos sive tarmites. Color pilularum exterior est ex viridi albescens, interdū rufescens: interior ex albidus. Hederam hanc cum suo excremento delineari, & forsā primus curavit Leonhardus Turneisserus; quam iconem videre licet sub numero 709. Herbarii Portatilis, quod non ita pridem in lucem produxit Exc. D.D. Thomas Pancovius Collega noster perquam honorandus.

Helenium vulgare, C.B. * Alaud/Alaunwurzel. Helenium, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst. Inula, & Enula campana, vulgi. He.

Helenium Indicum maximum, C. B. Grosse Sonnenblume. Corona Solis secunda, Tab. Solis flos Peruvianus, Lob. Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Flos Solis major, Eyst.

Helenium Indicum ramosum, C. B. Sonnenblume mit ästen. Corona Solis quinta, Tab. Flos Solis prolifer, Eyst. Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.

Helenium Indicum flore parvo. Kleine Sonnenblumen. Id nomen indidimus plantæ, quæ apud nos jam vulgaris, & Bauhino prætermissa videtur. Facie externa sequens Helianthemum refert, at in cacumine flores luteos exiguos plures gerit, & radice tuberosa destituitur. Folia sunt angusta, rigidiuscula: caulis rubet.

Helenium (Helianthemum) *Indicum tuberosum*, C. B. Knollen/Erdsarschocken. Chrysanthemum latifolium Brasilianum, Eid. in Prodr. Flos Solis Farnesianus sive Aster Peruvianus tuberosus, Columnæ. Adenes Cadanenses seu Flos solis glandulosus, Lauremb.

Helichrysum seu *Stæchas citrina angustifolia*, C. B. * Rheinblumē/Winterblumen/ gelbe Katzenpöten. *Stæchas citrina*, Matth. Dod. Coma aurea, Lob. ic. *Chrysocome prima vulgaris*, Clus.

Helleborus niger hortensis flore viridi, C. B. Schwarz Niesewurz mit grünen blumen. *Helleborastrum*, Lob. *Elleborus niger alter*, Matth. *Veratrum nigrum secundum*, Dod. Tab. Clus.

Clus. Circa festum Nativitatis Domini, aut Januario subsequente flores promit.

Helleborus niger flore roseo, C. B. Schwarz Niesewurz mit rosenblumen. Heleborus niger, Lob. niger legitimus, Eyft. Elleborum nigrum Matth. Elleborus niger legitimus, Clus. Veratrum nigrum primum, Dod. Stiriacum, Tab.

Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore, C. B. * Schmalblettrige Niesewurz. Helleborus Hippocratis, Tab. niger ferulaceus Theophrasti, Lob. Pseudohelleborus niger, Eyft. Pseudoelleborum, Matth. Buphthalmum, Dod. Clus. Copiose prope Francofurtum auff den Jebusischen bergen.

Helleborus albus flore subviridi, C. B. Weiße Niesewurz. Helleborum album, Matth. Lob. Elleborus albus, Clus. floribus herbaceis, Eyft.

Helleborine latifolia montana, C. B. * Wilde Niesewurz mit breiten blettern. Helleborine, Dod. Lob. prima, Tab. recentiorum secunda, Clus. Epipactis latifolia, Eyft.

Helleborine flore rotundo, sive Calceolus, C. B. * Wilde Niesewurz oder Frauenfchuch. Elleborine recentiorum prima, Clus. Calceolus Mariæ, Lob. Eyft. Marianus, Dod.

Herba mimosa, viva, sensitiva. Süßlindes Kraut/ quoniam manu contacta marcescit: ablata manu revirescit. Sationem hujus frustra superioribus annis tentavimus: meliorem hoc ipso successum speramus.

He-

Hesperis hortensis, C. B. Abendviolen. *Hesperis* tertia, Clus. *Viola matronalis*, Dod. five *Damalcena*, Lob. Adelt flore albo, & dilute purpureo.

Hesperis montana pallida odoratissima, C. B. Fremde Abendviolen. *Hesperis* prima & montana, Clus. *pannonica*, Cam. Floris color in nostra obsoletus, crebris venis ex atro purpureis discurrentibus. *Viola noctis* in specie dicitur *Hortulanis*, quia odor sub vesperam magis intenditur.

Hieracium majus folio Sonchi vel sonchites, C. B. * Habichkraut mit Hasenfohl blettern. *Hieracium majus*, Matth. Lob. *Taraxacon majus*, Lon.

Hieracium dentis leonis folio obtuso majus, C. B. * Habichkraut mit Pfaffenblats blettern. *Hieracium macrorrhizon*, Tab. longius radiculatum, Lob.

Hieracium Chondrilla folio glabro radice succisa majus, C. B. * Habichkraut mit Chondrillen blettern. *Hieracium minus*, Matth. Tab. minus pramorsa radice, Lob. quartum, Dod.

Hieracium capitulum inclinans semine adunco, C. B. Habichkraut mit hangendem gipffel. *Hieracium facie hedypnois*, Lob. ic.

Hieracium filiqua falcata, C. B. Habichkraut mit sichelformigen schoten. *Hieracium Narbonense falcata filiqua*, Lob. *Monspeliacum* & *Narbonense*, Tab. *Cichorium stellatum Creticum*, Hort. Pat.

Hieracium proliferum falcatum, C. B. Habichtsfraut mit sichelformigen schoten und nebenblumen. *Hieracium calyce barbato*, Col. Flos luteus fusca macula in medio notatur.

Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti, C. B. Rauch Habichtsfraut mit knöpffflein als Cardobenedicten. *Hieracium echioides*, Tab. Buglossum luteum, Cam. echioides luteum Hieracio cognatum, Lob. ic.

Hieracium murorum folio pilosissimo, C. B. * Harichtes Habichtsfraut. Auricula muris major, Trag. Pulmonaria Gallorum flore Hieracii, Lob. Claf. Pulmonaria Gallica mas aut aurea, Tab.

Holosteo affinis, Cauda muris, C. B. * Meusefchwanz. Cauda muris, Dod. Lob. Tab. Myosuros, quorundam, Coronopus sylvestris, Trag.

Hordeum distichon, C. B. Grosse Gerste. Hordeum trimestre minus, Tab. binis versibus, Matth. quod spica binos ordines habet. Huic grana majora, aristæ vero breviores.

Hordeum polystichum vernal, C. B. & Lob. ic. Kleine Gerste. Hordeum polystichum æstivum, & trimestre polystichum, Tab. Spica quaternis, quinis, vel senis ordinibus est instructa: aristæ longiores, grana vero minora sunt, quam in precedente: pro cerevisia quoque coquenda magis apud nos expetitur, quam illa. *Præcox & serotinum*, Frühh uñ späte Gerste/non differunt nisi sationis diverso tempore, nimirum circa festum Annunciationis, &
Ur.

Urbani: Hordeum vero *hybernū* Winter-Gerste/ quod scilicet ante hiemem seritur, in quibusdam locis Poloniæ vñ inæ coli consuevit, apud nos vero non item. Hordeum *mistum*, Mang-Gerste, dicitur mistura ex granis Hordei distichi & polystichi confusis.

Horminum Sclarea dictum, C. B. Gemeine Scharley. Horminum hortense, Eyf. sylvestre primum, Clus. Scarlea, Lob. Sclarea, Matth. Orvala, Dod.

Horminum sativum, C. B. Garten Scharley. Horminum, Matth. Lob. Dod. Tab. minus, Lon. Huic coma foliorum purpurascit plerumque: interdum cærulea est, aut carnei coloris.

Horminum pratense folijs serratis, C. B. * Wiesen Scharley. Horminum sylvestre, Lob. Hormini quarti species prima, Clus. Sclarea sylvestris, Tab. Orvalæ sylvestris species quarta, Dod. Salvia agrestis flore purpureo, & Colus Jovis, Eyf.

Hyacinthus comosus major purpureus, C. B. Flattriger Hyacinth. Hyacinthus, Matth. maximus, Tab. comosus major, Lob. comosus spurius, Eyf. Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

Hyacinthus racemosus cæruleus major, C. B. Grosser blauer Trauben-Hyacinth. Hyacinthus botryoides major, Eyf. botryoides cæruleus major, Tab. botryoides cæruleus amœnus, Lob. ic.

Hyacinthus racemosus albus, C. B. Weißer Trau-

Trauben-Hyacinth. *Hyacinthus botryoides lacteus*, Tab. botryoides flore albo, Clus. Eyst. *Dipcadi candidis floribus*, Lob.

Hyacinthus racemosus caeruleus minor juncifolius C. B. Kleiner blauer Trauben-Hyacinth. *Hyacinthus racemosus*, Dod. botryoides vulgaris, Lob. ic. botryoides primus & minor, Clus. caeruleus minor vel sextus, Tab.

Hyacinthus racemosus moschatus, C. B. Moschriechender Trauben-Hyacinth. *Hyacinthus spurius recentiorum alter*, Dod. botryoides Chalcedonicus muscatus, Tab. Muscari obsoletiore flore, Clus. Muscari majus obsoleto albo flore, Eyst. *Dipcadi Chalcedonicum & Italorum*, Lob. Bulbus vomitorius, Matth.

Hyacinthus corniculatus flore muscoso. Schönerer Hyacinth. Flores sunt valde exigui, dense positi, & fere muscosi, coloris ex caeruleo albicantis, aut obsoleti. Extenduntur tandem in spicas, aut cornua quasi: unde corniculata hæc species merito appellari potest, quam C. B. præterisse videtur.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus major, C. B. Hyacinth mit länglichen blauen blumen. *Hyacinthus Hispanicus*, Clus. non scriptus, Dod. Anglicus, Eyst. Anglicus & Belgicus, Lob.

Hyacinthus orientalis caule maculato, C. B. Orientalischer Hyacinth mit fleckigem stengel. *Hyacinthus orientalis*, Matth. Dod. Clus. caeruleus, Tab. Eyst. orientalis Græcus, Lob.

Hy-

Hyacinthus orientalis caule folioso, C. B. Orientalischer Hyacinth mit blettrigem stengel. *Hyacinthus Asiaticus phyllophoro caule*, Clus. cur. post.

Hyacinthus orientalis maximus, C. B. Grosser Orientalischer Hyacinth. *Hyacinthus Orientalis major*, Dod. *orientalis major polyanthos*, Lob. *Tab. orientalis polyanthos*, Clus. *orientalis alter*, Matth.

Hyacinthus orientalis albus primus, C. B. Orientalischer Hyacinth mit weissen blumen. *Hyacinthus orientalis albus*, Lob. *ic. niveus*, Clus. Eyft.

Hyacinthus orientalis flore duplici, C. B. & Eyft. Orientalischer Hyacinth mit gedoppelten blumen. *Hyacinthus flore duplici ex albo virecente*, Clus. cur. post.

Hyacinthus orientalis flore ceruleo pleno, C. B. & Eyft. Orientalischer Hyacinth mit gefüllten blumen.

Hyacinthus orientalis serotinus, C. B. Später Orientalischer Hyacinth. *Hyacinthus orientalis serotinus mixtus*, Eyft.

Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus, C. B. Gestirneter Hyacinth mit zwey blettern. *Hyacinthus albicans seu foemina*, Fuch. *Hyacinthi Germanici liliflori minor species*, Lob. *Narcissus caeruleus*, Trag. *Bulbus vomitorius*, Lon.

Hyacinthus stellaris trifolius, C. B. Gestirneter Hyacinth mit drey blettern. *Hyacinthus Fuchsii*,

Dod. stellatus, Clus. stellatus flore cæruleo, Eyst. Germanicus liliflorus stellaris vel Flos Martius stellatus Germanicus, Lob.

Hyacinthus stellaris autumnalis major, C. B. Gestirneter Herbst-Hyacinth der grosse. Hyacinthus autumnalis major, Clus. Lob. Dod. stellatus autumnalis angustifolius major, Eyst.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor, C. B. Gestirneter Herbst-Hyacinth der kleine. Hyacinthus autumnalis, Lob. autumnalis minor, Dod. Clus. Eyst.

Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus, C. B. Indianischer Hyacinth mit zwieblicher wurzel. Hyacinthus stellatus Peruanus, Clus. Eyst. Lob. adv. part. sec. Adest flore cæruleo, & flore albo.

Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi, C. B. Indianischer Hyacinth mit knolliger wurzel. Hyacinthus Indicus tuberosa radice, Robin. major Indicus tuberosa radice, Swertii. Flos albicans mense demum Octobri aut Novembri prodit, gratissimum spirans odorem.

Hyoscyamus vulgaris vel niger, C. B. *Bilsenfraut. Hyoscyamus, Matth. vulgaris, Eyst. niger, Dod. Lob. niger vulgaris, Clus. primus, Tab.

Hyoscyamus albus major, C. B. Weiß Bilsenfraut. Hyoscyamus tertius, Diosc. quartus, Plin. albus, Matth. Dod. Lob. Eyst. secundus, Tab.

Hyoscyamus Creticus luteus, C. B. Gelb Bilsenfraut aus Creta. Hyoscyamus Creticus, Clus.

Hy-

Hypericum vulgare, C.B.* Johanneskraut.
Hypericum, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. Herba
perforata, Trag.

*Hypericum bifolium glabrum non perfora-
tum*, C. B.* Harthem. Hypericum in dumetis
nascens, Trag. Ascyrum, Matth. ep. Androsæ-
mum, Fuchf.

Hyssopus officinarum cærulea, sive spicata,
C.B. Blauer Ysop. Hyssopus, Tab. flore cæruleo,
Eyft. vulgaris, Dod. Clus. Arabum, Lob. Hyssop-
um, Matth.

Hyssopus vulgaris alba, C. B. Weißer Ysop.
Hyssopus flore albo, Cam. Eyft. albis floribus u-
trinque digestis, Lob. ic.

Hyssopus flore rubro, C.B. Rother Ysop. Hyf-
sopus Arabum, Tab. Arabum flore rubro, Lob.
Cam. Eyft.

Hyssopifolia, C.B.* Gras-Ysop/Gras-Polen/
Cord. ob. Hyssopoides, Cam. Gratiola minor,
Ges.col. Nostræ flores cærulei.

Jacea nigra pratensis latifolia, C.B.* Schwarz-
liche Glockblume mit breiten blettern. Jacea nigra,
Tab. nigra flore purpureo, Eyft.

Jacea nigra laciniata, C. B.* Schwärzliche
Glockblume mit außgeschweifften blettern. Jacea
nigra, Dod. vulgaris, Lob. Austriaca sexta, Clus.

Jacea incana cyani capitulis, C. B. Grawe
Glockblume. Jacea incana altera Cyaniaut Jaceæ
capitulis, Adv. Stoebe incana altera, Lob. ic.

Jacea olea folio capitulis simplicibus, C. B. Glockblume mit oel-blettern. *Parmica altera*, Matth. *Austriaca*, Lob. Clus. Dod. Cam.

Jacobaea vulgaris laciniata, C. B. * Jacobs-
fraut. *Jacobæa*, Dod. *vulgaris*, Clus. *Jacobæa Senecio*, Lob. *Herba Jacobæa*, Tab. *Senecio major si-
ve Flos S. Jacobi*, Matth.

Jacobaea maritima, C. B. Wollich Jacobs-
fraut / Aschfraut. *Jacobæa Pannonica prima*,
Clus. *Erigerum tomentosum alterum*, Lob. *Ci-
neraria*, Dod.

Jasminum vulgatius flore albo, C. B. Gemeis-
ner Jasmin. *Jasminum*, Dod. *album*, Tab. *flore
albo*, Eyst. *Gelseminum*, Matth. *vulgatius*, Lob.

Jasminum humilius magno flore, C. B. Spa-
nisch Jasmin mit grossen blumen. *Jasminum can-
diflorum*, Tab. *Gelseminum Catalonicum*, Eyst.
Chamægelseminum grandiflorum, Lob.

Jasminum luteum odoratissimū, C. B. Jasmin
mit gelben blumen. *Jasminum luteum*, Tab. Lob.
ic. *flore luteo*, Eyst. *Gelseminum luteum*, Adv.

Jasminum humilius luteum. Gelber wolrie-
chender Jasmin. *Gelseminum Indicum luteum
odoratissimum*, Ferrar.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum,
C. B. Rauten-Jasmin. *Polemonium Monspelien-
sium*, Lob. Cam. *Trifolium fruticans*, Dod. Tab.

Jasminum folijs laciniatis flore cæruleo. Bla-
wer Jasmin. *Jasminum Persicum flore cæruleo*
leu

feu Lillach folio inciso Cornuti, Hort. Lugd. & Grœning. An Ligustrum foliis laciniatis, C. B.

Jasminum millefolij folio, C. B. Quamoclit, Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Ponæ Ital. Quamoclit, Cam. sive Jasminum Americanum, Clus. cur. post. Sub climate nostro difficulter educatur.

Ilex aculeata cocciglandifera, C. B. Chermesbaum, Scharlachbaum. *Ilex coccifera*, Tab. coccigera, Clus. minor coccigera, Dod. Coccus infectoria, Lob. Coccum infectorium, Matth. Eleganter & ante hac non visam his locis arbusculam inter alia rariora ex Brabantia accipiebat Ao. 1658. Hortus Elect. Berolinensis aulicus.

Ilex aculeata baccifera folio sinuato, C. B. * Hüßl/Steckpalmen. *Ilex aquifolia*, Lon. Aquifolium, Matth. Lob. Tab. Agrifolium, Dod. Viret perpetuo, & ad sepimenta horti aptissima.

Imperatoria major, C. B. Meisterwurz. Imperatoria, Matth. Lob. Tab. Astrantia, Dod. Clus. Ostrutium, Lon.

Intybus sativa latifolia, sive Endivia vulgaris, C. B. Breite Endivien/Winter-Endivien. *Intybus major*, Matth. *Intybum sativum*, Dod. *sativum latifolium*, Lob. *Intybus major sativa*, sive Cichorium domesticum, Tab. Seritur circa festum Joannis, & circa Jacobi transplantatur: at Sommer-Endivien est species Lactucæ.

Intybus sativa angustifolia, C. B. Schmale
 5 En

Endivien. Intubus sive Endivia minor, Matth. Intybus minor prima, & Intybum minus album, Tab. Seriola aut Endiviola, Adv. Hæc est Scariola Off. cujus semen recensetur inter quatuor femina frigida minora.

Intybus crispa, C. B. Matth. Tab. Krause Endivien. Seris sive Intybus crispa, Adv. Endivia Romana crispa, Cam.

Iris vulgaris Germanica sive sylvestris, C. B.* Blauwe Wold Iris mit gekneltzter wurzel / sive radice geniculata cujusmodi etiã sunt novem subsequentes. Iris sylvestris, Matth. Tab. cerulea, Dod. latifolia major vulgaris, Chus. nostras, Offic. Hujus in Medicina usus ad subducendas aquas. Sponte quidem crescit: sed in hortos translata, cultura speciosior redditur.

Iris hortensis latifolia, C. B. Garten Iris mit breiten blettern. Iris, Tab. Dod. domestica, Matth. vulgaris, Lob. latifolia vulgaris cærulea, Eyst.

Iris hortensis pallide cærulea, C. B. Garten Iris mit blaßblauen blumen. Iris latifolia major obsoleta, Chus. dilute cærulea involucro albo, Tab. cujus flores aquæ cyaneum colorem referunt, Dod.

Iris hortensis alba Germanica, C. B. Garten Iris mit weissen blumen. Iris alba, Tab. candida, Dod. vulgaris candidis floribus, Lob. ic.

Iris Susiana flore maximo ex albo nigricante, C. B.

C.B. Sussianische Iris. Iris latifolia major prima.
Clus. Chalcedonica variegata, Lob. Tab. Chalcedonica latifolia, Eyst.

Iris Asiatica cerulea polyanthos, C.B. Asiatische Iris. Iris latifolia major secunda, Clus. Dalmatica major, Tab. Lob. ic.

Iris biflora flore minore, odore lilij convallium, C. B. Zweymahl blühende Iris. Iris biflora Lusitanica, Lob. Dod. latifolia major, 22. Clus.

Chameiris flore purpureo flavescente, C. B. Zwerc Iris mit purpurgelben blumen. Chamæiris latifolia minor octava, Clus. Eyst.

Chameiris flore pallido & albo, C. B. Zwerc Iris mit blaß und weissen blumen. Chamæiris latifolia minor quarta, Clus. Huic similis Chamæiris latifolia minima, Eyst.

Chameiris flore luteo, vel candido, C. B. Kwerck Iris mit gelben oder glanzweissen blumen. Chamæiris lutea altera, Lob. ic. Iris minor lutea, Dod. Huc referenda Chamæiris flore argenteo, & flore candido, Eyst.

Iris bulbosa latifolia caule donata, C. B. Zwiebliche Iris mit breiten blettern. Iris Anglicana major flore violaceo, Eyst.

Iris bulbosa latifolia candida, C. B. Iris bulbosa Anglicana major flore candido, Eyst.

Iridis bulbosa angustifolia variorum colorum. Zwiebliche Irides mit schmallen blettern / vielerley farben.

Iris

Iris tuberosa folio anguloso, C. B. Knollige Iris mit eckigen blettern. *Iris tuberosa*, Lob. Eyst. *bulbosa præcox*, Clus. *tuberosa* obscure viridi colore, Suert. *Hermodystylus verus*, Matth. Tab.

Juncus acutus panicula sparsa, C. B. * Scharffe Binsen. *Juncus acutus*, Dod. *acutus vulgatus*, Lob. ic.

Juncus maximus sive Scirpus major, C. B. * Grosse glatte Binsen. *Juncus palustris major*, Trag. Tab. *grandis Holoschænos*, Dod. *aquaticus maximus*, Lob. ic.

Juncus levis panicula sparsa major, C. B. * Glatte Binsen mit flattrigem strausse. *Juncus levis*, Dod. *lævis vulgaris panicula sparsa*, Lob. ic.

Juncus levis panicula non sparsa, C. B. * Glatte Binsen mit gedrungenem strausse. *Juncus*, Matth. *lævis glomerato flore*, Lob. ic. *palustris minor*, Tab.

Juncus floridus major, C. B. * Blumen-Binsen. *Juncus floridus*, Matth. *cyperinus floridus*, Tab. *cyperoides paludosus*, Eyst. *cyperoides floridus paludosus*, Lob. *Gladiolus aquaticus*, Dod.

Juniperus vulgaris fruticosa, C. B. * Wachholder staude. *Juniperus*, Matth. Dod. Lob. *vulgaris*, Clus. *baccifera*, Tab.

Juniperus vulgaris orbor, C. B. * Wachholderbaum. *Juniperus vulgaris celsior & arborescens*, Clus. *major sativa*, Cast.

Lactuca sativa, C. B. Dod. Tab. Gemeine Lactuse. *Lactuca florescens*, Matth. La-

Lactuca crispa, C. B. Matth. Dod. Krause Lactuse. *Lactuca crispa prima & secunda*, Tab. tertia, Trag. *crispa non capitata*, Lob.

Lactuca folijs Endivia, C. B. Weiß Sommer Endivien. *Lactuca intybacca*, Endivien=Lattig/Tab. *Lactucæ quartum genus*, Matth. *Endivia major*, Trag. Lon.

Lactuca folio obscurius virente, semine nigro, C. B. Braun Sommer Endivien. *Lactuca secunda*, Dod. *Romana dulcior*, nigriore & *Scariolæ hortensis folio*, Lob. adv. *nigra*, Cæsalp. *Folia colligata*, ut *intybi* albescunt.

Lactuca folio oblongo. Lange Lactuse. An *Lactuca folio oblongo acuto*, C. B. *Vincienda hujus quoque folia*, sicut *Intybi*. Vulgo vocatur *Carpentin* oder *Capuzin=Lactuse*.

Lactuca capitata, C. B. Matth. Dod. Tab. Kopff=Lactuse. *Lactuca sessilis*, Lon Gesn. *capitata crispis bassicæ foliis*, Lob. obs. *caputia*, Cæsalp. Variat colore foliorum triplici: unde *Lactuca capitata alba*, Weiße Kopff=Lactuse: *flava*, Gelbe Kopff=Lactuse: *viridis*, Grüne Kopff=Lactuse. Illis semen album, huic nigricans est.

Lactuca capitata spadicea. Braune oder Spanische Kopff=Lactuse. *Lactuca maculosa*, C. B. *Romana*, Matth. *rubra*, Cæsalp. *fusci ac rubentis purpurei coloris*, Dod.

Lactuca prolifera. Vielsöpffige Lactuse. *Unicauli duo, tria aut quatuor capita innascuntur*. *Polycephalos* vocari posset.

La-

Lactuca sylvestris costa spinosa, C. B. * Wilde lactufe. *Lactuca sylvestris*, Matth. Dod. Seris domestica, Lob.

Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, C. B. * Taube Nessel mit rundlichen blettern. *Galeopsis*, Diosc. secunda, Tab. *Urtica non mordax*, Lob. *iners altera*, Dod. Floris color variat.

Lamium purpureum vel album non fœtens folio oblongo, C. B. * Taube Nessel mit länglichen blettern. *Lamium purpureum & album*, Tab. *Galeopsis*, Matth. vera *Dioscoridis*, Clus. *Urtica iners sive Lamium primum*, Dod. Flos colore variat.

Lamium folio oblongo luteum, C. B. * Taube Nessel mit gelben blumen. *Lamium luteum*, Tab. Lob. ic. Adv. *Galeopsis flore croceo*, Trag. *Urtica iners tertia*, Dod.

Lamium maximum sylvaticum fœtidum, C. B. * Grosse stinckende taube Nessel. *Urtica herculea*, Tab. sylvana, Lon. *Galeopsis legitima*, vel vera *Dioscoridis*, Clus.

Lamium montanum Melissæ folio, C. B. Taube Nessel mit Melissen blettern. *Melissa Fuchsi*, Cam. Eyf. *Melissophyllum Fuchsi*, Lob.

Lamium peregrinum sive Scutellaria, C. B. Fremde taube Nessel/Scutellaria genandt. *Scutellaria*, Cortusi. *Castida*, Columnæ. In Prodomo describitur.

Lapathum hortense seu Spinachia semine spinoso, C. B. Spinat mit stachlichem samen. *Spinacia*, Matth. Lob. *Spinachia*, Dod. Tab.

Lapathum hortense seu Spinachia semine non spinoso, C. B. Spinat mit glatten samen. *Spinachia nobilis & prima*, Trag. Hæc priore præstantior. Iconem exhibet Mattioli Bathini pag. 362. *Spinachia* verò *fragifera* est species *Atriplicis*.

Lapathum folio acuto plano, C. B. * Spitzes Mangolt oder Grindwurz / mit flachen blettern. *Lapathum acutum*, Lob. Dod. *Oxylapathum*, Matth.

Lapathum folio acuto crispo, C. B. * Spitzes Mangolt mit krausen blettern. *Lapathum acutum crispum*, Tab.

Lapathum folio acuto rubente, C. B. * Spitzes Mangolt mit rothen blettern. *Lapathum sanguineum*, Lob. *rubens*, Dod. *Sanguis Draconis herba*, Lon.

Lapathum minimum, C. B. * & Tab. Gar fleiner Mangolt. *Lapathum acutum minimum*, Lob. ic.

Lapathum unctuosum, C. B. * Smierig Mangolt / Guter Heinrich. *Bonus Henricus*, Matth. Tab. Trag. *Tota bona*, Lob. Dod.

Lapathum folio subrotundo, C. B. * Mangolt mit rundlichen blettern. *Lapathum folio minus acuto*, Lob. ic. *Hippolapathum sylvestre*, Tab.

Hip.

Hippolapathum latifolium, C.B. Münchrhabarbar. Hippolapathum, Matth. fativum, Tab. fativum latifolium, Lob. sive Rhabarbarum Monachorum, Dod. Cam. Patientia, vulgi. Adest forma foliorum tum longa, tum rotunda.

Lapathum Ægyptiacum lactescens siliqua Asclepiadis, C.B. Grosse Esula Indica. Apocynum Syriacum, seu Palæstinum, sive Ægyptiacum, Clus. Beidelsar, Alpin. Esula Indica communiter.

Lapathum Ægyptiacum sive Esula Indica minor. Kleine Esula Indica. Apocynum flore rubro umbellato, forte dici quoque posset. An hyemem apud nos, sicut antecedens ferat, nondum fuit tentatum.

Lapathum aquaticum folio cubitali, C.B.* Groß wasser Mangolt. Lapathum palustre prius, Tab. Hydrolapathum majus, Lob. Rumex palustris, Trag.

Lapathum aquaticum minus, C.B.* Klein wasser Mangolt. Hydrolapathum minus, Lob. Tab.

Lappa major, Arcium Dioscoridis, C.B.* Große Kletten. Personata, Lob. major, Matth. Bardana sive Lappa major, Dod. descr.

Lappa minor, Xanthium Dioscoridis, C.B.* Kleine Kletten. Xanthium, Matth. Dod. Tab. sive Strumaria, Lob.

Lathyris major, C.B. Springförner/quoniam semen maturum facile exsilit. Lathyris, Matth. Dod.

Dod. Catapaucia minor, Lob. Tab. Cataputia minor secunda, Trag. vulgaris, Tartago Hispanorum, Eyst.

Lathyrus sativus flore fructuq, albo, c. B. Same Platt-erbsen mit weissen blumen. *Lathyrus leguminosa angustifolia*, Tab. angustiore gramineo folio, Lob. *Aracus alter sive Lathyrus minor*, Dod. *Cicerula*, Lon.

Lathyrus sativus flore purpureo, C. B. Same Platt-erbsen mit purpurblumen. *Lathyrus flore purpureo*, Cam. *Aracus sive Cicera*, Dod.

*Lathyrus sylvestris major, C. B. ** Grosse wilde Platt-erbsen. *Lathyrus sylvestris*, Dod. *Clus. Lathyrus sylvestris*, Eyst.

Lathyrus angustifolius semine maculoso, C. B. Aegyptische Platt-erbsen mit scheckichten samen. *Cicerula Aegyptiaca*, *Clus. Aracus Hispanicus sive Lathyrus Aegyptiacus*, Cam. Huc referri debet *Lathyrus gramineus Montis Baldi*: semen enim huic similiter variegatum, licet paullo rotundius.

*Lathyrus arvensis repens tuberosus, c. B. ** Knollige Platt-erbsen. *Glandes terrestres*, *Clus. Terræ glandes*, Dod. Lob. *Chamaëbalanus*, Tab. *Apios*, Trag. *Pseudapios*, Matth. *Glans terræ & Pseudapios*, Eyst. An *Cicerula subterranea*, quorundā.

*Lathyrus sylvestris luteus foliis Viciae, C. B. ** Wilde Platt-erbsen mit wicken-blettern und gelben blumen. *Vicia*, Tab. *Legumen terræ glandibus simile*, Dod.

Lavandula latifolia, C. B. Spica oder Spica narde/Trag. Layandula, Dod. mas, vulgo. flore cæruleo, Eyst. altera longiore folio & spica, Clus. Nardus Italica, Matth. Lob.

Lavandula angustifolia, C. B. Lavendel/Trag. Lavendula, Matth. Lon. fœmina, vulgo. brevior folio & spica, Clus. Spica lavendula, Lob. Pseudonardus fœmina, Matth. Spica vulgaris flore cæruleo, Eyst.

Lavandula folio dissecto, C. B. Lavendel mit zerschnittenen bletteren. Lavandula secunda, Tab. multifido folio, Clus. Lob.

Laureola sempervirens flore viridi, C. B. Kellershals mit grünen blumen. Laureola, Dod. mas, quibusdam. Daphnoides, Tab. sive Laureola, Lob. Hæc hyeme reponenda, sequens in horto perdurat.

Laureola folio deciduo flore purpureo, C. B. Kellershals mit purpur blumen. Laureola fœmina & Mezereum, Off. Mesereum Germanicum, Lob. Daphnoides flore purpureo, Tab. Chamælea Germanica, Dod. Laureola, Eyst. Flores edit circa festum Nativitatis Dominicæ, aut menle Januario.

Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente, C. B. Zapffenkraut. Hippoglossum, Matth. Dod. Lob. Eyst. Uvularia, Lon.

Laurus vulgaris, C. B. Lorbeerbaum. Laurus, Trag. Lob. Eyst. tenuifolia, Matth. mas, Tab. altera species, Dod.

Lau-

Laurus sylvestris Corni fœminæ folijs hirsutis,
C.B. *Laurus Tinus.* Laurus tinus cœrulea bacca,
Adv. Lob. ic. Tinus primus, Tab. Clus.

Laurus Americana. Americanischer Lorbeer-
baum. In Brabantia vulgo Caneelboom appellant.
Superioribus annis alebatur quoque in Horto
Patavino, dicebaturque à Præfecto Excell. D. Ge-
orgio a Turre Laurus Mexicana. Mexicanam au-
tem vocari partem Americæ septentrionalem, no-
tum est satis.

Lens vulgaris, C. B. *Linsen.* Lens, Tab minor,
Lob Dod. vulgaris sive agrestis, Trag.

Lens major, C. B. & Tab. *Grosse Linsen.* Lens,
Matth. Lob. Italica, Cam. sativus & Lenticulæ al-
terum genus, Trag.

Lenticula palustris vulgaris, C. B. * *Wasser*
Linsen. Lenticula palustris, Tab. Trag. Lens palu-
stris, Dod. Matth. Lob.

Lenticula aquatica trisulca, C. B. * *Wasser*
Linsen mit dreyspitzigen blettern. Hederula palu-
stris, Tab. aquatica, Lob. ic.

Lentiscus vulgaris, C. B. *Mastrirbaum.* Len-
tiscus, Matth. Dod. Clus. Lob. Lon.

Lepidium latifolium, C. B. *Breites Pfeffer-*
fraut. Lepidium sive Piperitis, Trag. Matth. Lepi-
dium Aeginetæ, Tab. Plinii, Lob. Dod.

Lepidium Dentellaria dictum, C. B. *Dentella-*
ria oder Bleyfraut. Dentaria sive Dentillaria,
Lob. Plumbago, Clus. Tab. Molybdæna Plinii,
Cam. & Crepanella Italorum. H 2 *Leu-*

Leucoium bulbosum vulgare, C. B. Schneetropffen. *Leucoium bulbosum primū*, Tab. hexaphyllon, Dod. minus, Eyft. præcox majus, Clus. *Leuconarcissolirion paucioribus floribus*, Lob.

Leucoium bulbosum majus sive multiflorum, C. B. Grosse Schneetropffen. *Leucoium bulbosum serotinum*, Eyft. polyathemum, Dod. multiflorum, Tab. *Leuconarcissolirion pratense vernum*, Lob.

Leucoium bulbosum trifolium majus, C. B. Dreyblettrige Schneetropffen die grossen. *Leucoium bulbosum secundum*, Tab. præcox Byzantinum, Clus.

Leucoium bulbosum trifolium minus, C. B. Dreyblettrige Schneetropffen die kleinen. *Leucoium bulbosum triphyllon*, Dod. præcox minus, Clus. *Leuconarcissolirion minimum*, Lob.

Leucoium incanum majus, C. B. Graubleittrige Leucoje die grosse. *Leucoium album*, Matth. Lob. Tab. candidum majus, Dod. flore albo simplici, Eyft. *Viola cándida*, Trag.

Leucoium incanum purpureum vel rubrum, C. B. Graubleittrige Leucoje mit Purpurblumen. *Leucoium purpureum*, Tab. Matth. Flore rubro simplici, Eyft. *Viola purpurea*, Lob. Trag.

Leucoium incanum majus multiplex, C. B. Graubleittrige Leucoje die gefüllte. *Leucoium multiplici flore*, Dod. *Leucoium sive Viola purpurea flore pleno*, Lob. ic.

Leu-

Leucoium incanum majus variegatum pleno flore, C. B. Graubleittrige Leucoje mit gesprengter voller blume. *Leucoium sive Keyri viola purpurea variegata*, Suert.

Leucoium folio viridi album odoratissimum, C. B. Grünbleittrige Leucoje mit wolriechenden weissen blumen. *Leucoium fruticosum folio viridi flore albo odorato* Camerarii, Eyst.

Leucoium luteum vulgare, C. B. Einfache gelbe Viole. *Leucoium luteum*, Dod. Lob. aureum, Matth. sativum luteum, Clus. Flos Cheiri simplex minor, Eyst.

Leucoium luteum magno flore, C. B. Einfache gelbe Viole mit grossen blumen. Flos Cheiri simplex medius, Eyst.

Leucoium luteum pleno flore maj9, C. B. Grosse gefülte gelbe Viole/Gulden Lachen. *Leucoium flore luteo pleno majus*, Eyst.

Leucoium luteum pleno flore minus, C. B. Kleine gefülte gelbe Viole. *Leucoium luteum flore multiplici*, Dod. flore luteo pleno minus, Eyst. sive Keiri duplici flore, Lob. ic.

Libanotis latifolia altera, C. B. Hirschkraut/Hirschwurzel. *Libanotis Theophrasti*, Lob. alba major, Cervaria quorundam.

Lichen petraeus latifolius, sive *Hepatica fontana*, C. B. * Breiter Steinmoß. *Lichen*, Matth. Dod. primus, *Hepatica prima*, Tab.

Lichen petraeus stellatus, C. B. * Gestirnter Steinmoß. *Lichen secundus*, Lob. *Hepatica secunda*, Tab.

Lichen petraeus umbellatus, C. B. * Steinmoß mit dolden. *Lichen tertius*, Lob. *Hepatica tertia*, Tab.

Ligusticum vulgare, C. B. Liebstöckel / Lebstock. *Ligusticum*, Tab. *sativum*, Trag. *Levisticum*, Lob. *vulgare*, Matth. Dod. *Laserpitium Germanicum* quorundam.

Ligustrum Germanicum, C. B. Hartriegel / Rheinwende. *Ligustrum*, Matth. Lob. Tab. Eyst. *vulgare*, Trag. *Phyllirea*, Dod.

Ligustrum folio obtusiore. Rheinwende mit stumpffen blettern. A præcedenti non differt, nisi foliis minus acutis: potestque haberi pro illius solummodo varietate.

Lilium album flore erecto & vulgare, C. B. Weiße Lilie. *Lilium*, Matth. *album*, Trag. Fuch. Tab. Eyst. *candidum*, Lob. Dod.

Lilium album flore pleno spicato. Weiße Lilie mit gefülten blumen. Elegantissimi hujus lilii primum bulbum huc misit ante decennium Roma, deinde Argentoratum. Oneratur autem spica tot foliis, ut in cacumine posita explicari nequeant.

Lilium purpurocroceum majus, C. B. Purpursaffran Lilie die grosse. *Lilium purpureum majus*, Lob. Dod. Eyst. *aureum majus*, Tab. *Hemerocallis Dioscoridis*, Matth.

Lilium purpureocroccum minus, C. B. Purpuraffran Lilie die kleine. *Lilium purpureum minus*, Lob. *Dod. puniceum non bulbiferum minus*, Clus.

Lilium bulbiferum minus, C. B. Zwiebeltragende Lilie. *Lilium ctuentum bulbiferum*, Eyst. *purpureum tertium*, Dod. *cruentum quartum secundum caulem bulbulis donatum*, Lob.

Lilium floribus reflexis montanum, C. B. Purpurfarben Türckischer Bund. *Lilium sylvestre*, Dod. *montanum*, Lob. *montanum flore purpurascente punctatum*, Eyst. Martagon, Matth. Hoc in sylvis circa Furstenwalde etiam sponte provenit: magnitudine tamen hortensi multum cedit.

Lilium floribus reflexis albis non punctatis, C. B. Weiß Türckischer Bund. *Lilium montanum minus album non punctatum*, Eyst. *montanum albo flore*, Clus. Martagon imperiale niveum sine maculis, Bry.

Lilium Byxantinum miniatum polyanthos, C. B. Lichtrohter Türckischer Bund. *Lilium Byxantinum miniato saturatiore flore polyanthos*, sive Zufiniare, Clus. Chalcedonicum miniatum præcox, Lob. adv. part. 2. Byzantinum ferotinum, Eyst.

Lilium floribus reflexis flavum angustifolium, C. B. Gelber Türckischer Bund. *Lilium montanum flavo flore*, Lob. adv. part. 2. *montanum flore luteo punctatum & non punctatum*, Eyst. monta-

num flavo flore maculis distinctum & non distinctum, Clus.

Lilium sive Corona imperialis, C. B. & Lob. Keyserkrone mit einer reihe blumen. *Corona imperialis*, Dod. Tab. Eyst. Tufai sive *Lilium Persicum primum*, Clus. Flos communiter rubet: adest tamen etiam *Corona imperialis* flore luteo aut citrino potius, die gelbe Keyserkrone.

Lilium sive Corona imperialis flore pleno. Gefülste Keyserkrone. Singuli flores duodecim & pluribus foliis constant.

Lilium sive Corona imperialis multiflora latog; caule, C. B. Keyserkrone mit einem platten breiten stengel und vielen blumen. *Corona laticaulis*, Lob. adv. part. alt. *imperialis polyanthes*, Eyst. Tufai *polyanthes*, Clus. Talis proveniebat in horto Elect. Berolinensi aulico A. 1661. eratq; prorsus similis illi, quam pingit Hortus Eystetensis. Nostræ caulis duos transversos digitos latitudine æquabat: flores in vertice viginti perfecti, & quatuor imperfecti. P. Lauremberg l. 1. Horticult. c. 19. tales per artem fieri posse Coronas asserit. Ex observatione Clusii l. 2. Hist. plant. c. 1. istiusmodi Coronæ sequente anno ad ingenium redeunt, proferuntque caulem rotundum, cum ternis, senis, octonisve floribus: id quod & nostræ usu venit. Unde colligere licet, monstrum potius esse, ex abundantia materiæ natum, quam peculiarem speciem.

Lilium sive Corona imperialis duplici corona, C. B. Keyserkrone mit zwey reihen blumen übereinander. Corona imperialis florum classe duplici, Eyf. phoenicea duplici corona aut serie florum, Lob. ic.

Lilium persicum, C. B. Dod. Lob. Tab. Eyf. Persianische Lilie. Lilium Sufianum, Clus.

Lilium luteum asphodeli radice, C. B. Gelbe Asphodil-Lilie. Lilium non bulbosum luteum, Dod. Asphodelus liliaceus, Eyf. liliaceus luteus, Tab. Liliasphodelus luteo flore, Clus. Liriosphodelus luteus liliflorus, Lob.

Lilium rubrum asphodeli radice, C. B. Rote Asphodil-Lilie / Tage-Lilie. Hemerocallis quorundā. Lilium sativum, Eyf. non bulbosum obsoleto colore rubens, Dod. Liliasphodelus puniceus, Clus. Liriosphodelus phoeniceus, Lob. Asphodelus liliaceus rubeus, Tab.

Lilium convallium album, C. B. *Weisse Ma-Mayenblümlein / Lilien-Convallien. Lilium convallium, Trag. Matth. Dod. Tab. Clus. vel vernum Theophrasti, Lob. Copiosissime im Blumenthal.

Lilium convallium flore rubente, C. B. Rötliche Ma-Mayenblümlein. Lilium convalliū flore incarnato, Eyf. rubrum, Tab. floribus sive verubentibus, Lob. ic.

Lilium convallium minus, C. B. *Kleine Ma-Mayenblümlein / Einblat. Unifolium, Trag. Dod. Tab. Eyf. Monophyllon, Lob. Gramē Parnassi, Matth.

Limonium maritimum majus, C. B. Limonenkraut. Limonium, Matth. Lob. primum, Tab. Valerianæ rubræ similis, Dod. Behen rubrum, quorundam.

Limonium peregrinum folijs asplenij, C. B. Syrisch Limonium. Limonium peregrinum, Clus. cur. post. Syriacum, Eyst. Limonii elegans genus, Rauwolfii.

Linaria vulgaris lutea flore majore, C. B. * Gemein Glackskraut / Leinkraut. Linaria vulgaris, Trag. Eyst. prima, Dod. Osyris, Matth. Fuch. Lob. major, Tab.

Linaria folioso capitulo luteo major, C. B. Glackskraut mit blettrigen Knöpflein. Linaria aurea Tragi, Lob. Tab. Eyst. papposa, quorundam. Linosyris nuperorum, Lob. Osyris Austriaca, Clus.

Linaria purpurea major odorata, C. B. Glackskraut mit purpurblumen. Linaria carulea, Cam. altera purpurea, Dod. purpurea elatior, Eyst. Linariæ purpureæ varietas, Lob. Nostræ flos violaceus.

Linaria pumila supina lutea, C. B. * Klein niederliegendes Glackskraut. Linaria Hispanica quinta, Clus. Osyris minor, Tab. flava sylvestris, Lob. ic.

Linaria triphylla minor lutea, C. B. Dreyblettrig Glackskraut mit gelben blumen. Linaria Valentina, Dod. Lob. Hispanica prima, Clus.

Lin-

Lingua cervina officinarum, C.B. Hirschjung. Scolopendria vulgaris, Trag. Phyllitis, Matth. Dod. Lob. vulgaris, Cam. Clus. sive lingua cervina, Tab. Folia huic plana: sed invenitur etiam foliis per marginem crispatis.

Lingua cervina multifido folio, C.B. Gespalte-
ne Hirschjung. Phyllitis laciniata, Dod. Clus. foliis
laciniatis, Tab. multifido folio, Lob. mucronata,
Cam.

Linum sativum, C. B. Dod. Trag. Flachs. Li-
num, Matth. Fuch. Lon. vulgare caeruleum, Lob.

Linum sylvestre minus, C. B. * Wilder Flachs.
Linum sylvestre octavum, Clus. Chamælinum,
Lob. Chamælinum caeruleum, Tab.

Lithospermum majus erectum, C.B. Perlskraut/
ob formam seminis. Lithospermum legitimum,
Clus. arvense, Tab. minus, Matth. Dod. Lob. Mili-
um solis sativum, Trag.

Lithospermum arundinaceum, C. B. Mohrig
Perlskraut/quoniam folia ipsi arundinacea. Litho-
spermum majus, Trag. Lachryma Jobi, Clus. Dod.
Lob. Cam. Eyst.

Lithospermum arvense radice rubra, C. B. *
Perlskraut mit rohter wurzel. Lithospermum syl-
vestre, Trag. tertium, Dod. Anchusa arvensis mi-
nor facie Milii Solis, Tab. Anchusa degener facie
Milii Solis, Lob. ic.

Lotus hortensis odora, C. B. Siebenzeit/ Gar-
tenflee. Lotus sylvestris, Matth. urbana, Eyst. hor-
to.

torum odora, Lob. Melilotus vera, Tab. Trifoliū Dioscoridis, Trag. odoratum alterum, Dod. Ex femine deciduo annuatim se propagat: folia plantæ prorumpentis ad rotunditatem vergunt fere sine crenis, florētis vero sunt oblōga margine crenato.

Lotus pentaphyllos minor glabra, C. B. * Sünffblettriger Lotus der glatte. Melilotus coronata, Lob. Trifolium corniculatum primum, Dod. siliquolum minus, Tab.

Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliqua angustissima, C. B. * Sünffblettriger Lotus der rauhe. Trifolium corniculatū minus pilosū, Eid in Prodr.

Lotus siliquosus glaber flore rotundo, C. B. * Eischer Lotus. Lotus Lybica Dalechampii, Lugd. an Oxytriphylli genus, Clus. hisp.

Lotus ruber siliqua angulosa, C. B. Rothblühender Lotus mit eckigen schoten. Lotus siliquosus rubro flore, Clus. pulcherrima tetragonolobus, Cam. Eyst.

Lotus pentaphyllos vesicaria, C. B. Sünffblettriger Lotus mit blasen. Tritolium vesicarium, Clus. pan. halicacabum sive vesicarium, Cam.

Loto affinis Vulneraria pratensis, C. B. * Wundkraut dem Loto verwand. Anthyllis leguminosa, Lob. Clus. lenti similis, Dod. Lagopodion tertium, Tab.

Lotus Africana latifolia, C. B. Lotusbaum/vulgo Franzosen-holz. Lotus Africana altera, Matth. Pseudolotus Matthioli, Tab. Guajacana, Eyst. Guajacum Patavinum Fallopii, Lob. Lu

*Lunaria racemosa minor vel vulgaris, C.B. **

Mondkraut/Mondraute. Lunaria, Trag. Dod. minor, Matth. Lon. racemosa, Lob. botryitis, Cam. Thal. Eyft. botryitis minor, Clus. Ruta lunaria vel jecoraria, Tab.

Lupinus sativus flore albo, C.B. Weisse Feigbonen. Lupinus, Trag. Matth. sativus, Lob. Dod. albo flore, Clus. vulgaris, Eyft.

Lupinus sylvestris flore caruleo, C.B. Blaue Feigbonen. Lupinus sylvestris, Matth. Dod. sylvestris legeū flore purpureo, Lob. minor, Tab. sylvestris angustifolius flore caruleo, Eyft. Lupinum flore caruleo, Clus.

Lupinus sylvestris flore luteo, C.B. Gelbe Feigbonen / Gelänger je lieber. Lupinus luteus, Tab. flore luteo, Lob. flavo flore, Clus. sylvestris luteus odoratus, Eyft.

Lupulus mas, C.B. Hopffe. Lupulus, Matth. Dod. Clus. Tab. Lupus salictarius, & Vitis septentrionalium, Lob.

*Lupulus fœmina, C.B. * Cam. ep. & hort. Wilder Hopffe.* Hæc flores profert steriles, illa fructus folliculares.

Luteola salicis folio, C.B. Streichkraut. Luteola, Lob. Lutum herba, Dod. Catanance, Tab. Pseudostrophium, Matth. Eyft.

Lychnis hirsuta flore coccineo major, C.B. Scharlach-Lychnis. Lychnis Chalcedonica, Tab. Byzantina miniato flore, Clus. Constantinopolita,

na miniata, Lob. Flos Constantinopolitanus, Dod. miniatus, Eyft. Adest flore simplici, & flore pleno.

Lychnis coronaria Dioscoridis sativa, C. B. Einfache Kranz-Lychnis. Lychnis, Matth. coronaria, Lob. Dod. Rosa mariana sativa, Trag. Adest flore rubente, & flore albo.

Lychnis coronaria sativa multiplex, C. B. Volle Kranz-Lychnis. Lychnis coronaria floris foliolis multiplicatis, Dod. flore rubro pleno, Eyft. Lychnis altera rubra, Lob. ic.

Lychnis sylvestris alba multiplex, C. B. Weiß gefülter Wiederstoß. Lychnis sylvestris flore pleno albo, Eyft. alba sylvestris, Lob. ic. Ocymastrum multiflorum, Tab.

Lychnis sylvestris purpurea multiplex, C. B. Purpur gefülter Wiederstoß. Lychnis sylvestris flore pleno rubro, Eyft. agrestis multiflora, Lob. ic. Ocymoides flore pleno, Cam. ep.

Lychnis segetum major, C. B. * Rade. Lychnis arvensis, Tab. Nigellastrum, Dod. Pseudomelanthium, Matth. Lob. Vitium est frumentorum, præcipue Hordei.

Lychnis sylvestris, quæ Becc album vulgo, C. B. * Wald-Lychnis mit pausenden Kelchen / Sphspettel & Herba articularis, Tab. Lychnis sylvestris, Lon. Eyft. Papaver spumeum, Lob. Melandrium Plinii quorundam, Clus.

Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis, C. B. * Breitblettrige Wald-Lychnis mit
ge-

gestreiffen pausenden feldchen. *Lychnis sylvestris secunda*, Clus. *sylvestris tertia caliculis striatis*, Lob. Tab.

Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis, C. B.* Schmallblettrige Wald-Lychnis mit gestreiffen pausenden feldchen. *Lychnis sylvestris altera incana cauliculis striatis*, Lob.

Lychnis maritima repens, C. B. Kriechende Meer Lychnis. *Lychnis marina Anglica*, Lob. Tab. Flos ipsi carneus.

Lychnis viscosa montana alba latifolia, C. B. Breite Kleblychnis mit weissen blumen. *Lychnis sylvestris*, Tab. nona, Clus. flore albo, Eyft. Floris cuculi *sylvestris genus*, Trag. Folia cochleata sunt, & subhirsuta: caules admodum viscosi.

Lychnis viscosa rubra angustifolia, C. B.* Schmale Kleblychnis. *Lychnis sylvestris purpurea*, Tab. viscosa *sylvestris flore incarnato*, Eyft. *sylvestris quarta*, Clus. Adfuit etiam flore pleno.

Lychnis viscosa purpurea latifolia levis, C. B.* Breite Kleblychnis. *Lychnis sylvestris prima*, Clus. Viscaria sativa, Tab. Mulcipula flore rubro, Eyft. five *Armoraria altera*, Lob. Adest etiam flore albo.

Lychnis viscosa flore muscoso, C. B.* Kleblychnis mit Moßblumen. *Mulcipula altera flore muscolo*, Lob. *Selamoides magnum Salmanticum*, Clus. *Otites*, *Lychnidis sylvestris genus*, Tab.

Lysimachia lutea major, C. B.* Gelber Wendrich

rich der groſſe. *Lyſimachia*, Matth. lutea, Trag. Lob. Tab. Eyſt. lutea communis, Cluſ.

Lyſimachia lutea minor folijs nigris punctis notatis, C. B. Gelb Wenderich der kleine. *Lyſimachia lutea altera*, Cluſ. lutea pannonica major, Eyſt. flore luteo majore, Cam.

Lyſimachia lutea corniculata, C. B. Gelber Wenderich mit hörnern. *Lyſimachia Virginia-na*, vulgi.

Lyſimachia ſiliquofa hirsuta parvo flore, C. B. * Schoten Wenderich. *Lyſimachia ſiliquofa ſecunda*, Tab. Describitur etiam in Prodr.

Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia, C. B. * Chamænerion. *Lyſimachia vulgo altera*, Cam. Chamænerion, Eyſt. Filius ante patrem maximus, Gef. hör.

Lyſimachia ſpicata purpurea, C. B. * Aehren Wenderich mit purpurblumen. *Lyſimachia altera*, Matth. Eyſt. purpurea, Lob. Tab. purpurea communis major, Cluſ. *Pseudolyſimachium purpureum alterum*, Dod.

Lyſimachia ſpicata cærulea, C. B. * Aehren Wenderich mit blawen blumen. *Lyſimachia cærulea hortensis*, Lob. cæruleo flore, Cluſ. *Veronica recta cærulea*, Eyſt. In noſtrate flos ex cæruleo rubet.

Lyſimachia cærulea galericulata, vel *Gratiola cærulea*, C. B. * Helm Wenderich mit blawen blumen/Sieberkraut. *Lyſimachia galericulata*, Lob. Cluſ. *Tertianaria*, Tab. Ma-

Majorana vulgaris, C.B. Majoran. Majorana, Dod. five Amaracus major, Tab. Amaracus Matth. vulgator, Eyft. Sampsuchus, Lob. Lata admodum folia interdum profert, quæ est Majorana latifolia, Eyft.

Majorana hyemalis. Winter Majoran/quoni-
am hyemem perfert. Majorana sylvestris, Trag. syl-
vestris perennis, C.B. Origano cognata majora-
na major, Gef. hor.

Mali hortensis varia genera. Garten Aepffel.
Als: Borgstörffer/Grünäpffel/Härtlinge/Johan-
nes-äpffel/Jungfer-äpffel/Klapper-äpffel/Kant-
äpffel/Kreid-äpffel/Peppinger/Quitten-äpffel/
Kabauen aus Engeland/Reinetten aus Franc-
reich/Rosenhagener/Kostocker/Scheib-äpffel/
Striem-äpffel/Süß-äpffel/Weiden-äpffel/und
andere mehr arten. Est etiam genus malorum,
quod vulgo Mala decembria, Weinacht-äpffel no-
minant, rati hanc arborem nocte Nativitati Domi-
nicæ sacra, non obstante gelu, florere simul, & fru-
ctus ferre. Hac de re interrogatus à me per literas
Excell. Vir Mauritius Hofmannus Professor Al-
torfinus, respondit: Mitto simul in scatula ejusino-
di aliquot Mala, quorum quidem proventus supe-
riori anno 1662. ob intentissimum frigus fuit so-
lito parcior. Habeo autem illa non nisi pro fructi-
bus serotinis: siquidē etiam in Horto nostro Me-
dico adest Pyrus serotina, quæ mense Octobri
demum floret, fructus autem sub finem Novem-
bris

bris, adeoque circa Solstitium perficit. Cæterum Mala illa transmissa nihil habebant speciosi, sed erant sicca, corrugata, & tam exigua, ut nucem avellanam vix æquarent.

Mala sylvestria. *Wilde Aepffel/ Holz-Aepffel. Fructus sunt exigui, acerbi: arbusculæ vero juniores insitioni aptissimæ.

Mala armeniaca maiora, C. B. Grosse Marel-
ellen / Aprifosen / quasi præcocia, vel Bara-
cocca, Cæsalp. Malus Armeniaca major, Lob. Ar-
meniaca malus, Matth. Armeniaca majora, Tab.
Eylt. Horum magnitudo ex insitione.

Malus armeniaca minor, C. B. Kleine Marel-
len. Malus armeniaca, Dod. Lob. Armeniaca mi-
nora, Matth. Tab.

Mala cotonea minora, C. B. Kleine Quitten. Ma-
lus cotonea, Trag. Matth. cydonia, Tab. Mala ro-
tunda minora nonnullis chrysomela, Dod. Coto-
nea & Cydonia mala, Lob.

Mala cotonea majora, C. B. Grosse Quitten.
Mala cotonea oblongiora & majora, Dod. Stru-
thia & Pyra cotonea, Cast. Horum alia pyris,
alia malis assimilantur: inde nomina, Birnen-quit-
ten/ Aepffel-quitten.

Malus aurantia major, C. B. Pomeranze. Ma-
lus anarantia, Dod. Aurantia mala, Matth. Tab.
Arantia, Lob. Aureum malum, Clus. Pomum aran-
tium, Trag. Eylt.

Malus aurantia humilis, C. B. Zwerg-
Po

Pomeranzen. Aurea malus pumilio, Clus. Poma aurantia Nana dicta, Eyft.

Malus Adami, C. B. Adams Aepffel. *Malus Assyria*, Dod. Tab. Pomum Adami, Matth. Assyrium, Lob. Poma Adami quæ Gallis Ponzires, Clus. Lumia, Ferrar.

Malus limonia acida, C. B. Limonen. *Malus limonia*, Matth. Dod. Tab. Limones, Lob.

Malus medica, C. B. Matth. Lob. Dod. Citronen, *Malus medica seu citria*, Eyft. Citrus, Tab.

Malus medica maxima, pulpa plurima, C. B. Citronat. Ponzires, Cæsalp.

Malus punica sativa, C. B. Fruchtbar Granatenbaum. *Malus punica*, Trag. Matth. Dod. flore simplici, Eyft. granata, Tab. Malum punicum, Lob.

Malus punica sive Balaustia flore pleno minore, C. B. Balaustien. *Balaustium flore minore Romanum*, Eyft.

Malva sylvestris folio rotundo, C. B. * Pappefraut mit runten blettern / Käse-Pappel / Hasen-Pappel. *Malva*, Matth. *sylvestris minor*, Tab. *sylvestris pumila*, Dod. *sylvestris repens pumila*, Lob. Radix in bacillos scinditur digitorum longos: illis nonnulli vino intinctis dentes post pastum fricando purgare solent.

Malva sylvestris folio sinuato, C. B. * Pappe-

pelfkraut mit gebüßelten blettern. *Malva sylvestris major*, Tab. *sylvestris procerior*, Dod. *vulgaris procerior*, Lob.

Malva folijs crispis, C. B. Pappelfkraut mit krausen blettern. *Malva crispa*, Dod. Tab. Eyst. *crispatis oris*, Lob.

Malva folio vario, C. B. Pappelfkraut mit mancherley blettern. *Malva trimestris vel pumila*, Clus.

Malva rosea folio subrotundo, C. B. Einfache Rosenpappel/Herbst-rosen. *Malva rosea fruticosa*, Lob. *hortensis*, Trag. Dod. *major unicaulis* Matth. *arborea*, Tab. Adest flore candido, rubete, nigricante.

Malva rosea folio subrotundo, flore pleno, C. B. Gefülte Rosenpappel. *Malva rosea multiplex*, Lob. Tab. *hortensis multiplici flore*, Dod. Adest flore albo, incarnato, atrorubente.

Marrubium album vulgare, C. B. * Weißer Andorn/Gotteshülff. *Marrubium*, Matth. Dod. Lob. Tab. *vulgare*, Clus. Eyst.

Marrubium Cardiaca dictum, C. B. * Herzgespan. *Cardiaca*, Matth. Lob. Tab.

Marrubium palustre glabrum, C. B. * Glatt Wasser Andorn. *Marrubium aquaticum*, Trag. Dod. Lob. *Sideritis prima*, Matth. *Lancea Christi*, Ges. hor.

Marrubium palustre hirsutum, C. B. * Rauch Wasser Andorn, Primum est in Prodromo.

Mer-

Marrubium nigrum foetidum, C. B. * & Adv. Schwarz stinckender Andorn. *Marrubium majus* vel *primum*, Trag. *Marrubialtrum*, Tab. Ballote, Diosc. Matth. Fuch. Dod. Lob.

Marum mastichen redolens, C. B. Mastich-
fraut. *Marum*, Tab. peregrinum, Eyst. vulgare si-
ve *Clinopodium*, Dod. Mastic Gallorum & An-
glorum, Lob. *Sampsuchum verum*, quorundam.

Matricaria vulgaris, C. B. Mutterfraut. *Ma-
tricaria*, Trag. Dod. nostras, Lob. flore simplici,
Eyst. *Parthenium*, Matth. *Artemisia tenuifolia*,
Tab.

Matricaria flore pleno, C. B. Gefült Mutter-
fraut. *Matricaria duplici flore*, Lob. ic. pleno flo-
re, Eyst. *Parthenium pleno flore*, Clus. *Artemisia
tenuifolia flore pleno*, Tab.

Melampyrum purpurascence coma, C. B. *
Rühweizen mit purpurfarbenem gipffel. *Me-
lampyrum*, Lob. Tab. *Triticum vaccinum*, Trag.
Dod. Lon. *Parietaria sylvestris tertia*, Clus.

Melampyrum cerulea coma, C. B. * Rühweizen
mit blawen Gipffel. *Parietaria sylvestris*, Cam. syl-
vestris prima, Clus. Lipsensium, Trag.

Melampyrum luteum latifolium, C. B. * Gel-
ber Rühweizen. *Parietaria sylvestris*, Eyst. secun-
da, Clus. *Milium sylvaticum primum & secun-
dum*, Tab. *Cratægonon*, Lob.

Melilotus officinarum Germania, C. B. * Stein-
flee weiß/gelb/und purpurblaw. *Melilotus Ger-*

manica, Lob. flore luteo, Eyst. Lotus urbana, Matth. sylvestris, Tab. Sponte provenit apud nos. flore luteo, rarius albo: in Horto vero colitur flore purpureo cæruleo inodoro, quæ est differentia tertia Dodonæi.

Melilotus Italica folliculis rotundis, C. B. Welscher Steinflee der grosse. *Melilotus Italica*, Camer.

Melilotus angustifolia repens folliculis rotundis, C. B. Welscher Steinflee der kleine. An *Melilotus Frisia* flore luteo pusillo, quorundam.

Melilotus corniculis reflexis minor, C. B. Aegyptischer Steinflee. *Melilotus Aegyptia*, Alchimelech, Alpin. Hæc crescendo repit.

Melilotus folliculis utrinque acuminatis, Cretischer Steinflee. Semen eleganti folliculo non rotundo, sed utrinque acuminato includitur: missum nomine *Meliloti Creticæ sericæ*.

Melissa hortensis, C. B. Melisse/Winter-Melisse. *Melissa*, Dod. officinarum, Eyst. *Melissophyllum*, Tab. *Apiastrum*, Matth. Lob.

Melissa peregrina folio oblongo, C. B. Sommer Melisse mit länglichen blettern. *Melissa Moldavica*, Matth. Eyst. *Turcica Dalechampii*, Tab. *Melissophyllum Turcicum*, Lob. flore cæruleo, & flore albo.

Melissa Moluccana odorata, C. B. Wohlriechende Moluckische Melisse. *Melissa Constantinopolitana*, Matth. *Moluca lævis*, Dod. *Cardiaca Syriaca*,

ca, Tab. Cardiacamelica five Moluca minus aspera, Lob. Moluca odorata spinosa, Eyft.

Melissa Moluccana foetida, C. B. | Stinckende Moluckische Melisse. Molucca spinosa, Dod. laevis inodora, Eyft. | Moluca asperior Syriaca, Lob. Cardiac Syriaca aspera, Tab.

Melo vulgaris, C. B. Melone. Melo, Trag. Tab. five Melo pepo vulgi, Dod. Melo vulgi, five Cucumis antiquorum, Lob. Pepo, Fuch. Variat fructus figura, cortice, pulpa, odore, duratione, loco natali: unde mira oritur melonum varietas. Semen ad nos apportatur ex Galliis, Batavia, Hispania, Italia, atque Hungaria.

Melo rotundus parvus, C. B. Kleine Zucker-Melonen. Melo saccharatus, Lob. ic. saccharinus, Tab.

Mentha hortensis corymbifera, C. B. Frauenmünze / Balsmte & Balsamita, Brunf. Mentha Sarracenica, Off. & Eyft. Græca, Matth. Costus hortorum, Lob.

Mentha rotundifolia crispa spicata, C. B. Krause Münze. Mentha crispa, Off. sativa altera, Matth. Dod. rotundifolia altera flore spicato, Lob.

Mentha angustifolia spicata, C. B. Spitze Münze. Mentha acuta, Off. & Tab. prima, Matth. sativa vel hortensis tertia, Dod. Romana five præstantior angustifolia, Lob.

Mentha spicata folio variegato, C. B. Spitze Münze mit geschleckten blettern. Men-

tastrum alterum, Dod. niveum Anglicum, Lob.
Eyst. Tab.

Mentha sylvestris longiore folio, C. B. * Pferde
Münze. Menthastrum, Trag. Matth. Dod. Lob.
Offic. sylvestre, Eyst.

*Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica
major*, C. B. * Wassermünze. Calamintha aquati-
ca, Tab. Sisymbrium, Dod. sylvestre, Matth. A-
quatica sive Sisymbria mentha, Lob. Balsamita
Officinarum, Eyst.

Mentha cataria vulgaris, C. B. * Katzenmünze.
Nepeta, Off. vulgaris, Trag. Menta cataria, Lob.
felina, Tab. Eyst. Herba gattaria, Matth. Cattaria
herba, Dod.

Mercurialis testiculata, C. B. * Mänlich Bin-
gelfraut. Mercurialis mas, Matth. Dod. Lob.
Tab.

Mercurialis spicata, C. B. * Weiblich Bingel-
fraut. Mercurialis foemina, Matth. Dod. Lob.
Tab.

Mercurialis montana spicata, C. B. * Berg-
Bingelfraut. Mercurialis sylvestris foemina, Cord.
hilt. canina foemina, Colum. Cynocrambe foemi-
na, Matth. Cam. ep.

Mespilus Germanica folio laurino non serrato,
C. B. Gemeiner Mespelbaum. Mespilus, Trag.
Lob. Dod. vulgaris, Clus. Cam. ep.

Mespilus folio laurino major, C. B. Großer
Mespelbaum. Mespilus fructu præstantiore,
Trag.

Trag. domestica, Lob. ic. oxyacantho insita, Dod.

Mespilus apij folio sylvestris spinosa, C. B.*

Hagedorn. Oxyacantha, Matth. Lob. Tab. Spina appendix Plinii, Clus. Fructus non est vescus: ad vivas autem sepes frutex usurpatur. Huc pertinet singularis differentia, quam nuncupant vulgo Weißdorn à colore corticis.

Meum folijs anethi, C. B. Bårdille. Meum, Matth. Dod. Lob. Tab. vulgare tenuifolium, Clus. Daucus Creticus, Trag. Seleli Creticum, Lon.

Milium semine luteo, vel albo, C. B. Gelber Hirse. Milium, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Fuch. Lon.

Milium semine nigro, C. B. Schwarzer Hirse. Milium nigrum, Tab. juba subinde coloris nigricantis, Dod. semine nigro & latiore juba, Lob.

Millefolium vulgare album, C. B.* Weiße Schaffgarbe. Millefolium vulgare, Trag. flore albo, Eyst. terrestre majus, Tab. sive Achillea, Dod.

Millefolium purpureum majus, C. B. Purpurfarbene Schaffgarbe die grosse. Millefolium majus, Matth. rubro flore, Clus. Eyst.

Millefolium vulgare purpureum minus, C. B.* Purpurfarbene Schaffgarbe die kleine. Millefolium minus, Matth. terrestre purpureis floribus, Lob. purpureum, Tab. purpurei floris, Dod. Nostras florem admodum dilutæ purpuræ gestat.

Millefolium aquaticum caule nudo, C. B.*

Wasser Schaffgarbe mit blossen stengel. Myriophyllum alterum, Matth. equisetifolium fluviatile, Lob. Viola aquatilis, Dod. Fœniculum aquaticum secundum, Tab.

*Millefolium aquaticum folijs fœniculi, ranunculi flore & capitulo, C.B.** Wasser Schaffgarbe mit fenchel-blettern. Peucedanum aquaticum, Tab. Myriophyllum maratrichyllum palustre alterum, Lob. ic.

*Mollugo montana latifolia ramosa, C.B.** Breit Meyerkraut. Mollugo, Clus. montana, Dod. Tab. Belgarum, Lob.

*Mollugo montana angustifolia, C.B.** Schmal Meyerkraut. Mollugo prima, Dod. Tab. vulgarior herbariorum, Lob. Gallion tertium, Trag. album, Cam.

Moly latifolium liliflorum, C.B. Moly mit Lilien blumen. Moly latifolium, Dod. liliflorum, Lob. Theophrasti, Clus.

Moly latifolium Indicum, C.B. Indianisch Moly. Moly Indicum, Clus. Caucason, Lob. ic. Recto prorsus caule assurgit.

Moly latifolium Hispanicum, C.B. Spanisch Moly. Moly Hispanicum purpureum, vel Moly montanum latifolium purpureum Hispanicum, Clus. eur. post. Quo pertinet Moly latifolium, Eyst.

Moly latifolium luteum odore allij secundum, C.B. Knoblauch-Moly mit gelbgrünen blumen. Moly latifolium flore flavo, Eyst.

Morus fructu nigro, C. B. Maulbeerbaum.
Morus, Trag. Matth. Dod. Fuch. Tab. celsa officinis, Lob.

Morus fructu albo, C. B. Weiße Maulbern,
Morus alba, Matth. Tab. candida, Dod. Lob. Hujus folia à bombycibus cumprimis expetuntur.

Musculus vulgarissimus, C. B.* Gemeiner Erdmoß. Musculus terrestris vulgaris, Dod. Lob. ic. hortensis, Trag.

Musculus filicinus major, C. B.* Fahrenmoß. Musculus filicinus, Tab.

Musculus denticulato similis, C. B.* Zahnmoß. Musculus montanus, Tab.

Musculus terrestris clavatus, C. B.* Gürtel-
fraut. Musculus terrestris, Matth. Dod. Trag. clavatus, Lob. Clavatus procumbens, Eyst. Lycopodium, Tab. Cingularia quibusdā. Pulvis fulgurans ex hoc colligitur. Nimirū mense Julio aut Augusto clavæ hujus Musci pulvisculo flavo scatent, qui canula vel alio instrumento comodo exceptus, si per flammā candelæ exsuffletur, cum strepitu incenditur, & quasi fulgurat. Ad ignes ludicros noctu utitur Moscovitæ, & vernacule *Plauen* nominant, teste Adamo Oleario Itiner. Persic. part. 2. p. 331. Pulverē hunc odoratū solemus reddere, addito Olibano, Mastiche, Benzoe, Succino, sed subtilissimè tritis: ita per instrumentū efflatus simul oculos fulgure, aures strepitu, nares odore replet gratissimo.

Musculus clavatus folijs cypressi, C. B.* Cypressenmoß.

moß. Chamæcyparissus, Tab. Sabina sylvestris, Trag. Savina Tragi sylvestris seu Selaginis Plinianæ prima specirs, Thal. Noster in vicinis sylvis circa arcem Grünenwald proveniens, moschi gratissimum odorem, etiam siccatus retinet: qualem suo cæteri Auctores non tribuunt, Tabernæmontanus vero plane inodorum prædicat.

Muscus ramosus erectus major, C. B. * aut ei similis. Aufrrichter Moß mit ästen. Reperitur itidem in querceto arcis Grünenwald.

Muscus pyxiodes terrestris, C. B. * Erdmoß mit fleinen büchßlein. Muscus terrestris pyxidiatas alabastriculos imitatus, Lob. belg.

Muscus terrestris coralloides sive cornutus montanus, C. B. * Erd Corallen-moß. Muscus corallinus sive Corallina montana, Tab.

Muscus arboreus, *Ulsnea officinarum*, C. B. * Baummöß. Muscus arboreus, Trag. Matth. Dod. arborum, Tab. quernus, Lob.

Muscus arboreus denticulato similis longissimus. * Langer Baummöß dem Zahnmöß ähnlich. Pinastro adnatum reperi.

Muscus arboreus cum orbiculis, C. B. * Baummöß mit runten scheiblein. Muscus ramosus, & ramosus floridus, Tab. Quercui & Fago potissimum innascitur, umbellisq; majoribus & minoribus variat,

Muscus pulmonarius, C. B. * & Lob. Lungenmöß. Pulmonaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon.

Lon. Tab. Adest laciniis tam *latioribus*, quam *angustioribus*.

Myrrhis major, C. B. Myrrhis. Matth. Lob. Dod. sativa, Cam. Cerefolium Hispanicum, Tab. Cicutaria odorata, quorundam.

Myrtus minor vulgaris, C. B. & Lob. Gemeiner Myrtenbaum. Myrtus, Tab. Tarentina, Matth. Clus. Eyst.

Myrtus folijs minimis & mucronatis, C. B. Krauser Myrtenbaum. Myrtus domestica fructu albo, Clus. nona angustifolia, Lob. Stipantur rami numerosis foliis, ut ceteris multo desior appareat.

Myrtus latifolia Romana, C. B. Breitblettri-ger Myrtenbaum. Myrtus latifolia, Clus. Romana, Matth. altera, Dod. laurea maxima, Lob.

Myrtus latifolia flore duplici. Myrtenbaum mit gedoppelter blüht. Myrtus latifolia flore pleno, Hort. Pat.

Napus sativa, C. B. Same Steckrüben. Napus, Matth. Lon. Dod. sive Napus, Lob. Rapum sativum alterum & Napus veterum, Trag.

Napus sylvestris, C. B. * & Dod. Wilde Steckrüben. Napus secunda, Lon. Bunias sylvestris, Lob. ic. Bunium & Napus sylvestris, Matth. Napus bunias sylvestris, uch. Rapum sylvestre, Trag.

Narcissus albus circulo croceo vel luteo, C. B. Weiße Narcisse mit gelben Circel. Narcissus veterum, Trag. decimus roseoluteus major, Tab. poeticus mediocroceus, Lob.

Nar-

Narcissus Indicus totus ruber, C. B. Ganz rothe Narciſſe aus Indien. *Narcissus Indicus rubro flore*, Lob. ad. part. 2. flore sanguineo, Sueit. Jacobæus, Cluſ.

Narcissus orientalis albus calice stellato, C. B. Weis Orientaliſche Narciſſe mit geſtirnetem kelche. *Narc. orient. albus odoratus calyce stellato*, Eyſt.

Narcissus totus albus major, C. B. Ganz weiſſe Narciſſe die groſſe. *Narcissus totus albus*, Dod. Lob. quintus albus; Tab latifolius ſimplici flore prorfus albo, Cluſ. orientalis polyanthos minor totus albus, Eyſt.

Narcissus totus albus minor, C. B. Ganz weiſſe Narciſſe die kleine. *Narcissus latifolius niveus alter*, Cluſ. totus albus paucioribus floribus, Lob. albus minor, Cam.

Narcissus orientalis albus calice luteo medius, C. B. Weiſſe orientaliſche Narciſſe mit gelben kelche. *Narcissus polyanthos orientalis medioluteus odoratus medius*, Eyſt.

Narcissus pallidus medio croceus, C. B. Narciſſe mit blassen blumen in der mitte ſaffran gelbe. *Narcissus medioluteus Pisanus*, Lob. ic. Suert.

Narcissus pallidus medio aureus, C. B. Narciſſe mit blassen blumen in der mitte goldgelbe. *Narcissus præcox sulphurei coloris minor*, Cluſ. sur. poſt.

Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus, C. B.

Gelbe vielblümige Narciſſe aus Portugal. *Narcissus d' Argiers aut Aegyptius*, Lob. adv. part. 2. de Argiers polyanthos totus luteus, Eyst.

Narcissus luteus polyanthos Africanus, C.B. Gelbe vielblümige Narciſſe aus Africa. *Narcissus Africanus flavus polyanthos*, Clus. add. cur. post. Africanus multiflorus coronatus, Suert.

Narcissus juncifolius oblongo calyce luteus major, C.B. Gelbe Binsens-Narciſſe die groſſe. *Narcissus juncifolius major*, Dod. luteus juncifolius vel Africanus præcox, Lob. major juncifolius, Eyst.

Narcissus juncifolius luteus minor, C.B. Gelbe Binsens-Narciſſe die kleine. *Narcissus juncifolius minor*, Dod. Clus. Eyst. juncifolius serotinus, Lob.

Narcissus juncifolius flore pallidiore, calice flavo, C.B. Blaſſe Binsens-Narciſſe mit gelben ſelche. *Narcissus juncifolius minor*, Clus. Lob. ad. part. 2. juncifolius minimus, Eyst.

Narcissus autumnalis albus, C. B. Weiſſe Herbt-Narciſſe. *Narcissus juncis foliis albus autumnalis medio obsoletus*, Suert.

Narcissus major totus luteus calice prælongo, C.B. Ganz gelbe Narciſſe mit langem ſelche. *Narcissus totus luteus montanus major*, Eyst. totus luteus montanus Theophrasti Hispanicus, Lob.

Narcissus albus oblongo calice, C. B. Weiſſe Narciſſe mit langem ſelche. *Narcissus oblonga tuba*

tuba totus albus, Suert. Pseudo narcissus albo flore, Clus. totus albus, Eyst.

Narcissus montanus juncifolius calice flavo, C. B. Vinsen. Narzisse mit gelbem kelche. *Narcissus montanus juncifolius minimus*, Lob. Pseudo-narcissus juncifolius primus, Clus.

Narcissus orientalis flore multiplici & pleno alboluteo, C. B. Orientalische Narcisse mit weißgelben gefüllten blumen. *Narcissus orientalis polyanthos mixtus*, Eyst.

Narcissus latifolius albus medioluteus, C. B. Breitblettrige volle Narcisse mit weissen blumen in der mitten gelb. *Narcissus multiplex*, Dod. albus polyanthos, Lob. primus polyanthos, Matth. Tab. major flore multiplici, Eyst.

Narcissus totus niveus multiplex, C. B. Ganz schneeweiße volle Narcisse. *Narcissus pleno flore sextus*, Clus. albus pleno flore, Suert.

Narcissus albus multiplex ex Virginea, C. B. Volle weiße Narcisse aus Virginien. *Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice*, Suert.

Narcissus sylvestris multiplex calice carens, C. B. Volle Narcisse ohn kelch. *Narcissus sylvestris multiplex*, Dod. luteus multiplici flore, Lob. sylvestris stellatus, Eyst. Pseudonarcissus pleno flore, Clus. luteus polyanthos, Tab.

Narcissus flore pleno variegato, C. B. Volle gescheckte Narcisse. *Narcissus septentrionalis flore pleno luteo*, Eyst.

Nar-

Narcissus maritimus, C. B. Meer-Marcisse.
Narcissus marinus, Dod. *Hemerocallis Valentina*,
 Clus. Tab. *Pancratium floribus rubris*, Lob. ic.

Narcissus Illyricus liliaceus, C. B. Lilien-
 narcisse aus Dalmatien. *Narcissus Constanti-*
nopolitanus, Tab. Matth. *Lilionarcissus orien-*
talis Plateau, Clus. *Lilionarcissus Hemerocallidis*
 facie, Eyst.

Narcissus Indicus autumnalis, C. B. Herbst-
 Marcisse aus Indien. *Pancratium Indicum*, aut
Narcissus Indicus maximus autumnalis quorun-
 dam, Lob. ad. part. 2.

Nasturtium hortense vulgatum, C. B. Gar-
 tenfresse. *Nasturtium*, Matth. Tab. *hortense*, Trag.
 Lob. Dod. Fuch.

Nasturtium pratense magno flore, C. B. * Wie-
 senfresse mit grossen blumen. *Nasturtium praten-*
se, Trag. *aquaticum simplici flore*, Eyst. Car-
 damine altera, Lob. altera simplici flore, Clus.
 prima & *Sisymbrium alterum Dioscoridis*,
 Tab.

Nasturtium aquaticum supinum, C. B. *
 Brunnefresse. *Nasturtium aquaticum*, Trag. Dod.
 Lon. *Sisymbrium aquaticum*, Matth. primum,
 Tab. Sion *Cratevæ crucæfolium*, Lob.

Nasturtium aquaticum minus, C. B. * Kleine
 Brunnefresse. *Sisymbrium aquaticum alterum*
 vel minus, Cam. epit.

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum, C. B. *

Wellsamen. *Seriphium Germanicum*, Trag. *Sophia Chirurgorum*, Lob. Dod. *Thalictrum*, Tab.

Nasturtium Indicum majus, C.B. Indianische Kresse. *Nasturtium Indicum*, Dod. Lob. Eyst. Camer.

Nerion floribus rubescentibus, C.B. Roter Oleander. *Nerion*, Trag. Lob. Tab. flore rubro, Eyst. *Nerium*, Matth. Fuch. Oleander, & *Laurus rosea*, Lob. ic.

Nerion floribus albis, C.B. Lob. Tab. Cam. Weisser Oleander. *Nerion* sive *Rhododendron flore albo*, Eyst.

Nicotiana major latifolia. C.B. Großer Taback mit breiten blettern. *Nicotiana major*, Tab. mas, Jo. Neandr. *Tabacum latifolium*, Eyst. *Petum latifolium*, Clus. *Hyoscyamus Peruvianus*, Dod. Sana Sancta Indorum, Lob. Hæc omnium præstantissima, ejusque semen ex Batavia accersunt hortulani nostri, qui *Nicotianæ* colendæ, & in funiculos ducendæ operam navare cæperunt.

Nicotiana major angustifolia, C.B. & Eyst. Großer Taback mit schmalen blettern. *Tabacum angustifolium*, Cam. Herba Sancta sive *Tabacum minus*, Lob. *Hyoscyamus Peruvianus alter*, Dod. *Petum angustifolium*, Clus. ad Monard. *Nicotiana foemina*, Jo. Neandr.

Nicotiana minor, C.B. & Eyst. Kleiner Taback. *Hyoscyamus luteus*, Dod. *Peruvianus*, Tab. dubius luteolus *Solanifolius*, Lob. niger vel tertius, Matth. Priapeja, Ges. hor. Ni-

Nigella arvensis cornuta, C. B. Schwarzkümmel. *Nigella sylvestris*, Trag. *Melanthium sylvestre*, Dod. sylvestre alterum, Matth. capitulis reflexis aquilegiæ, Lob. agreste, Tab. arvense, Clus. *Pseudomelanthium*, Eyst.

Nigella latifolia flore majore simplici ceruleo, C. B. Breitblettrige Nigelle mit einfacher blauer blume. *Melanthium Hispanicum majus*, Eyst.

Nigella angustifolia flore majore simplici ceruleo, C. B. Schmalblettrige Nigelle mit einfacher blauer blume. *Melanthium sylvestre*, Matth. Lob. *Damascenum*, Dod. Tab. sylvestre *Damascenum*, Clus. *sativum flore simplici*, Eyst.

Nigella flore majore pleno ceruleo, C. B. Nigelle mit gefüllter blauer blume. *Melanthium Damascenum pleno flore*, Clus. Eyst.

Nigella flore minore simplici candido, C. B. Nigelle mit weisser einfacher blume. *Melanthium sativum*, Matth. Dod. Tab. *sativum simplici flore*, Clus. sive *Nigella Romana odora*, Lob.

Nigella flore minore pleno & albo, C. B. Nigelle mit gefüllter weisser blume. *Nigella flore albo multiplici*, Lob. peregrina flore multiplici, Eyst. *cardamomea*, quorundam ob odorem. *Cardamomi tertia species*, Lac. *Melanthium citrinum multiflorum*, Tab. pleno flore, Clus.

Nummularia major lutea, C. B. * Pfennigfraut / Egelfraut. *Nummularia*, Matth. Trag. Dod. Lob. Eyst. *Hirudinaria minor*, Tab.

Nux juglans sive regia vulgaris, C. B. Gemeine Nüsse. *Nux juglans*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Adfunt etiam Surdæ Cæsalpino vocata, quæ a putamine purgari vix possunt, Steinnüsse.

Nux juglans fructu maximo, C. B. Grosse oder Wall. Nüsse. *Nuces caballinae*, Lugdun. ex quarum cuppis marsupia fiunt pueris gestanda.

Nux juglans fructu tenero & fragili putamine, C. B. Dünnschälige Nüsse. *Nuces juglandes* cortice tenuissimo, Ges. hor.

Nymphaea alba major, C. B.* Weiße Seeblume die grosse. *Nymphaea alba*, Matth. Dod. Lob. Tab. Clus. candida, Trag. major alba, Eyst. Nenufar, Brunf.

Nymphaea alba minor, C. B.* & Tab. Weiße Seeblume die fleine. *Nymphaea parva*, Matth.

Nymphaea alba minima, C. B.* Weiße Seeblume die kleineste. *Morsus ranæ*, Dod. Tab Lob. ic.

Nymphaea lutea major, C. B.* & Clus. Grosse gelbe Seeblume. *Nymphaea lutea*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyst.

Nymphaea lutea minor magno flore, C. B.* Kleine gelbe Seeblume mit grossen blumen. *Nymphaea lutea secunda*, Tab.

Nymphaea lutea minor parvo flore, C. B.* Kleine gelbe Seeblume mit kleinen blumen. *Nymphaea lutea priua*, Tab. lutea minor Septentrionalium, Lob. ic.

Ocimum vulgatum, C. B. Gemeine Basilge.
Ocimum medium, Matth. *medium vulgatum*,
 Eyft. *magnum*, Tab. *sive Basilicum medium vul-*
gatum, Lob.

Ocimum caryophyllum majus, C. B. Melken-
 basilge. *Ocimum majus*, Matth. *maximum*, Dod.
maximum caryophyllum, Basilica major, Trag.

Ocimum folijs fimbriatis viridibus, C. B.
 Krause Basilge. *Ocimum crispum viride*, Eyft.

Olea sativa, C. B. Matth. Tab. Clus. Delbaum.
Olea, Trag. Dod. Lob.

Olea sylvestris folio molli incano, C. B. Wilder
 Delbaum mit weichen grauen bleibern. *Olea syl-*
vestris Septentrionalium, Lob. *Bohemica*, Matth.
Ziziphus alba, Clus. *Ziziphus Cappadocia Plinii*,
 Dod. *Salix Amerina*, Amat. Lusit.

Onobrychis semine clypeato aspero major, C.
 B. Schildfrant. *Onobrychis altera*, Dod. *Hedy-*
sarum alterum clypeatum, Lob. *clypeatum flore*
suaviter rubente, Eyft.

Onobrychis arvensis, vel *Campanula arvensis*
erecta, C. B. Frauenspiegel. *Onobrychis altera Bel-*
garum, Lob. Eyft. *Campanula arvensis minima*,
 Dod. *Viola arvensis*, & *Viola pentagonia*, Tab.

Ophioglossum vulgatum, C. B. * Schlangen-
 zünglein. *Ophioglossum*, Matth. Trag. Dod. Eyft.
 seu *Enophyllum*, Lob.

Ophris bifolia, C. B. * Zwenblat. *Ophris*, Matth.
 Tab. *Bifolium*, Lob. *Pseudorchis seu Bifolium*,
 Dod.

Orchidis radice palmata, & testiculata tam simplici, quam gemina, variaz species.

Origanum sylvestre, C. B. * Dod. Tab. Fuch. Dost / Wolgemuth. *Origanum vulgare*, Trag. Matth. Eyst. *Agrioriganum* sive *Onitis major*, Lob.

Origanum Heracleoticum, C. B. Matth. Dod. Lob. 1. & 2. Tab. Griechisch Wolgemuth. *Cunila gallinacea*, Plinii. Galli & Belgæ flores siccos salamentis ex hælecibus aut sardis paratis inspergunt, & à similitudine quadam *Lupulum Hispanicum*, Spanischen Hopffen nominant.

Ornithogalum umbellatum maximum, C. B. Geschirmte Vogelmilch die grosse. *Ornithogalum majus*, Dod. Arabicum, Clus. Eyst. *Lilionarcissus polyanthos*, Lob.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium, C. B. Geschirmte Vogelmilch die mitlere. *Ornithogalum candidum vulgare*, Lob. quintum sive vulgare, Clus. secundum, Matth. *Bulbus solsequius*, Tab. *Bulbus leucanthemos minor*, Dod.

Ornithogalum album minus, C. B. Kleine weisse Vogelmilch. *Ornithogalum minus*, Eyst. minus c *Pyrenæis*, Clus.

Ornithogalum majus spicatum flore albo, C. B. Geährte Vogelmilch. *Ornithogalum Narbonense*, Dod. *spicatum flore lacteo*, Eyst. *spicatum Monspeli. flore lacteo*, Lob. *majus secundum*, Clus.

Ornithogalum luteum, C. B. * Lob. Tab. Ackerzwie-

zwiebel. Bulbus, Trag. sylvestris, Fuch. Ruell. Dod. Eyst. esculentus, Lon.

Ornithopodium majus, C. B. * Groß Vogelfuß. *Ornithopodium*, Dod. Lob.

Ornithopodium minus, C. B. * Klein Vogelfuß. *Ornithopodium perpusillum*, Lob.

Ornithopodio affinis hirsuta Scorpioides, C. B. Raucher Vogelfuß. *Scorpioides leguminosa*, Lob.

Orobancha radice dentata major, C. B. * Zahn-
fraut/Zahnwurz. *Dentaria major*, Matth. Lob. Clus. crocodilia, Tab. Squamatia, Lon. Anblatum, Dod. Squammata seu *Dentaria major*, Eyst.

Orobis siliquis articulatis semine majore, C. B. Garten Orobis. *Orobis sive Ervum*, Matth. *Ervum*, Tab. verum, Cam. *Orobis receptus herbariorum*, Lob.

Orobis sylvaticus Vicia folijs, C. B. Wald-Orobis mit wicken blettern. *Orobis pannonicus secundus*, Clus. *Astragaloides*, Dod. altera herbariorum, Lob.

Ostrya Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis, C. B. * Hagebüche. *Ostrya Theophrasti* & *Fagulus herbariorum*, Clus. *Ornus*, Trag. Lon. *Carpinus*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Materies dura*, & *trochleis apta, rotisque molendinarijs*.

Palma major, C. B. & Tab. Rechter Dattelpflaum. *Palma*, Trag. Matth. Dod. Lob. *dactylifera*, Linscot. *Ex nucleis dactylorum propagatur*,

aut plantæ triennes, quandoque etiam decennes ex Italia afferuntur, qualis superiori anno Berolini vifebatur in Electoralibus hortis, quaternos pedes superans. Foliis hæc prædita est alatis.

Palma minor, C. B. & Tab. Niedriger Dattelbaum. *Palma humilis*, Matth. *Palmites*, Lob. *Chamærops*, Plin. *Chamæriphe*, Dod. Hæc apud nos multos annos perdurat, grandescit, & floret: folia ipsi digitata.

Panicum Germanicum, sive *panicula minore*, C. B. *Fench*/Fench/Suchsichwanz, Panicū, Fuch. Dod. Lob. Tab. Cam. minore panicula, Matth. *Milium agreste* sive *exiguum*, Trag.

Panicum Italicum, sive *panicula majore*, C. B. Großkolbiger Fench. *Panicum domesticum*, Matth. vulgare, Clus. *Indicum*, Tab. Dod. *Indicum panicula villosa*, Lob. Utriusq; semen Milio simile, sed paullo minus: coluntur in agris arenosis pro cibo rusticorum.

Papaver hortense semine albo, C. B. Garten Moh'n mit weissen samē. *Papaver albū*, Plin. Trag. Dod. sativum, Diosc. Matth. Tab. album sativum, Lob. Flore adest candido & leviter purpureo.

Papaver hortense nigro semine, C. B. Garten Moh'n mit schwarzem samē. *Papaver sylvestre*, Diosc. nigrum, Plin. nigrum sativum, Dod. flore malvæ hortensis aut pœoniæ, Lob.

Papaver vulgare, cujus capitula foraminibus hiant, semine incano, C. B. Auslauf fen-

fender Mohn. *Papaver vulgare* & *primum*, Trag. *spontaneum sylvestre*, Lob. *patulum*, Adv. *tertium*, Dod.

Papaver cristatum floribus & semine album, C.B. Kraußgeferbeter Mohn mit weissen blumen und samen. *Papaver fativum quartum*, Dod. *fimbriatum aut cristatum album*, Lob. *flore niveo*, Tab. *Flos colore variat*.

Papaver cristatum floribus rubris, semine nigro, C. B. Kraußgeferbeter Mohn mit rothen blumen und weissen samen. *Papaver secundum foliis dissectis*, Dod. *fimbriatum aut cristatum nigrum*, Lob. *Flos colore variat*.

Papaver pleno flore album, C.B. Garten Mohn mit weissen vollen blumen. *Papaver polyanthos*, Tab. *album polyanthon seu multiflorum*, Lob. *Adest etiam flore purpureo, rubro, & variegato*.

Papaver erraticum majus, C. B. * Wilder Mohn der grosse/Klapperrosen. *Papaver erraticum*, Matth. Dod. Tab. *erraticum rubrum*, Eyst. *rhœas*, Diosc. Theoph. Plin. Lob.

Papaver erraticum minus, C B. * & Tab. Wilder Mohn der kleine. *Papaver erraticum alterum*, Fuch. Dod. *Argemone exigua*, Trag.

Papaver erraticum flore pleno, C. B. Wilder Mohn mit gefüllten blumen. *Papaver rhœas flore pleno*, Cam. *Argemone multiplex*, Trag.

Papaver corniculatum luteum, C.B. & Eyst. Gehörneter Mohn mit gelben blumen. *Papaver*

ceratites, Diosc. Theophr. corniculatum, Matth. Lob. corniculatum primum, Tab. majus, Dod. flavo flore, Clus.

Papaver corniculatum phœniceum hirsutum, C.B. Gehörneter Mohn mit rothen blumen. *Papaver corniculatum rubrum*, Dod. alterum, Tab. cornutum flore phœniceo, Lob. Clus.

Papaver corniculatum violaceum, C.B. Lob. Dod. Gehörneter Mohn mit violblawen blumen. *Papaver corniculatum violaceo flore*, Clus.

Papaver spinosum, C.B. Clus. Eyft. Dornicher Mohn. *Ficus infernalis Italorum*. Flore simplici adest: flore pleno expectabatur hoc anno ex semine jacto, quod tamen plantam nullam protrusit.

Parietaria officinarum & *Dioscoridis*, C. B. * Glasßkraut / S. Peterskraut / Tag und Nacht. *Parietaria*, Dod. Tab. Helxine, Matth. Fuch Lob.

Pastinaca tenuifolia sativa radice lutea vel alba, C. B. Garten Mohrüben. *Pastinaca tenuifolia sativa*, Dod. *sativa Dioscoridis*, Lob. *sativa prima & secunda*, Tab. *Siler alterum*, Matth. *Carotta nostra lutea*, Cam.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel *Daucus officinarum*, C. B. * Wilde Mohrüben / Vogelneß. *Pastinaca sylvestris*, Matth. erratica, Tab. *sylvestris tenuifolia*, Dod. *sylvestris genuina Dioscoridis*, Lob. *Daucus vulgaris*, Clus.

Pastinaca sativa latifolia, C. B. Garten Pastinack. *Pastinaca sativa*, Trag. domestica, Matth. Lob.

Lob. latifolia fativa, Dod. Elaphoboscum fativum, Tab.

Pastinaca sylvestris latifolia, C.B. * Wilde Pastinack. *Pastinaca sylvestris*, Trag. latifolia sylvestris, Dod. Elaphoboscum, Matth. erraticū, Tab.

Pedicularis pratensis purpurea, C.B. * Wiesen Rodel mit purpurblumen. *Pedicularis*, Lob. Tab. *Fistularia*, Dod. *Alectorolophi* tertiū genus, Clus.

Pedicularis pratensis lutea, C.B. * Wiesen Rodel mit gelben blumen. *Pedicularia lutea*, Tab. *Crista galli*, Lob. Dod. *Crista gallinacea*, Clus.

Pedicularis aquatica flore viridi. * Wasser Rodel mit grünen blumen. Hanc in ripa fluminis observavi.

Pepo oblongus, C.B. Lob. Lange Pfeben oder Peponen. *Pepo major oblongus*, Dod. maximus oblongus, Tab. Magnitudinē fructus variat.

Periclymenum non perfoliatum Germanicum, C.B. * Gemeine Specklilie/Geißblat. *Periclymenum*, Trag. Fuch. Tab. *Germanicum*, Eyft. vulgare Septentrionalium, Clus. *Caprifolium*, Off. & *Germanicum*, Dod.

Periclymenum perfoliatum, C.B. Lob. Tab. Eyft. Durchwachsende Specklilie. *Periclymenum*, Matth. vulgare alterum, Clus.

Perfoliata vulgarissima sive arvensis, C.B. * Durchwachs. *Perfoliata*, Matth. Dod. Tab. Eyft. *Perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbilicato*, Lob.

Per-

Persica molli carne & vulgaris viridis & alba, C.B. Gemeine weiche Pfirsichen. *Persica malus*, Lob. Tab. *Malus Persica*, Dod. *Persica viridia & alba*, Matth.

Persica dura, carne candida, aliquando ex albo subrubente, C.B. Harte oder Herz-Pfirsichen. *Persica duracina*, Matth. *duracina alba*, Tab. *Rhodacina*, Aegin. & Aetio.

Persica aestiva Armeniacis similia, C.B. Frühe oder Johannis Pfirsichen. *Persica præcocia*, Tab. *pumila*, Cam. *Persicæ quartum genus*, Trag. *Persica S. Johannis*, quibusdam.

Persica juglandina. Nuß-Pfirsichen / glatte Pfirsichen. *Nucipersica*, C.B. Matth. quod nucum juglandium faciem repræsentent, & nulla lanugine pubescant. *Persica nux*, Anguill.

Persicaria mitis maculosa & non maculosa, C.B. *gelinde Glöckfraut. *Persicaria*, Dod. altera, Trag. Matth. Tab. *mitis maculosa*, Lob. *scemina*, Lon.

Persicaria urens, C.B. * & Lob. Brennend Glöckfraut. *Persicaria mas*, Lon. *Persicariæ primum genus*, Trag. Tab. *Hydropiper*, Dod. Matth. Fuch.

Phalangium magno flore, C.B. Erdspeinenfraut. mit grossen weissen blumen. *Phalangium*, Matth. Matthioli, Tab. *Allobrogicum majus*, Clus. Eyst.

Phalangium flore violaceo triphylo. Violenslaues Erdspeinenfraut mit dreyblettrigen blumen. Ita appellare liceat, quod *Phalangium Virginianum* vulgo. Videtur esse *Allium* aut *Moly*.
Vir-

Virginianum, C. B. cui flores purpureo czrulco^s tribuit, append. Pinac. pag. 520.

Phalaris major semine albo, C. B. Canariens-
fraut. Phalaris, Matth. Dod. Lob. Tab.

Phaseolus major, sive Smilax hortensis, C. B.
Grosse Gartenfaselen / Steigbonen / Türckische
Bonen. Phaseolus vulgaris, Lob. Clus. Smilax
hortensis, Trag. Matth. Tab. Fuch. Adelt vario-
rum colorum.

Phaseolus minor, sive Smilax hortensis minor,
C. B. Kleine garten Faselen. Dolichus alter, Dod.
Adelt subniger, ruffus, varius.

*Phaseolus parvus Italicus, vel Smilax siliqua
sursum rigente*, C. B. Kleine welsche Faselen. Pha-
seolus, Matth. Adelt altus & subniger.

Phaseolus Ægyptiacus nigro semine, C. B. Æ-
gyptische Faselen. Phaseolus niger Lablab vocatus,
Alpin. Phaseolus peregrinus Leblab, Clus.

Phaseoli Indici aliquot species. Indianischer
Faselen etliche arten. Speciatim, Brasilianus maxi-
mus: Peruvianus coccineus, nigra macula notatus:
Ovalis niveus: alii.

Philyca elatior, C. B. Hoher Alatern. Philyca
Theophrasti, Bellon. Alaternus prima, Tab. Clus.
Folia huic sunt oblongiora: sicut sequenti sunt ma-
gis circinata.

Philyca humilior, C. B. Niedriger Alatern. Ala-
ternus alter, Clus. Tab. alter humilior latifol. Lob.

Picea major prima, sive Abies rubra, C. B. *
Pechbaum / Rothe Thanne. Picea, Matth. Lob. Tab.

Pli-

Plinii & Abies mascula Theophrasti, Clus. Abies, Dod. Tæda Plinii, Cæsalp. Piceæ summitates seorsim pingit, Eyst.

Pilosella major repens hirsuta, C. B.* Kriechende Piloselle / Nagelfraut. Pilosella, Matth. Lob. Tab. major, Dod. Auricula muris minor, Lon. Trag.

Pilosella erecta flore flammeo. Auffrechte Piloselle mit flammigen blumen. An Pilosella major erecta altera, C. B. quæ Pilosella major altera, Tab.

Pimpinella saxifraga major umbella candida, C. B.* Grosse wilde Pimpinelle. Pimpinella, Trag. Lob. saxifraga. Matth. Saxifraga magna, Dod. Tragoselinum majus, Tab.

Pimpinella saxifraga minor, C. B.* Kleine wilde Pimpinelle. Pimpinella, Saxifraga hircina minor, Lob. Saxifraga parva, Dod. Saxifraga pimpinella Germanica minor, Clus. Tragoselinum petraeum, Tab.

Pimpinella sanguisorba major, C. B.* Grosse Sanguisorba. Pimpinella seu Sanguisorba major, Matth. Pimpinella major sylvestris, Dod. Italica major, Clus. Sanguisorba major, Tab. altera major, Lob.

Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta, C. B. Kleine Sanguisorba oder Welsche Pimpinelle. Pimpinella, Lob. Sanguisorba, Dod. minor, Matth. Italica, Trag. Sanguisorba minor, Fuch. Tab.

Pinus sativa, C. B. Pinienbaum. Pinus, Trag. Dod. Lon. domestica, Matth. Tab. vulgatissima, Lob. Italica, Cam. Huic Pineæ nuces innascuntur, quarum nucleis satis propagatur. Ad nos quidem etiam arbusculæ cubitales ex Italia advehuntur, ad insignem tamen magnitudinem pervenire ipsas, aut fructus ferre nondum observavi.

Pinus sylvestris, C. B.* & Matth. Fichte/ Kienbaum. Pinus sylvestris montana, Theoph. Tab. Pinaster, Trag. Lob. Pinus sylvestris sive Pinaster, Dod. Omnium copiosissimè apud nos crescit, æditurque in lignum focarium ac trabale, itemque pro eliquanda pice.

Piper Indicum vulgatissimum, C. B. Indianischer Pfeffer mit länglichen schoten. Piper Indicum, Matth. medium, Eyf. Capsicum, Clus. in Monard. vel piper Indicum longioribus siliquis, Lob. Siliquastrum, Trag. Tab.

Piper Indicum propendentibus siliquis rotundis, C. B. Indianischer Pfeffer mit hangenden runden schoten. Siliquastrum latis siliquis, Trag. quartum, Fuch. fructu propendente rotundo, Regius in Clus. cur. post. Capsicum cordatum, Cam. & præterea varii generis alia.

Pistacia peregrina fructu racemoso, C. B. Pistacien. Pistacia, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyf. Terebinthus Indica, Theoph.

Pistacia sylvestris, C. B. Pimpernüsse. Pistacia Germanica, Lon. Nux vesicaria, Trag. Dod. Staphylodendron, Matth. Lob. Tab. Eyf. Pi-

Pisum majus quadratum, C. B. Eckige Stabelerbbsen. Fructus exsiccatione angulosi fiunt. *Pisum majus*, Dod. quadratum Plinii, Lob. ic. Tab. magnum peregrinum, Eyst. Pisa Italica grandia, Cam.

Pisum hortense majus, C. B. Kunte Stabelerbbsen. *Pisum majus*, Matth. vulgatius majus, Lob. ic. minus, Dod. Huc pertinet *Pisum præcox*, Früherbbsen / quoniam citius reliquis ad maturitatem pervenit adjuvante præcoci satione.

Pisum umbellatum, C. B. Traubelerbbsen / quoniam siliquæ racematim dependent. *Pisum proliferum*, Tab. Pisorum primum genus, Trag.

Pisum arvense, C. B. Gelderbbsen. *Pisum minus*, Matth. Dod. minus primum & secundum, Tab. Colore albicat fructus exsiccatus: adest tamen in hoc genere, cujus semini viror remanet, etiam sicco: vulgo Pisa viridia, grüne Erbsen.

Pisum cathartium. Purgier Erbsen. Ab effectu, quoniam fructus recens comestus alvum movet. Semen subfuscum est, non exacte rotundum, sed foveis inæquale.

Pisum leptolobum. Dünnschalige Erbsen / Erbsen ohn schalen / Zuckerschoten. Pisa sine cortice durior, C. B. Pisa leptoloba, quæ simul cum folliculis comeduntur.

Pisa gratiosa. Erwten van gracie. Hæc A. 1658. primum innotuerunt Hagæ Comitum per civem Joan. Babelium Adrians, cujus de ipsorum quali-

tatibus programma impressum extat. Videntur id peculiare præ aliis habere, quod sine ridicis crescant.

Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato, C. B. Blasenerbsen. *Pisum cordatum*, Lob. Eyst. Halacacabum peregrinum, Dod. Tab. Vesicaria sive Halacacabum repens, Matth.

Pisum Indicum majus, C. B. Grosse Indianische Erbsen. Color nostro subfuscus maculis variegatus. Huc pertinere videtur *Pisum Hispanicum Sarabanda* dictum, colore albidum, magnum, tuberosum, umbilico eminente.

Pisum Indicum minus coccineum, C. B. Kleine Indianische Erbsen. *Pisum coccineum* Americum, Lob. Phaseolus ruber Abrus vocatus, Alpin. Phaseolus Indicus Ginge & Abrus, Cam. Vicia Africana, Clus. exot.

Pisum Chinense viride. Grüne Chinesische Erbsen. An *Pisum virulentum Chinense*, C. B. Parva sunt, ex rotunditate oblongula, coloris viridis, cum umbilico albicante.

Plantago latifolia sinuata, C. B. * Wegerich/Wegebreit. *Plantago major*, Matth. Dod. Tab. vulgaris latifolia, Lob. rubra, Trag.

Plantago latifolia incana, C. B. * Wegerich mit breiten grauen blettern. *Plantago media*, Matth. Dod. minor Dioscoridis, Tab. major incana, Lob. Clus.

Plantago latifolia rosea flore expanso, C. B. Rosen-Wegerich. *Plantago rosea*, Lob. ic. Cam. Eyst. Succeslu temporis flos expansus spicam acquirit, & tunc vocatur.

Plantago latifolia rosea floribus quasi in spica dispositis, C. B. *Plantago rosea*, Adv. multiplex, Tab. rosea spicata, Eyst.

Plantago angustifolia major, C. B. * Schmalblettriger Wegerich der grosse / Spiz Wegerich. *Plantago minor*, Dod. lanceolata, Trag. Tab. longa, Matth. quinquenervia, Lob.

Plantago angustifolia minor, C. B. * & Tab. Schmalblettriger Wegerich der kleine. *Plantago pentaneuros minor*, Thal. Lanceola minor, Cæs.

Plantago aquatica latifolia, C. B. * Wasser-Wegerich der breite. *Plantago aquatica*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Fuch.

Plantago aquatica angustifolia, C. B. * Wasser-Wegerich der schmale. *Plantago aquatica minor*, Tab. aquatica humilis angustifolia & longifolia, Lob.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas, C. B. Pöonie mit nussblettern. *Pæonia mas*, Matth. Lob. Dod. Tab. Eyst. foliis nucis, Gesn. hort.

Pæonia communis vel fœmina, C. B. Gemeine Pöonie mit einfachen blumen. *Pæonia fœmina*, Lob. fœmiza altera, Dod. vulgaris fœmina, Clus. rubra flore simplici, Eyst.

Pæonia fœmina flore pleno rubro majore, C. B. Pöc-

Pöonie mit grossen vollen rothen blumen. *Pœonia* *scemina multiplici flore*, Dod. Tab. *scemina polyanthos*, Lob. *polyanthos flore rubro*, Eyst.

Pœonia flore pleno rubro minore, C. B. Pöonie mit kleinen vollen rothen blumen. *Pœonia pleno rubro flore minor*, Clus. *altera flore pleno dilutior & minore*, Cam.

Pœonia flore exalbido pleno, C. B. Fleischfarbene Pöonie. *Pœonia sexta sive exalbida plena*, Clus. *flore pleno incarnato*, Eyst.

Polium maritimum supinum Venetum, C. B. Meer Polium. *Polium repens*, Dod. *montanum purpureum*, Lob. Tab. *quintum purpureum*, Clus.

Polygala vulgaris, C. B. * Creuzblume. *Polygala*, Lon. Tab. *vulgaris minor*, Clus. *recentiorum*, Lob. *Flos ambarvalis*, Dod. *Polygalon flore rubro purpurascete, & flore cæruleo*, Eyst.

Polygonatū latifolium vulgare, C. B. * & Clus. Weiswurz. *Polygonatum*, Matth. *latifolium*, Dod. Lob. Tab. *vulgatius*, Eyst. *Sigillū Salomonis*, Trag.

Polygonum latifolium, C. B. * Breitblettrig Wegegras / Tausentknoten. *Polygonum majus*, Tab. mas, Matth. Dod. *mas vulgare*, Lob. *Centumnodia*, Brunsf.

Polygonū brevi angustog folio, C. B. * Schmalblettrig Wegegras. *Polygonum secundum*, Tab.

Polygonum cocciferum, C. B. * & Cam. ep. Coccinellen Wegegras. *Arenosis locis ubique obvium, cujus radicibus circa solstitium æstivū gra-*

na adnascuntur cocci æmula, quorum liquor rubellus sat eleganter tingit. Quod si loco sicco ipsa ferventur, indurescunt, & rugis contractis Cocci-nellam Officinarum veram mentiuntur. Plebs sanguinem divi Johannis, S. Johannis Blut nominat, sibi que falso persuadet, non inveniri hæc grana, nisi quotannis die vigesima quarta M. Junii, & quidem ipsa meridiei hora: ea verò elapsa evanescere. Idem prorsus simplex credulitas magis superstitiose, quam vere asserit de momento reperiundæ Osteocollæ, quæ ad radices vinearum Berolinensium frequens.

Polygonum minus candicans, C. B. Schneeweis Wegegras. *Polygonum montanum*, Tab. montanum niveum minimum, Lob. *Paronychia Hispanica*, Clus. Planta adulta membranulis prædita est niveis, novella non item: in Italia candidissimam vidimus, à quo candore apud nos non parum remittit.

Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens, C. B.* Knaewel/Trag. *Polygonum minus polycarpon*, Tab. minus seu foemina, Lon. *Saxifraga Anglica*, Lob. ic.

Polygonum minus, seu *Millegrana major*, C. B.* Tausendforn. *Polygonum minus*, Matth. *Polygoni genus Herniaria* appellata, Clus. *Herniaria*, Dod. Tab. *Herba Turca*, Lob.

Polypodium vulgare, C. B.* Engelsüss. *Polypodium*, Trag. Matth. Lob. Tab. majus, Dod.

Polytrichum aureum medium, C.B.* Göllden Wiedertod. *Polytrichū nobile*, Trag. *Adiantum aureum*, Off. *aureum minus*, Tab. *Muscus capillaris*, Dod.

Polytrichum aureum minus, C.B.* Klein Göllden Wiedertod. *Polytrichum minus*, Trag. *aureū tertium*, Lon. *Musci capillaris altera species*, Dod.

Populus alba majoribus folijs, C.B.* Weisser Pappelbaum. *Populus alba*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Populi albæ alia species*, Trag. *Folia in dorso candicant: sequentibus minus frequens*.

Populus nigra, C.B.* Matth. Dod. Lob. Tab. Schwarzer Pappelbaum. *Populus prima sive vulgaris*, Trag. Ex hujus gemmulis Vug. *populneum confit*.

Populus tremula, C.B.* Aspe. *Populus Lybica*, Matth. Dod. Lob. Tab. *Cercis Theophrasti sive Populus Lybica Plinii*, Clus. *Folia longis & subtilibus pendent pediculis: unde aere etiam quieto perpetim tremunt*.

Porrum commune capitatum, C.B. Asch. lauch. *Porrum*, Dod. Tab. *commune*, Matth. *vulgare*, Lob.

Porrum sectivum latifolium, C.B. Schnitt. lauch. *Porrum sectivum*, Dod. *sectivum capitatum*, Matth. *tonsile & capitatum*, Lob. *Scilicet sectivum à capitato, non nisi tonsura differt*.

Portulaca latifolia seu sativa, C.B. Garten Portulac / Wurzelkraut. *Portulaca domestica*,

Matth Lob. Tab. hortensis, Trag. sativa, Eyst.

Portulaca angustifolia sive sylvestris, C. B. *

Wilde Portulac. Portulaca sylvestris, Trag. Matth.

Dod. Lob. arvensis, Tab. minor, Cam. Gesn. hor.

Potamogeton rotundifolium, C. B. * Rund-
blettrig Samfraut. Potamogeton, Trag. Matth.
Tab Fuch. Lon.

Potamogeton folijs latis splendentibus, C. B. *
Samfraut mit breiten glänzenden blettern. Pota-
gometon altera, Dod. Folia huic perinde, ut ro-
tundifolio, flaccidiora.

Potamogeton Salicis folio, C. B. * Samfraut
mit weidenblettern. Potamogeton angustifolium,
Tab. sive fontalis & spicata, Lob. ic. Adv. Potamo-
geton, Dod. Folia huic solidiora.

Potentilla, C. B. * & Matth. Gänserich / Gänse-
fraut. Anserina, Trag. Tab. Argentina, Dod. Lob.
In magnitudine apud nos admodum evariat.

Prunus, C. B. Trag. Matth. Dod. Pflaumbaum.
Prunus sativa, Fuch. domestica, Lob. Quorsum
pertinent Pruna, quæ Ariecken vulgo dicuntur, gu-
stu acida, magnitudine majora, aut minora.

Pruna magna dulcia atrocaculea, C. B. Ungri-
sche Pflaumē. Pruna Ungarica, Matth. Damascena,
Trag. Brunensia, Clus. Sunt majora & minora.

Pruna magna rubra rotunda, C. B. Grosse
Rospflaumen. Pruna asinina, Trag. asinaria, Cæ-
sulp. Dantur etiam colore flavo, quæ appellantur,
Grosse gelbe Rospflaumen.

Pru-

Pruna coloris cereæ ex candido in luteum pallescente, C. B. Spillinge. Pruna cerea & Ceriola, Trag. Tab. Præcocia sunt majora, minora serotina. Ex istis quædã sunt ovi gallinacei magnitudine, unde dicuntur Eyserspillinge. Communiter sunt cerea tantũ: alia cerea & ex parte rubra: nonnulla proxus alba, weisse Pflaumen / sicut ova columbina.

Prunus sylvestris, C. B. * Matth. Fuch. Dod. Lob. Tab. Schleen. Prunus sylvestris vulgaris, Trag. Ad vivas sepes usurpatur: fructus adstrictoria vi pollet.

Pruna sylvestria præcocia, C. B. * Haberschleen. Pruni sylvestris altera species, Trag. Fructus præcedente major.

Psyllium majus erectum, C. B. * Psyllie. Psyllium, Trag. Fuch. Matth. Dod. Lob. primum, Tab. Pulicaris herba, Lugd.

Pulegium latifolium, C. B. Polen. Pulegium, * Trag. Matth. Dod. regium, Lob. Eyft.

Pulsatilla folio crassiore & majore flore, C. B. Rûchenschelle. Pullatilla, Matth. Dod. Tab. vulgaris, Lob. vulgaris dilutior, Clus.

Pyrola rotundifolia major, C. B. * Wintergrün mit runden blettern. Pyrola, Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. vulgator, Clus.

Pyrola folio mucronato serrato, C. B. * Wintergrün mit gespizten blettern. Pyrola secunda & tenerior, Clus. minor, Thal.

Pyrola frutescens arbuti folio, C. B. * Staudig Wintergrün. Pyrola tertia vel frutescens, Clus.

Pyrus sativa, C. B. Gartenbirnen. *Pyrus*, Dod. Pyra, Matth. Lob. Ejus licet adsint permultæ species, præcipuas tamen enuberabimus solummodo, duplicem constituendo classẽ. Prima continebit Pyra *magis durabilia*: nimirum Pyra hyemalia, Winterbirnen. Pyra Bergamensia hyemalia, Winter Bergamotten. Pyra Christiana hyemalia, Winter Bonchrestien oder Christenbirnen. Pyra muscatellina, Moschusbirnen. Pyra Brixiana, Brikerbirnen. Pyra Gorlicensia, Görlizerbirnen. Pyra cineracea, Graulinge oder ungenante Birnen. Altera recensabit *minus durabilia*: quæ sunt Pyra Augustana, Augstbirnen. Pyra aurea, Goldbirnen. Pyra avenaria, Haberbirnen. Pyra Bergamensia æstiva, Sommer Bergamotten. Pyra Borussica, Preussische Birnen. Pyra buxea, Buxbirnen oder kleine Muscatellerbirnen. Pyra Christiana æstiva, Sommer Bonchrestien. Pyra cruenta, Blutbirnen. Pyra cydonia, Coignekassen oder Quittenbirnen. Pyra globosa, Raubbirnen. Pyra lardina, Speckbirnen. Pyra palatina, Pfalzgraffer. Pyra pendula, Haugelbirnẽ. Pyra racemosa, Traubelbirnen. Pyra saccharina, Zuckerbirnen. Pyra stragulatoria, Würgebirnen. Pyra virginea, Jungferbirnen.

Pyrus sylvestris, C. B. * Wilde Birnen / Holzbirnen. Pyrafter, Gazæ. Pyra sylvestria, Tab. Vernacule fructus alicubi vocantur Knödeln.

Quercus cum longo pedicelo, C. B. * Eiche.
Quer-

Quercus, Trag. Matth. Tab. vulgaris, Lob. In aver-
sa parte foliorum profert interdum pilulas aquo-
sas, tanquam gallas imperfectas : item pilulas e fo-
liis convolutis, & excrementa alia.

Quinque folium album majus alterum, C. B.
Sünfffingerkraut mit weissen blumen. *Quinque-*
folium sylvaticum, Tab. sive *Pentaphyllum*, Clus.
Pentaphyllum albū, Matth. majus flore albo, Eyst.

Quinquefolium majus repens, C. B. * Krie-
chend Sünfffingerkraut das grosse. *Quinquefo-*
lium, Matth. Lob. majus, Dod. luteum majus,
Fuch. *Pentaphyllum vulgare*, Trag.

Quinquefolium minus repens luteum, C. B. *
Kriechend Sünfffingerkraut das kleine. *Quinque-*
folii minimum genus, Trag. *Pentaphyllum mi-*
nus luteum, Adv.

Quinquefolium rectum luteum, C. B. * Auff-
recht Sünfffingerkraut. *Quinquefolium vulgare*,
Lob. ic. alterum vulgare, Dod. Theophrasti ma-
jus, Tab. *Pentaphyllum majus*, Lob. Eyst. Ludit fo-
liis ternis, quinis, senis, ut plurimum septenis.

Quinquefolium folio argenteo, C. B. * Auff-
recht Sünfffingerkraut mit silberfarbenen blettern.
Quinquefolium petræum majus, Tab. erectum
incanum, Matth. luteum minus, Fuch. Ab incautis
cum *Tormentilla sylvestri* facile confunditur.

Quinquefolium palustre rubrum, C. B. *
Sumpffig Sünfffingerkraut mit rothen blumen.
Quinquefolium palustre, Tab. Eyst. Cam. ep.

quartum, Dod. Pentaphyllon rubrum palustre, Lob. ic.

Radix rhodia, C. B. Rosenwurz. *Rhodia radix*, Trag. Matth. Dod. Chuf. sive rosea radix, Lob. Rosea radix, Tab.

Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus, C. B. * Wald Hanefuß. *Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscoso flore*, Lob. ic. Moschatella, Cam. *Aristolochiæ rotundæ conca-væ similis herbula*, Trag. *Fumaria bulbosa seu tuberosa minima*, Tab.

Ranunculus pratensis erectus acris, C. B. * Aufrecht wiesen Hanefuß der scharffe. *Ranunculus pratensis surrectis cauliculis*, Lob. *hortensis secundus*, Dod. sylvestris & secundus, Tab.

Ranunculus pratensis erectus dulcis, C. B. * Aufrecht wiesen Hanefuß der gelinde. *Ranunculus pratensis vel primus*, Trag. dulcis, Tab. *hortensis erectus flore simplici luteo*, Eyll.

Ranunculus pratensis repens hirsutus, C. B. * Kriechender wiesen Hanefuß. *Ranunculus pratensis reptante cauliculo*, Lob. vinealis, Tab. *hortensis primus*, Dod.

Ranunculus pratensis radice verticilli modorotunda, C. B. * Wiesen Hanefuß mit wirblicher wurzel. *Ranunculus exiguus & primus*, Trag. minor, Tab. quintus, Matth. bulbosus, Lob. tuberosus, Dod.

Ranunculus hortensis erectus flore pleno, C. B.

C. B. Garten Hanefuß mit gefüllten blumen. *Ranunculus luteus vel tertius flore multiplici*, Trag. *Polyanthemos*, Lob. *sylvestris secundus*, Dod. *erectus hortensis flore pleno luteo*, Eyst. Hic interdum prolifer evadit.

Ranunculus bulbosus flore pleno, *C. B.* Gefüllter Hanefuß mit zwieblicher wurzel. *Ranunculus bulbosus major*, Eyst. *radice bulbosa flore pleno*, Cam.

Ranunculus radice tuberosa flore pleno & prolifero, *C. B.* Knollig Hanefuß mit gefüllten blumen und kindern. *Ranunculus tuberosus flore multiplici*, Dod. *Anglicus*, Tab. *magnus Anglicus polyanthos*, Lob. ic.

Ranunculus folio aconiti flore albo multiplici, *C. B.* Hanefuß mit weissen vollen blumē. *Ranunculus niveus polyanthos*, Lob. *pleno flore albo*, Clus. Eyst. *altus multiflorus*, Tab. *leucanthemos flore pleno*. Cam.

Ranunculus arvensis echinatus, *C. B.* * Ufer Hanefuß mit igelformigen samen. *Ranunculus arvensis*, Tab. *sylvestris tertius*, Dod. Lob.

Ranunculus stellatus echinatus Creticus, *C. B.* Gestirnter Hanefuß mit igelformigen samen. *Ranunculus echinatus Creticus*, Pon. Ital.

Ranunculus palustris apij folio levis, *C. B.* * Sumpff Hanefuß mit Wassermereß blettern. *Ranunculus palustris*, Dod. Tab. *palustris rotundior folio*, Lob. *primus*, Matth. *Apium aquaticū*, Trag. *Apium risus*, quorundam. *Herba Sardoia*, Guiland.

Ra-

Ranunculus aquaticus cotyledonis folio, C.B.*
 Wasser Hanefuß mit Nabelkraut blettern. *Ranunculus aquaticus umbilicato folio*, Column.
Cotyledon palustris, Dod. *aquatica acris*, Septentrionalium, Lob.

Ranunculus aquaticus folio rotundo, & *capillaceo*, C.B.* Wasser Hanefuß zngleich mit runden und zäßrigen blettern. *Ranunculus aquatilis*, Dod. *aquatilis hepaticæ facie*, Lob. *fluviatilis*, Tab.

Ranunculus longifolius palustris major, C.B.*
 Langblettriger Sumpffhanefuß der groſſe. *Ranunculus lanceatus major*, Tab. *Hujus folia prima aliquando subrotunda sunt*, ad *Cochleariæ formam accedentia*.

Ranunculus longifolius palustris minor, C.B.*
 Langblettiger Sumpffhanefuß der kleine. *Ranunculus lanceatus minor*, Tab. *flammeus aquatilis angustifolius*, Lob. *Flammula ranunculus*, Dod.

Ranunculus longifolius palustris serratus, C.B.*
 Sumpff Hanefuß mit langen ſägenformigen blettern. *Ranunculus lanceatus serratus*, Tab. *aquatilis angustifolius serratus*, Lob. *Flammula ranunculus folio serrato*, Dod.

Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice minor, C.B. Asiatiſcher Hanefuß etwas wollig. *Ranunculus Illyricus*, Eyst. Dod. Lob. Tab. *grumosa radice quartus*, Cluſ.

Ranunculus grumosa radice flore phæniceo
 mi-

minimo simplici, C.B. Asiatischer Hanefuß mit kleinen lichtrothen blumen. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice primus*, Clus. hist. & Tripolitanus phœniceo flore, pan.

Ranunculus grumosa radice ramosus, C. B. Asiatischer Hanefuß mit zweigen. *Ranunculus Asiaticus polyclonos sive grumosa radice secundus*, Clus. Asiaticus grumosa radice flore phœniceo ruberrimo, Eyst.

Ranunculus grumosa radice flore flavo vario, C. B. Asiatischer Hanefuß mit gelb und rothgestreiffen blumen. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto*, Eyst. Clus. cur. post.

Ranunculus grumosa radice flore albo, C. B. Asiatischer Hanefuß mit weissen blumen. *Ranunculus peregrinus grumosa radice primus*, Clus. Floris oræ suaviter rubent.

Ranunculus asphodeli radice flore sanguineo, C.B. Asiatischer Hanefuß mit gefüllten blutrothen blumen. *Ranunculus sanguineus multiplex*, Lob. Turcicus sive sanguineus, Tab. Asiaticus grumosa radice pleno flore secundus, Clus. Huic cognatus:

Ranunculus asphodeli radice flore in ambitu subphœniceo rubente, in medio lineis flavis interstincto, qualis crescebat in Hortis aulicis Bero-linensibus anno 1659. & 1660. Geslammeter Asiatischer Hanefuß.

Ranunculus asphodeli radice folio lato nervoso flore flavo pleno. Asiatischer Hanefuß mit breiten adrichen blettern und gefüllter gelben blume. Referendus ad *Ranunculum Lusitanicum primum*, Tab. aut *Lusitanicum autumnale* in *Lobellii*, qui tamen est flore simplici, & à C. B. sub *Ranunculo latifolio bullato asphodeli radice* fuit comprehensus.

Ranunculus asphodeli radice prolifera miniatius, C. B. Asiatischer Hanefuß mit kindern. *Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore* 3. *Clus. pleno flore tanguineo prolifero*, Eyst.

Rapa sativa rotunda seu mas, C. B. Runder Rüben. *Rapum sativum*, Fuch. Ruell. vulgare, Trag. Dod. rotundum, Matth. orbiculatum, Tab. majus orbiculatum seu turbinatum, Lob.

Rapa sativa oblonga, seu fœmina, C. B. Lange Rüben. *Rapū oblongum*, Trag. oblongius, Dod. longum, Matth. Tab. tereti rotunda oblongaq; radice, Lob. Inter nostrates celebrantur exiguæ quidem, sed grati saporis rapæ, quæ in agris vicinis Teltoviriano & Frisicano coluntur.

Rapa sylvestris, C. B. * Wilde Rüben. *Rapum sylvestre*, Matth. Tab. sylvestre non bulbosū, Lob. Radix oblongula quidem, sed culinæ insueta.

Raphanus major orbicularis vel rotundus, C. B. Großer runder Rüberettig. *Raphanus*, Trag. rotundus, Tab. vulgaris primus, Matth. magnus, Lob. Radicula prima, Dod.

Raphanus niger, C.B.Lob. ic. Schwarz Rübe-
rettig. *Raphanus cortice nigricante*, Ges. hor. ra-
dice nigra, Cam.

Raphanus minor oblongus, C.B. Radis. Ra-
phanus longus, Trag. Matth. minor purpureus,
Lob. Radicula sativa minor, Dod.

Raphanus rusticus, C.B. & Lob. Merrettig.
Raphanus major, Trag. marinus, Tab. vulgaris &
rusticanus, Matth.

*Raphanus aquaticus folijs in profundas laci-
nias divisjs*, C. B. * Wasser Kettig. *Raphanus a-
quaticus*, Tab. sylvestris officinarum aquaticus,
Lob, ic. Radicula sylvestris, Dod.

Rapistrum flore luteo, C. B. * Hederich mit gel-
ben blumen. *Rapistrum*, Dod. arborum, Lob.
Lampfana, Matth. flore melino, Tab. Hordeo ut
plurimum innascitur: siliquæ sunt articulatae.

Rapistrum flore albo siliqua articulata,
C. B. * Hederich mit weissen blumen. *Rapistrum*
flore albo *Erucae folijs*, Lob. ic. *Armoracia*, Tab.
& Schroederi.

Rapunculus esculentus, C. B. Wurzelrapünzel.
Rapunculus, Matth. Dod. Tab. *Rapunculum vul-
gare*, Trag. *Rapuntium parvum*, Lob. Hujus ra-
dix imprimis, deinde etiam folia ima à coquis ex-
petuntur. Semen minutissimum omnium, verno
tempore jacitur. *Rapunculo* vero ille spontaneus,
Feldrapünzel est species *Valerianæ*, de qua inferio.

*Rapunculus hortensis latiore folio, seu Pyrami-
da-*

dalis, C. B. Pyramidal. Campanula major, Dod. major lactescēs, Lob. lactescens fœtidior, Clus. lactaria, Tab. Pyramidalis Lutetiana, Eyst.

Rapunculus Creticus, seu *Pyramidalis altera*, C. B. Petromarula. Rapunculus Creticus petromarula, Jo. Bauh. Petromarula seu Lactuca petraea Cretica, Belli, Ponæ, Clus. Semen minutissimum, & ægre apud nos provenit.

Reseda vulgaris, C. B. Reseda. Reseda latifolia, Tab. Rheseda Plinii, Eyst. Rheseda Plinii Neotericorum, Adv.

Rhamnus catharticus, C. B. * Wegedorn. Rhamnus solutivus, Dod. Spina infectoria, Matth. Lob. Tab. Clus. Spina cervina vulgo, Ges. hort. Ex baccis inamaturis color luteus, ex maturis viridis paratur: itemque in Officinis Syrupus domesticus sive de Spina cervina.

Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente, C. B. Wegedorn mit Wendenblettern. Rhamnus secundus, Matth. Dod. Clus. primus Dioscoridis creditus, Lob. Oleaster Germanicus, Cord. Sanddorn/Weidendorn. Fructus Batavis Durnenbesing / quoniam in mariuo littore locis arenosis proveniunt, dicuntur.

Rhamnus folio subrotundo fructu compresso, C. B. Judendorn. Rhamnus tertius, Matth. Paliurus, Dod. Lob. Eyst. Spina Judaica Crescentio. Spina Christi quibusdam.

Rhus folio Ulmi, C. B. Gerberbaum / Tauerbaum/
baum/

baum/Schlingbaum. Rhus, Matth. Tab. coriaria, Dod. obloniorum, Lob. Clus. Sumach Arabum, Lon.

Rhus myrtifolia Monspeliaca, C. B. Gerberbaum mit Myrtenblettern. *Rhus myrtifolius*, Tab. sylvestris Plinii, Lob. Dod.

Ricinus vulgaris, C. B. Wunderbaum. *Ricinus*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. major, Eyst.

Ricinus Americanus major semine nigro, C. B. Americanischer Wunderbaum. *Ricinus Americus*, Lob. ic. Tab. Clus. not. ad Monard. *Syricus*, Cam.

Rosa rubra, C. B. & Tab. Röhre Rosen. *Rosa domestica punicea*, Matth. hortensis rubra multiplex, Trag. Damascena, Lob. sativa tertia, quæ Provincialis Gallis, Dod. Hujus folia quoniam colorem & odorem diutius servant, & adstringendi majore vi pollent, a Pharmacopœis ulurpantur ad odoramenta, & Aceti, atque Conservæ rosarum vitriolatæ confectionem. Caterum in hoc ipso frutice frequentius contingere adverti lusum illum aut errorem Naturæ, per quem ramulorum nonnulli florei prodeunt. Nimirum flos pediculo non innititur suo, sed ramulum ambit ea ratione, ut is per medium florem transiisse pulchro spectaculo videatur.

Rosa rubra pallidior, C. B. Blasfrohte oder Zucker Rose / quoniam ex ejus flore Conservam rosarum simplicem Officinæ parant. *Rosa holoserica*,

cea, Lob. ic. damascena rubra, Lugd. fativa quarta, quæ francha Gallis, Dod. rubicunda, Cam. Rosam tamen rubicundam Saccharinam dictam ad priorem Bauhinus retulit.

Rosa saturatus rubens, C. B. Knopffrosen/ quoniam alabastro sunt crassiore : item Rohlfrosen/ quia rubor ad nigredinem vergit. Rosa prima Prænestinæ similis, Clus. purpurea sive in rubro nigricans, Cam. Ad parandam Aquam stillatitiam adhiberi quoque potest.

Rosa purpurea, C. B. Leisfarbene Rosen/ Gemeine Centifolien. Rosa domestica carnis colorem referens, Matth. fativa secunda sive incarnata, Dod. provincialis major, Tab. provincialis flore incarnato pleno, Eyst. Hanc pro conficiendo Rhodopharmaco sive Syrupo Rosarum solutivo Medicamentarii nostri adhibent.

Rosa maxima multiplex, C. B. Grosse Holländische Centifolien. Rosa Centifolia Batavica rubra, Clus. Eyst.

Rosa minor rubello flore, C. B. Mayrosen/ Kleine Provinzrosen. Rosa provincialis minor, Tab. cinamomea altera, Cam. majalis quibusdam, forte ob præcocitatem. Flos exiguus, & parum odoratus : multis tamen foliolis stipatur.

Rosa alba vulgaris major, C. B. Weiße Rosen einfach/ und auch gefüllet. Rosa alba, Tab. fativa alba & prima, Dod. domestica alba, Matth.

Matth. hortensis candida, Trag. Istac ut plurimum pro paranda Aqua rosarum stillatitia utuntur.

Rosa moschata simplici flore, C. B. Einfache Moschresen. Rosa moschata & Damalcena, Matth. muscata alba, Tab. muscata hortensis flore simplici, Lob. sativa quinta, Dod. Damascena simplici flore, Cam. Eyft. Huic quam ulli alteri major vis inest hypagoga, immo tanta, ut vicena floris recentis folia devorata facile alvum subducant, suffragio Matthioli. Celebrant Itali suum Syrupum aureum Ducis Mantuani, & modum compositionis occultant Phāmacopœi illi, quibus arcanum innotuit. Nos ægre ab aliquo ipsorum extorsimus, & est sane medicamentum regium. Conficitur autem ex rosis moschatis utrisque ea tamen differentia, ut Syrupus, si hæ solæ allumantur, efficacior: sin sequentes, debilior evadat, solent tamen plerumque misceri.

Rosa moschata flore pleno, C. B. Belle Moschresen. Rosa moschata, Lob. ic. alba multiplex, Tab. alba Damascena flore pleno, Eyft. damascena sive moscata pleno flore, Cam. sativa quinta multiplex, Dod. Rosæ moschatæ apud nos hæctenus infrequentes: e re tamen foret, in usum trahi ipsas ob insignem efficaciam. Quin & has innuere videtur Phāmacopœia Aūguſtana, dum pro præparando Mucharo sive Syrupo Rosarum solutivo simplici, Rosas Damascenas

recipi jubet, quæ cum Moschatis apud Matthiolum sunt eadem.

Rosa menstrua. Monatrosen. Frutex valde spinosus est, & altius surgit: flores umbellatim juncti nascuntur, foliolis L. aut LX. constant, magnitudine Centifolias æquant, odore Moschatas referunt, in colore pallor rubedini prævalet: quas notas peculiari Programme expressit Exc. Dn. Leonhardus Ursinus. An Rosa moschata semper vireus, C. B. & Clus. app. alt. auct. Rosa Italica perpetua, si-ve omnium mensium, Jo. B. Ferrarii l. 3. Floræ c. 18. & Illustr. Comit. Octavii Brembati lib. 1. Protei Legati. Id autem ingenii habet Rosa hæc, ut primo vere calyces confertissimos quidem simul parturiat, eosdem vero non simul, sed successive aut per intervalla explicet: quod si primum hiantes decerpas, ferotini tota æstate vernaturi subnascuntur. Deinceps autumn. se se denuo in calyces effundit, à quibus ipsa hyems in Hibernaculis flores expectet: adeo ut per naturam hic frutex biflorus sit, seu potius genituram florum bis protrudat, qui se ordine alii post alios pandunt. Amputatione autem & verna & autumnali non parum ingenita vis excitatur: immo Brembatus in singulis vasis per singulos menses (sicut in cultura Anemonarum fieri solet) frutices novos pangit, alimentum primo subtrahit, deinde affatim inundat, atque hoc artificio rosetum sibi toto anno floridum comparat.

Ro-

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato, C. B. * Wilde Rosen / cujus fructus vesci sunt, & plebi dicuntur Haagebutten / Wipen: Rosa sylvestris, Matth. Dod. Tab. canina odorata & sylvestris, Lob. Cynosbatus Dioscoridis, Lon. Cynorrhodos, Plinii. Huic crebro adnascitur spongiola castaneæ similis, quæ Bedeguar officinis nuncupatur.

Rosa odore cinamomi simplex, C. B. Zimmetrose. Rosa cinamomina, Dod. Rose de canelle, Lob. ic.

Rosa flore simplici miniata, aversa parte luteo. Türkische Rosen. Rosa Turcica flore simplici luteo-phœniceo, Hort. Hafniensis. Rosa flavorubra dici quoque posset.

Rosa lutea simplex, C. B. Einfache gelbe Rosen. Rosa lutea, Lob. Cam. flore simplici, Eyst. citrina, Gesn. hor. sylvestris tertia vel Rosa octava, Dod.

Rosa lutea multiplex, C. B. Volle gelbe Rosen. Rosa flava plena, Clus. lutea maxima flore pleno, Eyst. Est flore expanso, & flore semiclauso.

Rosa Hierichuntea vulgo dicta, C. B. Rose von Jericho. Rosa Hiericontea, Lon. Lob. aperta & conclusa, Eyst. Hierichontina prima & secunda, Tab.

Rosmarinus hortensis angustiore folio, C. B. Rosmarin Rosmarinus, Trag. Rosmarinum coronarium, Matth. Lob. Eyst. Nobilior habet

betur, cui folia latiora; varietas tamen hæc est, non constituens peculiarem speciem.

Rosmarinus folio maculato. Bergülster Rosmarin. quoniam maculis luteis, aut auri quodammodo a mulis, folia hinc inde asperguntur: cætera ab altero non differt.

*Ros solis folio rotundo, C. B.** Sonnentau. Ros solis, Dod. Rorida sive Ros solis major, Lob. Rorella minor prima, Tab. Ror. sive Ros solis, Eyst.

Rubia tinctorum sativa, C. B. Gerberrothe. Rubia sativa, Trag. Matth. Dod. major, Lob. Clus.

*Rubus vulgaris, sive fructu nigro, C. B.** Schwarze Brombeern. Rubus, Matth. Dod. Lob. arvensis, Tab. Fructus grati saporis, & moris similes.

*Rubus repens fructu casio, C. B.** Blauschwarze Brombeern. Rubus minor, Dod. humilis & primus, Trag. humilis Belgicus, Clus.

Rubus odoratus Americanus. Americanische Brombeerstaude. Rubus magnus odoratus, Hort. Lugdun. Batav.

*Rubus Idæus spinosus, C. B.** Hindbeern. Rubus Idæus, Trag. Matth. Dod. Lob. Idæus vulgaris, Clus. Fructus spiritus vitales reficit: quamobrem inde Syrupus, Vinum, & Acetum parantur.

Ruscus, C. B. Trag. Matth. Lob. Tab. Eyst. Meusedorn/Myrtendorn. Ruscum, Dod. Myrtacantha, Lob. ic. Bruscus, quorundam.

Ru-

Ruta hortensis latifolia, C. B. Raute. Ruta, Matth. domestica, Trag. hortensis, Lob. latifolia, Tab. graveolens hortensis, Dod.

Sabina folio Tamarisci, C. B. Unfruchtbarer Sevenbaum. Sabina, Trag. Fuch. Dod. Lob. sine baccis sive sterilis, Matth. Savina mas, Tab.

Sabina folio Cupressi, C. B. Fruchtbarer Sevenbaum. Sabina altera, Dod. baccifera, Matth. foemina minor, Tab. genuina baccifera atrorubra, Lob.

Sagitta aquatica minor latifolia, C. B. * Pfeilkraut mit breiten blettern. Sagitta minor, Matth. Dod. Lob. Tab. Sagittalis & Sagittaria, quorundam.

Sagitta aquatica minor angustifolia, C. B. * Pfeilkraut mit schmalen blettern. Sagitta minor angustifolia, Tab.

Salix vulgaris alba arborescens, C. B. * Weisse Weide/ oder Weide mit weissen gerten. Salix Dioscoridis, Lob. prima vel major, Dod. ex qua perticae fiunt, Matth.

Salix vulgaris rubens, C. B. * Röhrliche Weide. Salix minor, viminalis & Gallica, Dod. colore rufescente, Matth. primum genus, Lon. Hujus vimina ad vinciendum idonea, praecipue si aqua prius macerentur. In ramorum cacumine nonnunquam observavi, pilulas crispas, foliosas, & ad formam spicae digestas adnasci.

Salix vulgaris nigricans folio non serrato, C. B.* Schwarzhliche Weide mit ungeferbeten blettern. *Salicis primum genus*, Trag. Fuch. *Salix nigra seu punicea*, Lon.

Salix sativa lutea folio crenato, C. B.* Gelbe Weide mit geferbeten blettern. *Salix tertia*, Trag. *angustifolia sylvestris*, Tab. *Salicis alterum genus*, Fuch.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito, C. B.* Weide mit geöhrten Mandelblettern. *Salix sylvestris latifolia*, Tab. *Singulorum foliorum exortibus* alæ binæ apponuntur.

Salix fragilis, C. B.* Bruchweide. *Salix alba*, Lon. *secunda cortice candido*, Trag. Hæc ad vincula prorsus inutilis.

Salix latifolia rotunda, C. B.* Senlweide mit runden blettern. *Salix latifolia*, Clus. *caprea rotundifolia*, Tab. Hujus carbone pictores utuntur elegantiores, & qui pulverem tormentarium conficiunt. In ejus ramulis folia dense interdum congeruntur, ut Rosam flore pleno referant: sicut aliquoties mihi observare licuit.

Salix folio ex rotunditate acuminato, C. B.* Senlweide mit etwas gespizten blettern. *Salix caprea latifolia*, Tab. *aquatica*, Lob. ic. Præcedenti cognata, & vix alia re, quam forma folii differt.

Salix pumila linifolia incana, C. B.* Zwergweide. *Salix pumila angustifolia prior*, Clus. Valde frequens quibusdam sabuletis nostris: sed folia

lia non sunt tam acuta, quam a Clusio pinguntur. Præterea majorem, & minorem quandam reperimus.

Salvia major, C. B. Matth. Dod. Tab. Gresse Salben. *Salvia latifolia*, Clus. major scabrior Dioscoridis, Lob. major latifolia flore caruleo, Eyst.

Salvia minor aurita, & *non aurita*, C. B. Kleine geöhrte und ungeöhrte Salben / Kreuz Salben. *Salvia minor*, Matth. Lob. Tab. pinnata, Eyst. angustifolia, Clus.

Sambucus fructu in umbella nigro, C. B.* Gemeiner Slieder / Holunder. *Sambucus*, Matth. Dod. Lob. ic. Tab. vulgaris, Trag. Hunc Salici innatum aliquoties invenimus, pro amuleto contra Epilepsiam: immo tota hæc stirps juxta singulas partes medicinalis est.

Sambucus racemosa rubra, C. B. Traubenslieder mit rothen beeren. *Sambucus sylvestris*, Trag. montana, Matth. montana racemosa, Lob. quarta, Dod. cervina, Tab.

Sambucus laciniato folio, C. B. Slieder mit zerschnittenen blettern. *Sambucus laciniata*, Tab. foliis laciniatis, Lob. laciniato folio, Dod.

Sambucus humilis sive Ebulus, C. B.* Attig. Ebulus, Trag. Matth. Lob. Tab. sive humilis *Sambucus*, Dod. Vulgaris altitudinem non attingit hic: purgandi vero virtute magis pollet.

Sambucus aquatica flore simplici, C. B.* Wasser

ser= Glieder mit schlechten blumen. *Sambucus aquatica*, Trag. Matth. Tab. Lob. ic. palustris, Dod. Hujus baccæ per maturitatem rubentes, vulgo Kallinen dicuntur, quibus aucupes pro capiendis turdis tempore autumnali, quoties baccæ Sorbi sylvestris desunt, utuntur.

Sambucus aquatica flore globoso pleno, C. B. Wasserflieder mit kuglichen blumen / Schneeballen. *Sambucus aquatica polyanthos*, Tab. rosea, Lob. ic. Eyst. palustris secunda, Dod.

Sanicula officinarum, C. B. * Sanickel. Sanicula, Trag. Dod. Tab. Eyst. Diapensia, Matth. Sanicula & Diapensia, Lob.

Sanicula montana latifolia laciniata, C. B. Breitblettrig Berg-Sanickel. *Sanicula montana*, Clus. alpina, Tab. Cortusa, Matth. Caryophyllata Veronensium flore Saniculæ ursinæ, Lob. Nostræ prior figura Clusii & Tab. magis quadrat.

Sanicula Cortusa Americana. Americanische Cortusa oder Bergsanickel. A præcedenti non parum differt.

Sanicula montana rotundifolia major, C. B. Rundblettrig Bergsanickel die grosse. *Sanicula montana altera*, Clus. Eyst. alpina, Cam. ep. guttata, Eid hor. Caryophyllata sive Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Adv. Lob. ic. Umbilicus Veneris Septentrionalium, nonnullis Italis.

Sanicula montana rotundifolia minor,
C. B.

C. B. Rundblettrig Berg-Sanickel die kleine,
Saniculæ montanæ alterius species secunda,
 Clus.

Sanicula alpina lutea, C. B. Bährohren mit
 gelben blumen. *Sanicula sive Auricula urfi*,
 Matth. *Auricula urfi*, Dod. floribus luteis,
 Tab. Eyft. prima vel luteo flore, Clus. Paralyti-
 ca alpina *Sanicula*, Lob. Item flore albo, argenteo,
 maculato.

Sanicula alpina purpurea, C. B. Bährohren
 mit purpurblumen. *Sanicula alpina rubra*, & *Pri-*
mula alpina latifolia, Tab. *Auricula urfi secunda*,
 Clus. flore purpureo, Lob. ic. Item flore rubro,
 & incarnato.

Saponaria major levis, C. B. Seiffkraut.
Saponaria, Dod. Lob. Tab. Eyft. *Viola agre-*
stis, Trag.

Saponaria major flore pleno. Seiffkraut
 mit vollen blumen. Color floris ex albo dilute
 purpurat.

Satureja hortensis, C. B. Rölle / *Saturey*: com-
 muniter etiam Pfefferkraut / quæ tamen ap-
 pellatio *Lepidio* magis proprie competit. *Satu-*
reja, Trag. Dod. Lob. Tab. altera, Matth. dome-
 stica, Eyft. *Thymbra*, Dios. Plauta est annua, se-
 quens vero perennat.

Satureja montana, C. B. Rölle / Winterpfeffer-
 kraut / Spanisch Thymian. *Thymbra*, Dod.
 Tab. Eyft.

Saxifraga rotundifolia alba, C.B. * Weisser Steinbrech. *Saxifraga alba*, Trag. Dod. Tab. alba tuberosa radice, Clus. alba chelidonides, Lob. *Saxifraga quarta*, Matth. Huic grana ad radices nascuntur.

Saxifraga rotundifolia aurea, C.B. * Göllden Steinbrech. *Saxifraga aurea*, Dod. Eyf. aurea lichenis facie & natalitiis, Lob. *Chrysosplenium*, Tab. An Hepatica palustris, Eyf. qui tamen quare ipsi flores hic pingat cæruleos, nondum liquet, nisi sit planta ab hac diversa.

Scabiosa pratensis hirsuta, quæ *Officinarum*, C.B. * Scabiose / Apostemkraut. *Scabiosa aivensis*, Tab. altera campestris seu segetum, Lob. ic. vulgaris, Eyf. *Scabiosæ* primum genus, Trag.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente, C.B. Kleiu zerschnittene Scabiose mit gelben blumen. *Scabiosa septima*, Clus. *Pannonica* flore albo, Eyf. lutea è Thuringia, Cam.

Scabiosa flore globoso niveo, C.B. Scabiose mit kuglichen schneeweissen blumen. *Scabiosa alba* in hortis Belgii, Clus. *Belgica* flore albo, Eyf.

Scabiosa prolifera folio latiore, C.B. Scabiose mit nebenblümlein. *Scabiosa prolifera*, Tab. Lob. ic. prolifero flore, Clus.

Scabiosa latifolia non laciniata flore purpureo muschato. * Moschriechende Scabiose. An *Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda*, vel *Scabiosa minor capitulo globoso odoro*, C.B. In syl-

Sylva Mullenbecensi, quæ transitur Aurangiburgum profectis.

*Scabiosa capitulo globoso major, C. B. * Kund-
köpffige Scabiose die grosse. Scabiosa minor,
Matth. Lob. media, Dod. quinta sive montana,
Clus. vigesima fœmina herbariorum, Tab.*

*Scabiosa capitulo globoso minor, C. B. * Kund-
blettrige Scabiose die kleine. Scabiosa minor se-
cunda, & quinta, Tab. angustifolia flore subcæru-
leo, Eyf.*

*Scabiosa stellata folio laciniato major, C. B.
Stern-Scabiose mit zerschnittenen blettern. Sca-
biola peregrina, Dod. Hispanica major, Clus. Lob.
Tab. Eyf.*

*Scabiosa stellata folio non dissecto, C. B.
Stern-Scabiose mit unzerschnittenen blettern.
Scabiosa peregrina, Lob. peregrina foliis non dis-
sectis, Tab. arborea Cretica, Ponæ.*

*Scilla vulgaris radice rubra, C. B. Meerzwie-
bel. Scilla, Trag. Matth. rubentibus radicis tunicis
folio aloes carinato, Lob. Pancratium, Dod.
Tab. Clus.*

*Scolymus chrysanthemos, C. B. Gold-Distel.
Scolymus Theophrasti, Clus. Lob. Tab. Cam.
Carduus chrysanthemus, Dod.*

*Scordium, C. B. * Lachenknoblauch. Trag.
Matth. Dod. Lob. Tab. Eyf.*

*Scordium alterum seu Salvia sylvestris, C. B. *
Galben-Scordium. Scordium alterum Pli-
nii*

nii, Lob. Cam. *Salvia sylvestris*, Trag. *agrestis* five *Sphacelus*, Dod. *Scorodonia*, Cord. Thal.

Scorpioides bupleuri folio, C. B. Tab. Cam. Scorpionkraut. *Scorpioides prior*, Dod. *repens bupleuri folio*, Lob.

Scorpioides portulacæ folio, C. B. Scorpionkraut mit Portulac blettern. *Scorpioides Matthioli*, Dod.

Scorzonera latifolia sinuata, C. B. Spanische Scorzonere oder Schlangemord. *Scorzonera*, Dod. Lob. *Hispanica*, Matth. Tab. *major Hispanica prima*, Clus. *Salsifix d'Espagne*, Gallis: quoniam in radice utuntur in cibis perinde, ut radice *Tragopogi*.

Scorzonera latifolia altera, C. B. Deutsche Scorzonere. *Scorzonera Germanica*, Tab. *latifolia*, Eyllt. *Boemica*, Matth. Lob. *major vel pannonica prima*, Clus.

Scrophularia nodosa foetida, C. B.* Knotenkraut/ Braunwurz. *Scrophularia*, Matth. Dod. *major*, Lob. Tab.

Scrophularia aquatica major, C. B.* Wasserknotenkraut das grosse. *Betonica aquatica*, Dod. Lob. Tab. *Ocimaltrum majus*, Trag.

Scrophularia aquatica minor, five palustris non foetida, C. B.* Wasserknotenkraut das kleine. *Scrophularia foemina*, Cam. ep. *Betonica aquatica septentrionalium species minor*, Lob.

Secale hybernum, C. B. Winter Rogge / quoniam autumnno satum, licet ante hyemem prodeant folia graminea, culmos tamen non profert nisi vere subsequenti anni, æstate demum perficiendum. *Secale*, Matth. Lob. Tab. Siligo veterum & *Secale*, Trag. Rogga sive *Secale* Plinii, Dod. Hoc apud nos verno vulgatius. Datur vero ejus singularis quædam quasi species, quam à culmorum multitudine *Staudenrogge* nominant: spicæ bipalmares sive octo unciarum sunt, & granis admodum turgent. Requirit solum fertile, & sationem minus densam. Seri in Norvegia & Pomerania ob fertilitatem non paucis locis solet: inde in Marchiam allatum nuper & tam felici successu satum, ut anno præsentis septuagenum granum tulerit. Vocari *Secale hybernum* fertilius posset.

Secale vernum, C. B. Sommer Rogge / quod vere primo feritur, & subsequente mox æstate maturefcit. Grana *Secalis hyberni* ab alterius granis vix possunt solo visu discerni, si miscantur: ideoque singula seorsim asservanda veniunt. Siligo æstiva, Trag. Rogga sive *Secale æstivum*, Dod.

Securidaca lutea major, C. B. Groß Beylsfraut. *Securidaca major*, Matth. vera, Clus. Hedyсарum, Ges. hor. Lon. majus, Cam. primum, Dod. sive *Securidaca major*, Lob.

Securidaca lutea minor corniculis recurvis,
C. B.

C. B. Klein Beylfraut. *Securidaca minor*, Matth. Lob. Cam. *Hedysarum alterum*, Dod. *Astragalus Monspeliacus*, Clus.

Securidaca filiquis planis utrinque dentatis, C. B. Zwenfchneidig Beylfraut. *Securidaca peregrina*, Clus.

Sedum majus arborescens flosculis candidis, C. B. Baumicht Hausflaub. *Sedum majus legitimum*, Clus. *arborescens majus Græcum*, Lob. ic. Eyst. *Sempervivum arborescens*, Matth. Dod. *Aizoon arborescens*, Cam.

Sedum majus vulgare, C. B. Grosse Hauswurz/ Hausflaub. *Sedum majus*, Tab. vulgare, Eyst. *Sempervivum majus*, Matth. Lob. *majus alterum sive Jovis barba*, Dod. *Cotyledon altera prima*, sive *Sedum majus vulgare*, Clus.

Sedum majus montanum dentatis folijs, C. B. Groß Hausflaub mit bezähnten blettern / Spinnweb/ quoniam per cuspides foliorum fila visuntur quasi ab araneis ducta. *Cotyledon altera secunda*, Clus. *Aizoon seu Sempervivum majus*, Thal.

Sedum majus montanum folijs non dentatis, fl. rubentibus, C. B. Groß Hauswurz mit rechten blumen. *Sedum minus flore rubente*, Eyst. *Cotyledon altera tertia*, Clus. Etiam in hac fila ducta apparent.

Sedum cristatum lato caule. Breitstenglich Hauswurz oben ganz gefrauset. *Sedum Burgundicum*, quibusdam. *Caule est lato, plano, & sub*
initium

initium rubente: inferius is acuminatur, & ex cuspide terræ commissa radículas emittit fibrosas. Cæterum inferiore parte foliis caulis destituitur, progrediente quoque nuditate illa surlum versus singulas lacinias, in quas ipse superius, Linguae instar cervinæ multifido folio, C. B. dirimitur. Laciniarum upperior pars stipatur foliis viridibus, exiguis, teretibus, qualia fere in Sedo minore teretifolio luteo, C. B. videntur: posita vero folia illa cristam galli gallinaei sua incurvatione referunt. Successu temporis emittit ramos longiulculos, degeneraturum quasi in Sedum illud teretifolium modo nominatum. An à quoquam hætenus descriptum sit, aut pictum, me latet.

Sedum minus teretifolium luteum, C. B. Kleine gelbe Haupswurz mit ründlichen Blättern. Sedum minoris secunda species, Trag. Sempervivum minus æstivum, Lob.

Sedum minus luteum folio acuto, C. B. Kleine gelbe Haupswurz mit spizigen Blättern. Sedum minus quintum, Clus. minus hæmatodes, Tab. Sempervivum minus primum, Dod. Aizoon hæmatoides, Lob. ic.

Sedum minus vermiculatum acre, C. B. * Scharffer Maupfeffer. Sedum minimum, Tab. minimum causticum, Eyst. minus octavum causticum, Clus. minus tertium & Vermicularis

Trag. Sempervivum minimum sive tertium, Matth. minimum sive Illecebra, Lob. Illecebra sive Sempervivum tertium, Dod.

Sedum minus vermiculatum insipidum, C.B.* Maupfeffer ohn geschmack. Sedum minus seu Vermicularis insipida, Eyst. Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

Sedum minus fruticosum, C.B. Kleine Staudige Haupwurcz. Sedum minimum arborescens vermiculatum, Lob.

Senecio minor vulgaris, C. B.* Kreuzkraut / Baldgreiß. Senecio, Matth. Lob. primus, Tab. vulgaris & primus, Trag. Erigerū, Diosc. & Plin.

Serpyllum vulgare majus, C.B. Großer Quendel. Serpyllum album primum & secundum, Tab. majus flore purpureo, & aliud candido, Cam.

Serpyllum vulgare minus, C. B.* Kleiner Quendel. Serpyllum, Trag. Lob. vulgare, Dod. sylvestre, Matth. minus flore albo, & flore purpureo, Tab. vulgare repens, Clus.

Serratula, C.B.* Matth. Dod. Lob. Clus. Scharfenkraut. Serratula tinctoria, Tab. tinctoris, Eyst.

Sesamum veterum, C. B. Leindotter / Flachsdotter. Sesamum, Matth. Lob. Dod. Tab. & Officinarum. Sesamum verum, Cam. In his regionibus semen jactum ægre provenit: in Sicilia & Creta sponte nascitur.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta, C.B.* Gliedkraut. Sideritis vulgaris, Cam. ep. vel secunda, Clus. quar-

quarta, Lon. sive ferruminatrix, Adv. Lob. ic.

Siliqua edulis, C. B. cujus fructus in Officinis Germaniæ dicitur Panis divi Johannis, S. Johannesbrod. Siliqua, Matth. ceronia, Clus. Ceratonia, Dod. Ceratia vel Siliqua, Tab. & Lobelii, qui Adversar. p. 414. Multū hæc cognita Niceæ, inquit, & maris Ligustici accolis, ubi eam esitant pueri, etiamq; porci. Quare qui sacram paginā vertunt, hanc debent intelligere Luc. XV. 16. de filio profligato.

Siliqua sylvestris rotundifolia, C. B. Judasbaum. Siliqua sylvestris, Clus. Cam. ep. Arbor Judæ, Dod. Lob. Tab. Eyst.

Sinapi rapifolio, C. B. Gartensenff mit rüben blettern und gelben samen/ Weisser Senff vulgo. Sinapi Diosc. Theoph. alterum, Plin. primum, Matth. album, Cam. sativum prius, Dod. sativum Eruce aut Rapi folio, Lob. Semē huic luteū tribuit Matthiolus, & pro Eruce semine, wit Mostaertsaat/ ab officinis Belgii exponi, Dodō æus affirmat.

Sinapi apij folio, C. B. Gartensenff mit Wassermerck blettern und braunrothen samen/ Schwarzer Senff vulgo, Sinapi gracile, Plin. alterū, Matth. qui ipsi subruffum vel album semen adscribit. luteum sativum alterum, Trag. album, Eyst. primum, Fuch. sativum alterum, Dod. Præcedente acrius est, ipsique addi solet, quoties Mostarda magis vellicans expetitur.

Sinapi Eruce folio, C. B. * Wilder Senff. Sinapi tertium, Matth. sylvestre, Dod. sylvestre minus bursa pastoris folio, Lob. Na Sion

*Sion sive Apium palustre folijs oblongis, C. B.**
 Wassermerck mit länglichen blettern. Sium verū,
 Matth. odoratum, Trag. primum minus, Tab. sive
 Laver, Lob.

Sisarum Germanorum, C. B. Zuckerwurzel.
 Sisarum, Trag. Dod. Lob. Tab. Siser, Matth.

Smilax aspera fructu rubente, C. B. Stechende
 Winde. Smilax aspera, Matth. Dod. Lob. aspera ve-
 ra, Trag. aspera prima & tertia, Tab. aspera fructu
 rutilo, Clus.

*Solanum officinarum, C. B.** Nachtschatten.
 Solanum vulgare, Trag. lativum, Tab. hortense,
 Matth. Dod. Lob.

Solanum vesicarium, C. B. & Dod. Judenfir-
 schen. Solanum halicacabum, Trag. Matth. Lob.
 Halicacabum vulgare, Eyst. Alkekengi, Lon.

Solanum vesicarium Indicum, C. B. Indiani-
 sche Judenfirsch. Halicacabum sive Solanum In-
 dicum, Cam. Eyst.

Solanum vesicarium folio Atriplicis. Juden-
 firsch mit Meldeblettern aus Brasilien. Co-
 maru Brasiliensium.

*Solanum melanocerasos, C. B.** Nachtschatten
 mit schwarzen firsch. cerasa enim nigra fructus
 plane refert. Solanum majus, Matth. somniferum,
 Lob. hortense nigrum, Trag. lethale, Dod. Clus.
 cui etiam Belladonna, pan.

Solanum fruticosum bacciferum, C. B. Stau-
 diger Nachtschatten. Solanum fruticosum, Tab.
 Snych-

Strychnodendron, Lob. Eyft. Pseudocapsicum, Dod. Amomum Plinii, quorundam.

Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. * Einbeer/Wolfsbeer. *Solanum tetraphyllum*, Lob. Herba paris, Matth. Dod. Eyft. Aconitum saluterum, Tab.

Solanum scandens seu Dulcamara, C. B. * Steigender Nachtschatten / Bittersüß / Alprancken. Dulcamara, Dod. Dulcis amara, Trag. Amara dulcis, Tab. Vitis sylvestris, Matth. Circæa Monspeliensium, Lob.

Solanum tuberosum esculentum, C. B. Nachtschatten mit knolligen rohten wurzeln zur Speise dienlich/Holländische Zartuffeln/quo nomine tamen etiam designantur Tubera terræ, ab Italis in fummis habita deliciis. Neque confundi debent hæ radices cum radicibus Helianthemi Indici tuberosi, de quo supra. Papas Peruanorum, Eyft. Descriptionem & figuram vide in Prodr. & Matth. C. B. itemque apud P. Laurembergium Appar. Plant. lib II. c. IV. quæ tamen icon, exceptis radicibus, male congruit.

Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli, C. B. Rundgestreifte weiche Tollapffel. Poma amoris, Lob. Tab. Eyft. Aurea mala, Dod.

Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro, C. B. Rundgestreifte harte Tollapffel. *Solanum pomiferum*, Lob. Tab. Eyft. Mala Æthiopica, Dod.

Solanum peregrinum fructu rotundo, C. B. Glattrunde Tolläpfel. *Hyoscyamus peregrinus Dalechampii*, Lugd.

Solanum pomiferum fructu oblongo, C. B. Längliche Tolläpfel. *Mala infama*, Frag. Dod. Tab. *Melongena*, Matth. Lob. *Melanzana fructu pallido*, Eyst.

Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore, C. B. Stramonie mit stachelichten runden äpfeln. *Solanum spinosum*, Tab. *Stramonia*, Dod. Eyst. *Stramonium peregrinum*, Lob. *Nux metella*, Matth.

Solanum fatidum pomo spinoso oblongo, C. B. Stramonie mit stachelichen langen äpfeln. *Tatula*, Cam. hor. *Datura Turcarum*, Eyst. *Nuci metellæ congener*, Cam. ep.

Solanum fatidum pomo spinoso rotundo semine pallido, C. B. Stramonie mit stachelichen rundē äpfeln. *Datura Ægyptiaca flore pleno*, Pon. Ital. *Stamonia Ægyptiaca flore gemino*, du Bry.

Solanum Ægyptiacum flore pleno, C. B. Ægyptische Stramonie mit gefüllten blumen. *Stramonia Ægyptiaca flore pleno*, du Bry.

Solanum Mexiocanum flore magno, C. B. Mexicanischer Nachtschatten. *Viola Peruviana*, Tab. *Admirabilis Peruviana*, Clus. *Magnæ admirationis herba*, Lob. *Jasminum Indicum seu flos mirabilis Peruanus*, Eyst.

Solanifolia Circea dicta major, C. B. * *Circæa*.
Cir-

Circæa, Eyst. Circæa Lutetiana, Lob. Herba D. Stephani, Tab. Lappa sylvestris, Trag.

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus, C. B.* Krauser Hasenfohl. *Sonchus asper*, Tab. aspera, Matth. *levis tenerior latifolia*, Lob.

Sonchus lævis laciniatus latifolius, C. B.* Glatzer Hasenfohl. *Sonchus lævis*, Matth. Dod. *lævis vulgaris foliis laciniatis dentis leonis*, Lob. *lævis alter flore luteo, & tertius flore niveo*, Tab.

Sonchus Africanus. Africanischer Hasenfohl. *Sonchus Mauritanicus*, Horti Patavini.

Soncho affinis Lampsana domestica, C. B.* Hasenfohl Lampsana genannt. *Sonchus sylvestris primus*, Tab. Lampsana, Lob. Dod.

Sorbus sativa, C. B. Sperberbaum. *Sorbus* Trag. Dod. Lon. Tab. domestica, Matth. Lob. legitima, Clus. esculenta, Cam. Fructus si mitescunt, edules fiunt mespilorum instar, & nominantur Spöräpfel / Speyerlinge.

Sorbus sylvestris folijs domestica similis, C. B.* Ebereschen / Quizenbaum. *Sorbus sylvestris*, Matth. Tab. sylvestris alpina, Lob. aucuparia, Clus. Ornus, Dod. Fraxinea arbor, Trag. In baccis maxima spes aucupibus posita est.

Sparganium ramosum, C. B.* Zgelsknospen mit ästen. Sparganium, Trag. Matth. Tab. Eyst. & Butomos Theophrasti, Lob. Platanaria, Dod.

Sparganium non ramosum, C. B.* Zgelsknospē
ohn

ohn äſte. Sparganium alterum, Lob. Tab. Platana-
ria altera, Dod.

*Spartium arborescens seminibus lenti simili-
bus*, C.B. Spartium. Spartium Hispanicum, Eyst.
Tab. Dioscorideum Narbonense & Hispanicum,
Lob. Genista Hispanica, Matth. Italica, Dod.

Sphondylium vulgare hirsutum, C.B.* *Zeutsch
Bärenflaw*. Sphondylium, Matth. Tab. Spondyli-
um, Lob. Dod. Branca ursina, Trag. & Offic. A-
canthus vulgaris sive Germanica, Fuch.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris, C.
B.* *Werbdistel*. Acanthium, Matth. Dod. Lob.
vulgare, Tab.

*Spiræa sive Frutex spicatus folijs salignis ser-
vatis*, C.B. Spiræa. Spiræa Theophrasti forte,
Clus.

Spongia ramosa, C.B.* aut ei similis, qualem re-
peri innatam trunco pinastri flumine secundo ad-
vecti, & in asseres secandi. Externa facie conve-
nit Conservæ marinæ generi, quod Lobelius Ob-
servat. p. 654. exhibuit. Si quis ad Muscos arbore-
os referre mallet, non repugno.

Pseudostachys alpina, C.B. *Alpen-Salben/
Alpenkraut*. Salvia alpina, Tab. Marrubium mon-
tanum primum, Thal.

Staphis agria, C.B. Trag. Matth. Dod. Lob.
Cam. *Zeusekraut/Meusepfesser*. Pedicularis, Cord.
Apud nos ex semine provenit: in Istria, Dalmatia,
Apulia sponte crescit.

Stœbe major folijs cichoraceis, mollibꝫ lanuginosis, C.B. Stöbe mit Cichorienblettern. *Stœbe major, Tab. Hispanica, Cam. Salmantica major, Lob. Salmantica prima, Clus. Aphyllantes prima, Dod.*

*Stœbe incana tenuifolia. ** Graue Stöbe mit kleinen blettern. An *Stœbe incana Cyano similis tenuifolia, C.B.*

Stœchas purpurea, C.B. Stœchaskraut. *Stœchas, Trag. Matth. Lob. arabica, Cam. brevioribus ligulis, Clus. In floribus, quos Officinæ divendunt, latere semen interdum solet: ex illo fato nobis plantulæ aliquando provenerunt.*

Styrax folio mali cotonei, C.B. Styraxbaum. *Styrax, Matth. Lob. Tab. Cam. Lon.*

*Succisa glabra, C.B. ** Glatter Abbiß. *Succisa, Matth. Dod. Morfus diaboli, Trag. Lob. Tab.*

*Succisa hirsuta, C.B. ** Rauher Abbiß. *Morfus diaboli hirsuta rarior, Ges. hor. Notavi quoque Succisam foliis hirsutam, & caulis parte inferna: Superior vero pars, qua foliis eminebat, glabra erat.*

*Symphytum Consolida major, C.B. ** Wallwurz, Schwarzwurz / Beinwelle. *Symphytum majus, Matth. Tab. magnum, Dod. alum seu Alus, Lob. Consolida major, Trag. Flos est purpureus, aut albus, aut pallide luteus: unde tres figuræ apud Eyst.*

Symphytum minus Borruginis facie, C.B. Bor-

ragen Wallwurz. *Symphytum pumilum repens* Borraginis facie, Lob. Borraginis altera species, Dod. Borrago minima, Eyst.

Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia, C. B. Zungenkraut / Fleckig Zungenkraut. *Symphytum maculosum*, Dod. *Pulmonaria maculosa*, Lob. Tab. Eyst. altera, Matth. vulgaris maculoso folio, Clus.

Syringa alba, C. B. Weiße Syringe. *Syringa*, Dod. alba, Tab. Italica, Lob. Eyst. Frutex coronarius, Clus.

Syringa carulea, C. B. Blaue Syringe / Spanischer Glieder. *Syringa Lusitanica*, Tab. cærulea Lusitanica, Lob. Eyst. flore cæruleo, Clus. Lillach, Dod. Lilac, Matth.

Tamarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica, C. B. Tamarisfen. *Tamarix*, Dod. Tab. *Tamariscus Germanica*, Lob. *Myrica sylvestris sive Tamarix*, Matth.

*Tanacetum vulgare luteum, C. B. ** Gemeine Rheinfarn. *Tanacetum*, Matth. Dod. vulgare, Trag. Eyst. millefolii foliis, Lob. *Artemisia Dioscoridis*, Tab.

Tanacetum folijs crispis, C. B. Krause Rheinfarn. *Tanacetum crispum*, Dod. cristatum Anglicum, Lob. Eyst. *Artemisia sativa Anglica*, Tab.

Tanacetum sive Flos Africanus major flore pleno, C. B. Grosse Africanische Rheinfarn (vulgo Sammetblumen) mit vollen blumen. Flos Afri-

Africanus major aureus multiflorus, Tab. Caryophyllus Indicus major, Matth. Eyst. Othonna major polyanthos, Lob.

Tanacetum Africanum majus simplici flore, C. B. Grosse Africanische Rheinfarn mit einfachen blumen. Flos Africanus simplici flore, Tab. Lob. ic.

Tanacetum Africanum seu Flos Africanus minor, C. B. Kleine Africanische Rheinfarn. Flos Africanus, Lob. minor flore simplici & pleno, Tab. Caryophyllus Indicus minor, Matth. Variat colore luteo toto, & luteo rubescente.

Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso, C. B. Rheinfarn mit hohlen blumen. Caryophyllus Mexicanus fistuloso flore, Column.

Taxus, C. B. * Eibenbaum. Matth. Dod. Lob. Cam. Lon. & plerisque aliis. Nascitur frequens in sylvis circa Linum. Viret perpetuo fronde, fert baccas rubras: nec est tam venenata apud nos, quemadmodum antiqui prodiderunt.

Telephium vulgare, C. B. * & Clus. Gemein Knabenkraut. Telephium, Matth. Lob. Tab. alterum sive Crassula, Dod. Faba inversa, Lob. ic. Fabaria, Off.

Telephium purpureū majus, C. B. Knabenkraut mit purpurblumē. Telephium floribus purpureis, Tab. Lob. ic. Cam. ep. quintū purpureo flore, Clus.

Telephium repens folio non deciduo, C. B. Kriechend Knabenkraut. Telephium Imperati, Cam. septimum, Clus. Te-

Terebintbus vulgaris, C.B. Terpenthinbaum.
Terebinthus, Matth. Dod. Clus. Lob. Tab. Lon.

Teucrium, C.B. Lob. Eyf. *Teucrium*. *Teucrium primum*, Tab. *secundum*, Matth. vulgare fruticans, Clus. *Chamædrys altera seu assurgens*, Dod.

Teucrium peregrinum folio sinuoso, C.B. Spanisch *Teucrium*. *Teucrium Boeticum*, Tab. fruticans *Boeticum*, Clus.

Thalictrum majus filiqua angulosa aut striata, C.B. * *Grosse Wiesenraute* mit eckigen schoten. *Thalictrum flore albo aut incarnato*, Eyf. *Thalictrum pratense primum vel quintum*, Clus. *magnum*, nonnullis *Pseudorhabarbarum* ob radicis luteum colorem, Dod. *Ruta pratensis herbariorum*, Lob.

Thalictrum majus flavum staminibus luteis, vel glauco folio, C. B. * *Grosse Wiesenraute* mit gelben zäseln an der blumen. *Thalictrum majus tertium*, Dod. *primum vel Hispanicum*, Clus. *Ruta pratensis major quarta*, Tab.

Thalictrum minus, C. B. * *Kleine Wiesenraute*. *Thalictrum tenuifolium*, Lob. *Thalictrum minus*, Dod. *septimum*, Clus. *Ruta pratensis minor*, Tab.

Thlaspi arvense filiquis latis, C. B. * *Wilder Baurfensff* mit grauen blettern. *Thlaspi primum*, Matth. *alterum*, Dod. *vulgatissimum vaccariæ folio*, Lob.

Thla-

Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio, C. B. Geschirmiter Baursenff aus Creta. *Thlaspi Creticum*, Tab. quartum, Matth. Candia umbellatum Iberidis folio, Lob. Cappadocium flore incarnato, & flore albo, Eyst.

Thlaspi Creticum flore albo majus, C. B. Großer Cretischer Baursenff mit weissen blumen. Figura extat in Prodr. C. B. Planta est perennis.

Thlaspi montanum incanum luteum serpylli folio majus, C. B.* Berg Baursenff mit gelben blumen. *Thlaspi supinum luteum*, Lob. ic.

Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium & majus, C. B. Baursenff mit gedoppelten schülden der grosse. *Thlaspi clypeatum*, Clus. minus clypeatum primum, Tab. parvum hieracifolium, live *Lunaria lutea Monspeliensium*, Lob.

Thlaspi biscutatum asperum minus, C. B. Baursenff mit doppelten schülden der kleine. *Jon-draba alyssoides Apula spicata*, Column.

Thlaspi fruticosum Leucoij folio angustifolium, C. B. Baursenff mit schmalen Leucojenblättern. *Thlaspi fruticosum folio Leucoij marini minoris*, Lob. Tab. semper virens, Cam.

Thlaspi fruticosum incanum, C. B.* Grauer staudiger Baursenff. *Thlaspi incanum Mechliniense*, Lob. Clus.

Thya Theophrasti, C. B. Baum des lebens. *Arbor vita*, Dod. Clus. Tab. Eyst. *Cedrus Lycia*, Lob. In pago Schwant in Horto Nobil. Dn. Georg.

V Vilhelmi de Redern egregia visitur arbor Thya, quæ per multos jam annos ibi habetur, & fructus quoque profert. Caudex tribus spithamis cingitur, & altitudine XXIV. pedes æquat. Hyeme nullo opus habet tegmine. Ramorum compages in formam pyramidalem acuminatur.

Thymelææ affinis facie externa, C. B. Steinrößlein. Cneoron, Matth. cap. de Cinam. Cneorum Matthioli, Clus. Cam.

Thymus vulgaris folio tenuiore, C. B. & Eyst. Thymian. Thymus, Trag. Fuch. Lon. Serpyllum hortense, Dod. ic.

Tilia fœmina folio majore, C. B. * Lindenbaum. Tilia, Dod. fœmina, Matth. Lob. Tab. fativa, Trag. Flores medicinales sunt, & materies serinariis valde expetita.

Tilia fœmina folio minore, C. B. * Steinlinde. Tilia sylvestris, Trag. minor, Ges. hor. Per omnia minor est, & fronde nigriore.

Tithymalus Characias amygdaloides, C. B. * & Lob. Wolffsmilch mit Mandelblettern. Tithymalus characias primus, sive mas, Dod. amygdaloides, & amygdaloides latifolius, Tab.

Tithymalus helioscopius, C. B. * Matth. Lob. Dod. Tab. Sonnenwendige Wolffsmilch. Esula vulgaris & tertia, Trag. Noster foliis est crenatis, sed non usque ad caulem.

Tithymalus cyparissias, C. B. * Matth. Dod. Lob. Tab. Cypressen Wolffsmilch, Tithymalus

lus cupressinus, sive humipinus, Lob. ic.

Tithymalus folijs pini, C.B. * Wolffsmilch mit
Tichtenblettern. *Tithymalus cupressinus* secun-
dus, Tab. Esula, Off. minor, Dod. vulgaris major
& 5. Trag. Pityusa sive Pinea, Lob.

Tithymalus palustris fruticosus, C. B. * Stau-
dige Wolffsmilch. Esula major, Dod. major Ger-
manica, Lob. major & secunda, Trag.

Tormentilla sylvestris, C.B. * Tormentille. Tor-
mentilla, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Eyft. Hep-
taphyllum, Fuch.

Trachelium Americanum flore rubro oblongo.
Cardinalsblume. Flos Cardinalicius sive Trache-
lium Indicum, Hort. Patav. *Trachelium Americanum*
flore rubro, Ferrar. *Planta Cardinalis*, Hort. Paris.

Tragopogon pratense luteum majus, C. B. *
Grosser Bocksbart mit gelben blumen. Tragopo-
gon, Matth. Dod. luteum, Lob. Tab. flore luteo,
Eyft. *Barbula hirci*, Trag.

Tragopogon gramineo folio radice villosa, C.B. *
Bocksbart mit grasblettern. *Barbula hirci*
minor, Tab.

Tragopogon purpureoceruleum porri folio, quod
artifi vulgo, C.B. Bocksbart mit purpurblawē blu-
men. Tragopogon, Lob. alterum, Matth. hortense,
Dod. desc. purpureum, Eyft. purpureocerulea, Tab.
Des Salsifix, Gallorum. Hortulanis nostris voca-
tur Haberwurß/ quoniam radices lactescentes cu-
linæ inferunt, quæ his perinde, ut radicibus petro-
se.

selini, pro condiendis cibariis utitur, præmissa tamen in aqua calida maceratione.

Tribulus aquaticus, C. B.* Trag. Matth. Dod. Lon. Lob. Wassernüsse. *Tribulus aquaticus* major, Clus. pan. lacustris, Cord.

Tribulus terrestris Ciceris folio fructu aculeato, C. B. Burzeldorn. *Tribulus terrestris*, Matth. Dod. Lob. Clus.

Trichomanes sive Polytrichum officinarum, C. B.* Steinfeder / Mairfarn. *Trichomanes*, Trag. Matth. Fuch. Dod. Lob. Cam. mas, Tab.

Trifolium bitumen redolens, C. B. Harzkie. *Trifolium bituminosum*, Dod. Tab. Eyst. asphaltum, Matth. Lob.

Trifolium palustre, C. B.* Dod. Eyst. Sumpfsoder Biberkie. *Trifolium paludosum*, Lob. majus & fibrinum, Tab. Limonium pratense, Trag.

Trifolium Americanum folio oblongo. Americanisch Klee mit länglichen blettern. *Trifolium Americanum spicatum*, Hort. Patav.

Trifolium pratense purpureum, C. B.* & Trag. Brauner Wiesenkie. *Trifolium pratense*, Matth. Dod. Lob. Floris color interdum pallidior.

Trifolium pratense album, C. B.* & Fuch. Weisser Wiesenkie. *Trifolium pratense alterum*, Trag. Matth. majus primum, Clus.

Trifolium pratense luteum capitulo brevior. C. B.* Gelber Wiesenkie. *Trifolium pratense luteum*, Fuch. Cam. arvense, Tab. Lotus sylve-

vestris, Lon. Meliloti exigua species prima, vel sexta, Trag.

Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, C. B. * Hopffenflee. *Trifolium agrarium*, Dod. luteum minimum, Lob. lupulinum, quibusdam.

Trifolium pratense minus flosculis purpureis, C. B. * Klein brauner Wiesenflee. *Lotus pratensis purpurea*, Lugd. Folia modo terna habet, modo quaterna, & tunc vernacule Bierblettriger Klee nominatur.

Trifolium montanum spica longissima rubente, C. B. Bergflee mit langer rohter ähre. *Lagopus major*, Eyft. major alter, Dod. altera folio pinna-to, Lob.

Trifolium montanum angustissimum spicatum, C. B. Gedährter Bergflee mit sehr schmallen blet-tern. *Lagopus altera angustifolia*, Lob. ic. *Trifolium alopecuroides* quorundam.

Trifolium arvense humile spicatum, C. B. * Hasenflee/Hasenpfötlein. *Lagopus*, Off. sive *Pes leporinus*, Matth. Dod. Lob. *Lagopodium primum*, Tab.

Trifolium cochleatum maritimum tomentosum, C. B. Wolliger Schneckenflee. *Medica marina*, Tab. Clus. Cam. Adv. Lob. ic.

Trifolium cochleatum fructu nigro hispido, C. B. Schneckenflee mit schwarzer borstiger frucht. *Trifolium cochleatum alterum*, Dod. *Medica folliculo spinoso*, Lob.



Tri-

*Trifolium seu Medica capsulis tornatis spinosis, & non spinosis: capsulis orbiculatis seu cochleatis compressis: capsulis scutellatis: capsulis do-
liatis exsculptis, spinosis, non spinosis: capsulis compressis echinatis: capsulis muricatis sive uncinatis.*

Trifolium echinatum arvense, C.B. Zgelsklee. Medica pusilla, Cam. Tribulus terrestris minor repens, Lugd.

Trifolium acetosum vulgare, C.B. Saurklee. Trifolium acetosum, Matth. Dod. flore albo, Eysl. Acetosella, Off. Oxys alba, Tab. Oxis quorundam, Lob. Oxytriphylon, Trag.*

Trifolium hepaticum flore simplici, C.B. Leberklee/ Edel Leberkraut. Trifolium aureum, Dod. Hepatica aurea, Tab. Hepaticum trifolium, Lob. Epatica nobilis, Off. Trinitas, Matth. Adest flore caruleo, & flore subpurpureo.*

Trifolium hepaticum flore pleno, C.B. Leberklee mit gefüllten blumen. Hepatica trifolia polyanthos, Lob. caruleo pleno flore, Clus. aurea multiflora, Tab. aurea flore pleno & caruleo, Eysl.

Triticum hybernum aristis carens, C.B. Weiz. Triticum, Dod. Tab. Tritici primum genus, Trag. Siligo spica mutica, Lob. Apud nos in terra non hybernat semen, sed solet verno tempore feri, ut circa finem aestatis ad maturitatem perveniat.

Tri-

Triticum spica multiplici, C. B. Traubelweize.
Triticum ramosum, Plin. racemosum, Portæ. mul-
 tiplici spica, Lob. ic. typhinum multiplici spica,
 Tab. Spicis turgēt lenis, aut octonis: Matthiolus
 vero XXIV. spicas à se visas scriptitat.

Tubera cervina, C. B. * Hirschwan/ Hirsch-
 brunst. Fungus cervinus sive Cerviboletus, Matth.
 germ. Lon. Boleti cervini orbiculati, Thal. Fi-
 guram habet Joann. Bauhinus, lib. XL. p. 851.

Tulipa præcox lutea, C. B. Gelbe Frühtulpe.
Tulipa præcox flava, Clus. Lilionarcissus luteus,
 Lob.

Tulipa præcox rubra, C. B. Rote Frühtulpe.
Tulipa, Dod. Narcissus quintus, Matth. Lilionar-
 cissus sanguineus puniceusve, Lob.

Tulipa præcox purpurea, C. B. & Clus. Pur-
 purne Frühtulpe. Lilionarcissus purpureus, Lob.
Tulipa purpurea calice pallescente, Eyf.

Tulipa præcox alba, C. B. & Clus. Weiße Früh-
 tulpe. Lilionarcissus niveus, Lob.

Tulipa præcox lutea varia, C. B. Gelbgemen-
 gete Frühtulpe. Et ejus quidem aliquot varieta-
 tes, cum primis ex Eyf. Tulipa lutea lituris aure-
 is, & lituris miniatis, & maculis rubens.

Tulipa præcox rubra varia, C. B. & Clus. cum
 aliquot vartetatibus. Rotgemengete Frühtulpe et
 licher arten.

Tulipa præcox purpurea varia, C. B. & Clus.
 Purpurgemengete Frühtulpe. Inter ceteras

hujus varietates adest quoque, quæ proxime accedit ad Tulipam miniatam linea viridi, Eyft.

Tulipa præcox alba varia, C. B. & Clus. Weißgemengete Früh-tulpe/cum nonnullis varietatibus, cujusmodi speciatim ex Eyft. sunt: Tulipa candida lineis viridibus, Tulipa alba maculis roseis, Tulipa albicans maculis latis rubentibus, Tulipa alba marginibus rubescens.

Tulipa serotina lutea, C. B. Gelbe Spät-Tulipe. Tulipa serotina flava, Clus. sive Lilionarcissus luteus latifolius obtusus phœniceis rubentibus oris, Lob.

Tulipa serotina rubra, C. B. & Clus. Rote Spättulpe. Floris color valde saturatus, ungues flavi, apices cum pediculis nigri.

Tulipa serotina coccinea, C. B. Scharlach-ne Spät-Tulpe. Tulipa coccinea albescentibus oris, Eyft.

Tulipa serotina alba, C. B. Weiße Spät-Tulpe. Referantur ad hanc quoque nonnullæ varietates, & ex Eyft. quidem: Tulipa albicans margine coccineo, Tulipa albicans ex flavo purpureo, Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.

Tulipa serotina ramosa major, C. B. Spättulpe mit Ästen. Tulipa serotina polyclades major, Clus. polyanthos, Eyft. Floris color in nostra est purpureus.

Tulipa serotina flore pleno, C. B. Spättulpe mit gefüllter blume. Tulipa serotina flore pleno,

exaurantio & viridi colore mixto: folia in flore LX. superiori anno numerabantur, adeo ut ob plenitudinem flos integre se explicare vix posset.

Tulipa dubia major & media, C. B. atq; Clus. cum aliquot varietatibus. Zweifelhaffte Tulpe die grosse und mitlere/mit etlichen verendrungen.

Tulipa pumilio latifolia alba, C. B. Breitblettrige Zwercft. die weisse. *Tulipa pumilio alba* unguib9 luteis, Eyst. Tulipē hæ ob caulē brevē pumiliones sive nanæ dicuntur, licet flos ipsis magn9 sit.

Tulipa pumilio latifolia rubra, C. B. Breitblettrige Zwercftulpe die rohte. *Tulipa pumilio*, Lob. ic. *dubia pumilio*, Clus.

Tulipa minor lutea Italica, C. B. Kleine Welsche Tulpe mit gelben blumen. *Tulipa Italica prima*, Tab. Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. Bononiensis luteus, Lob. Tulipæ minores ratione parvi floris nominatur: etsi caule satis longo donatę sint.

Tulipa bombycina Cretica, C. B. Seidene Tulipe / quoniam bulbus ipsi tomentosus, & foliorum oræ. *Tulipa bombycina* flore rubro, Rob. Swert. Bry. *Tulipa de Alepo*, Cl. V. Leonhardi Urfini Botanici Academix Lipsiensis, qui ipsam programmata anno 1661. impresso descripsit.

Tulipa variegata Persica, C. B. Persische Tulpe. *Tulipa Persica*, Eyst. *Persica minor altera*, Clus. cur. post. Hujus bulbus cum in terram alte descendat, supposita testa opus habet.

Ad hæc ipsa nomina reduci possunt, si qua

varietates superant, cum in hac planta miris modis Natura etiam apud nos luxuriet. Ad Gallicas autem atque Belgicas Tuliparum nomenclaturas quod attinet, quamvis ratio illas imponendi rejicienda prorsus non sit, doctioribus tamen minus probatur. Profecto teri viam hanc à nullo rei herbariæ classico auctore memini: estque præterea ea ipsa lubrica & inconstans, cum ad insomnia cujusvis hortulani idiotæ mutet. Adde quod sit absque insigni utilitate difficilis, cum careat hætenus scripta methodo, & appellationes illæ ex nuda inspectione, perinde ut characteres elementorum discantur, sola traditione servandæ. Ne quid tamen hac parte etiam desideretur, agedum nomina illa hic apponemus.

Achat Blanc.	Admiral Rintjes.
Achat rubin.	Admiral Liffen.
Admiral Boggart.	Admiral Lyon.
Admiral van der Eyf.	Admiral de Mann.
Admiral van Engeland.	Admiral Mierlander.
Admiral van Enkhuyzen	Admiral Opdam.
Admiral de Franze.	Admiral Pelegrim.
Admiral de Grot.	Admiral de Ryp.
Admiral van Holland.	Admiral Spiegel.
Admiral van Hoorn.	Admiral Sunfer.
Admiral Jacot.	Admiral van Weynen.
Admiral van der Ruyp.	Africaner.
Admiral Krienken.	Amours.

Angelier mit blauëgrund Donville.	
Anvers.	Doree.
Argos.	Dorothea d'Hollande.
Bel Brüssel.	Duc de Florenz.
Bel Gabriel.	Eselusius.
Belle Zaucke.	Elzevier.
Belle Princesse.	Fama.
Belvidere.	Festus.
Beste Besta.	Ferdinandus.
Beste gemarmelte.	Gebießde Korenhart.
Bitter.	Gebießde Pottebacker.
Biscuit-backer.	Gebigarirte Branson.
Bloedroden Branson.	Geel en rood van zenden.
Blenborger.	Geel en rood de Mester.
Böhmische Kron.	Geel met rood boden.
Brandenburger.	Geele Kroon.
Brabantson.	Gelder.
Breunpurpur.	Gemarmelte Goyer.
Buseloo.	Gemarmelte van der Enk
Cammelot Kromhout.	Generalissimo.
Cam. van der schuren.	General Catlein.
Cardinal Richelieu.	General Korenhart.
Carols.	General Dufk.
Catelande.	General van Engeland.
Cedonulli.	General van Holland.
Centen.	General de Mann.
Darius.	General Nieuwlander.
Diana.	General Rector.
Donckervolck.	General Rotgans.

General Sunmende.	Incarnadin geboord.
Gevlamde Branson.	Zoncker.
Gevlamee Duyk.	Juno.
Gevlamde Goudenlakte.	Jupiter.
Gevlamde Pottelbacker.	Ristemaker.
Gevlamde Purper.	Klein geplumasirte.
Gevleugelde Korenhart.	Kroon Konal.
Goliath.	Lakk Korenhart.
Gouda.	Lakk Francois.
Grijseline.	Lakk Broege.
Grote geplumasirte.	Lakk van Rhyn.
Grote Hollander.	Late Blyenborger.
Grote Standart.	Landschap van Vol.
Grote Zamerlan.	Latur.
Grumbergenaer.	Le Grand.
Hagenaer.	Marcus Aurelius.
Hector.	Marchand.
Hercles.	Marmer van Harlas.
Hirschhorn.	Marmer Jaspee.
Hoe langer hoe liever.	May de Prinze.
Hugenot.	Memorable.
Jacot.	Melkemmer.
Jan Versen.	Morgenstern.
Jan Simonsen.	Mercure.
Jaspe Sara.	Morveille van Quakel.
Jerry.	Meterman.
Jerry na-by.	Molsuick.
Incarnat Weerschyn.	Morlyon Vol.
Inc. met witte grond.	Nette Branson.

Non

Nonfuit.	Prinz Wallis.
Occidentale.	Prinz Robbert.
Orange.	Purper met geele plekke.
Orlande.	Kattebeet.
Oudenaarde.	Kaveschof.
Pallas.	Kieſwieker.
Palto pio.	Koermonder.
Paragon d' Arragon.	Kood en geel gevlamd.
Paragon Claermont.	Kood met geele ruggen.
Paragon Florison.	Kosemunda.
Paragon Grebber.	Kon de Portugal.
Paragon Liſſen.	Saint Pierre.
Paragon Mahu.	Sanbloom.
Paragon Molin.	Sanbloem Koning.
Paragon Nieuwerde.	Scipio Africanus.
Paragon Prior.	Schilder.
Paragon Velsen.	Semper Augustus.
Paragon Vigeboom.	Silvern ſaken.
Pareil.	Silvern Goudenſaken.
Paſſeport.	Sonnenbloem.
Pas Citadelle.	Spharamundi.
Pelecan.	Stroogeel met rood.
Pelumpe.	Sulphurgeel met rood.
Persemacker.	Suiſer.
Peers Morlyon.	Suimende Jan Verſen.
Plumage.	Sylbia.
Postilion.	Torlon.
Present.	Tournay.
Present Liſſens.	Tournay van dren.
	D 5 Zout

Tournay Kätlein.	Broege Momparsille.
Tournon Morlyon.	Broege geplumasirte.
Venus.	Witte Kroon.
Vice Admiral.	Witte Galiotte.
Viceroy.	Witte Kattebeet.
Violet Rotgans.	Wit en rood Pasport.
Witroep.	Wit en rood boden.
Broege Blyenborger.	Zene-koot.

Tussilago vulgaris, C. B. * Huffleattig. *Tussilago*, Matth. Dod. Lob. Eyf. Fuch. Ungula caballina, Trag. Farfara, aliis.

Typha palustris major, C. B. * Grosse Wasserfolben. *Typha*, Matth. Lob. Tab. aquatica, Trag. aquatica seu *Cestrum morionis*, Dod. Summo capiti flos innascitur lanuginosus, quo ad farciendas mattas atque tegetes utuntur: rustici Schmackedunen nominant.

Typha palustris minor, C. B. * Kleine Wasserfolben. *Typha minor*, Lob. ic. minima, Clus. pan. minor sive *Typhula*, Tab.

Valeriana hortensis, C. B. Garten Baldrian. *Valeriana vera*, Trag. minor, Lob. Eyf. hortensis, Dod. Phu magnum, Matth. ponticum, Tab.

Valeriana sylvestris major, C. B. * Grosser wald Baldrian. *Valeriana vulgaris*, Trag. sylvestris, Lob. Dod. Eyf. prima, Clus. Phu parvum, Matth. vulgare, Tab.

Valeriana palustris minor, C. B. * Kleiner Sumpff Baldrian. *Valeriana minor sylvestris*, Lob.

Lob. minima, Dod. Phu minus, Tab. minimum, Matth.

Valeriana campestris inodora major, C. B. *

Feld Rapünzel. *Valeriana campestris*, Cam. Olus album, Dod. *Lactuca agnina*, Tab. Phu minimum alterum, Lob. Sponte quidem provenit: in hortis tamen culta habitior evadit, vocaturque tunc Garten-Rapünzel. In hortos semel illata ex semine deciduo se propagare solet, sed incommodo proventus tempore: ideoque præstat sationem autumnino instituere, quo hyeme exeunte & sub initium veris ima tenella folia habeantur. In acetariis folia duntaxat esitamus, cum radix exilis sit: contra expetitur radix imprimis Rapunculi esculenti, de quo superius.

Valeriana rubra, C. B. Dod. Tab. Cam. Eyst. Baldrian mit rothen blumen. *Ocymastrum Valerianthos*, Lob.

Valeriana carulea, C. B. Baldrian mit blauen blumen. *Valeriana græca*, Dod. Tab. græca flore cæruleo, Eyst. peregrina, Lob. Cam. *Pseudovaleriana* dici meretur.

Verbascum mas latifolium luteum, C. B. * Wollkraut / Königsferze / Kerzenkraut. *Verbascum mas*, Tab. primum, Matth. latius, Dod. latifolium mas, Eyst. mas & Candela regia, Lob.

Verbascum fœmina flore luteo magno, C. B. * Wollkraut mit grossen gelben blumen. *Verbascum* sive Candela regia, Trag.

Ver-

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascen-
te, C. B. Schwarzlich Wollkraut mit kleinen gel-
ben blumen. *Verbascum nigrum*, Trag. Dod. Tab.
Lob. tertium, Matth. Blattaria Plinii, Eyst.

Verbascum latis Salviae folijs, C. B. Wollkraut
mit Salbenen blettern. *Verbascum Salvifolium*
fruticosum luteo flore, Lob. sylvestre, Matth. Clus.
sylvestre alterum, Dod. *Salvifolium* quorundam.

Verbasculum pratense odoratum, C. B.* Wol-
riechende Schlüsselblumen. *Primula veris*, Matth.
Tab. flavo flore elatior, Clus. majoribus floribus
luteis odoratis, Dod. flore luteo, Eyst. *Primula*
pratensis, Lob. *Herba paralysis vulgaris*, Trag.

*Verbasculum pratense vel sylvaticum inodo-
rum*, C. B.* Schlüsselblumen ohn geruch. *Primula*
veris altera, Matth. pallido flore elatior, Clus. major.
Dod. sylvestris tertia, Tab. *pratensis inodora* lute-
opallida.

Verbasculum sylvarum majus singulari flore,
C. B. Einzele Schlüsselblumen. *Primula sylvarum*,
Lob. *veris minor*, Dod. *veris pallido flore humilis*,
Clus. *veris sylvestris flore pallido*, Eyst. *sylvestris*
secunda, Tab. Flos pallet: & superiori anno nobis
succrevit etiam flore dilute purpureo.

Verbasculum hortense multiplex, C. B. Viele
Schlüsselblumen. *Primula veris Anglicana flore*
pleno, Eyst. *hortensis Anglica flore pleno*, Lob.
multiflora, Tab. *Primulae veris flos multiplex*, Dod.

Verbasculum proliferum, C. B. Schlüssel-
blu-

blumen mit kindern oder nebenblümlein. *Primula veris prolifera*, Tab. flore geminato, Eyst. flore gemino altero alteri innato, Lob.

Verbasculum alpinum umbellatum minus, C. B. Rothe Schlüsselblumen mit dolden. *Primula alpina media*, Tab. veris flore rubro, Clus. veris angustifolia rubra, & alba, Eyst.

Verbena communis ceruleo flore, C. B. * Eisenfraut / Eiserhart. *Verbena recta*, Trag. communis & sacra recta, Lob. *Verbenaca*, Matth. recta, Tab. Dod. vulgaris, Clus.

Veronica mas supina & vulgatissima, C. B. * Liegend Ehrenpreis. *Veronica*, Tab. mas serpens, Dod. vulgaris supina, Clus. major Septentrionalium, Lob.

Veronica spicata angustifolia, C. B. * Aufrecht Ehrenpreis. *Veronica recta prima*, Tab. recta herbariorum, Lob. recta vulgaris major, Clus.

Vicia sativa vulgaris semine nigro, C. B. Saatwicke. *Vicia*, Lon. *Orobis sativus*, & *Vicia major*, Trag. Semen nigricat, & cinerei quoq; coloris est.

Vicia sepium folio rotundiore acuto, C. B. * Zaunwicke. *Vicia*, Dod. Lob. Clus. sylvestris, Lon. *Aphaca*, Matth.

Vicia multiflora, C. B. * Wilde Wicken mit vielen blauen blumen / Vogelwicke. *Aracus*, Tab. *Galega altera vel sylvestris*, Dod.

Vicia segetum cum siliquis plurimis, hirsutis, C. B. * Wilde Wicken mit vielen rauhen scho

schoten/Kroß. *Vicia minima*, Trag. *Cracca minor*, Tab. *Aracus* sive *Cracca minima*, Lob. *Cracca* alterum genus, Dod. Vitium est *Secalis*, & *Hordei*.

Vicia lutea folijs convolvuli minoris, C. B. Gelbe Wicken mit Winden blettern. *Aphaca*, Lob. *Cam. Elatine tertia*, Tab.

Viola lunaria major siliqua rotunda, C. B. Mondviole mit runden schoten. *Viola lunaris prima*, Tab. *latifolia*, Dod. *lunaria Græca*, Lob. *Lunaria Græca annua*, Eyft.

Viola lunaria major siliqua oblonga, C. B. Mondviole mit länglichen schoten. *Viola lunaris secunda*, Tab. *latifolia*, Clus. *Lunaria Græca perennis*, Eyft. *Lunaria Raphanitis*, sive *Bolbonac*, radice rediviva, Lob. ic. Huic flos albus.

Viola martia purpurea flore simplici odoro, C. B. * Wohlriechende Mergviolen. *Viola purpurea*, Matth. *nigra*, Dod. Clus. *martia purpurea*, Tab. *præcox purpurea*, Lob.

Viola martia inodora sylvestris, C. B. * Mergviolen ohn geruch. *Viola canina*, Lon. Trag. Tab. *martia canina*, Eyft. *sylvestris inodora*, Dod. *canina cærulea inodora sylvestris ferotina*, Lob. ic.

Viola martia multiplici flore, C. B. Viele Mergviolen. *Viola flore multiplici*, Dod. *martia purpurea*, Lob. ic. *purpurea multiplex*, Tab. Eyft.

Viola martia erecta purpurea. Aufrechte Violen mit purpurblumen. *Viola arborescens*, Matth.

Matth. Tab. martia arborescens purpurea, C.B. elatior, Clus. erecta flore cæruleo, Eyst.

Viola tricolor erecta, C. B. * Aufrechte Viole mit drehen farben. *Viola asurgens tricolor*, Dod. martia surrectis cauliculis, Lob.

Viola tricolor hortensis repens, C. B. Kriechende Viole mit drehen farben. *Viola tricolor*, Dod. Clus. flammea coloria, Lob. trinitatis prima, Tab. Herba trinitatis, Fuch. Lon. lativa, Trag. Jacea sive Flos trinitatis, Matth. Color floris variat, qui triplex, duplex, simplex interdum, scilicet luteus aut pallidus: magnitudine vero reliquas superat. Quo pertinet Flos trinitatis major violaceus, & major pallidus, Eyst.

Viola bicolor arvensis, C. B. * Acker violen mit zwey farben. *Viola trinitatis minor petraea*, Tab. sylvestris, Lob. ic. Herba trinitatis sylvestris, Trag. Jacea altera, Matth.

Virga aurea latifolia serrata, C. B. Breitblettrig Wundkraut. *Virga aurea*, Cam. ep. altera serrato folio, Lob. ferratis foliis, Tab. margine crenato, Dod.

Virga aurea angustifolia minus serrata, C. B. * Schmalblettrig Wundkraut / Heidnisch Wundkraut. *Virga aurea*, Matth. Dod. Eyst. foliis non ferratis, Cam. ep. aurea Villanovani, Lob. Symphytum petraeum tertium, Tab.

Viscum baccis albis, C. B. * Mistel. *Viscum*, Trag. Matth. Dod. Lob. Tab. Clus. Apud nos in

in quercu, malo, forte etiam aliis arboribus reperitur.

Vitex folijs angustioribus cannabis modo dispositis, C.B. Reuschbaum. Vitex, Trag. Dod five Salix amerina, Matth. Agnus castus, Off. Elæagnon Theophrasti, Lob.

Vitis Idæa folijs oblongis crenatis fructu nigricante, C.B.* Schwarze Heydelbeer / Schwarze Besinge. Vitis Idæa prima, Tab. vulgaris baccis nigris, Clus. Myrtillus, Matth. Vaccinia nigra, Lob.

Vitis Idæa folijs subrotundis non crenatis baccis rubris, C. B.* Rote Heydelbeer. Vitis Idæa rubra, Dod. Cam. ep. buccis foliis, Clus. Vaccinia rubra, Lob. Myrtillus exiguus, Trag.

Vitis vinifera, C.B. Diosc. Lob. Matth. Dod. & exterorum. Weinstock. Hujus differentiarum potissimum ab uvis petuntur, quæ ratione quantitatis, adsunt magnæ vel parvæ, & quidem acinis sparsis vel compactis præditæ: ratione coloris, albæ, virides, fulvæ, rubentes & nigricantes. Constituantur autem vulgo duo quasi summa genera, Blancker und rohter Wein. Prioris species potissimæ apud nos hæ sunt: Schönadel / Muscateller / Blanck = Welsch / Retsahl / Mittel = Fränkisch / Groß = Fränkisch / Klein = Fränkisch / Adel = Fränkisch / Grün = Fränkisch / Elbling / Blanckheurnisch / Rüssling / Lamperts / Weidling / Grün Weidling. Posterioris vero sequentes: Rote Muscateller / Rote Welsch / Genser oder Rote Schön.

Schönadel/ Roht Terminer/ Schiel Terminer/
Wiener/ Klebroht/ Ungrisch Leibfarb/ Roht Heu-
nisch/ Hartroht/ Ziegelfarbe/ Gemein roht/ Fett-
roht/ Schleeroht/ Zottelroht.

Vitis vinifera apyrena. Corinthen/ Weintrau-
ben ohn förner. *Vitis Corinthia* & *apyrina*, Lob.
Adv. *Uvæ passæ Indicæ gigartis carêtes*, C.B. *Uvæ*,
sine vinaceis seu apyrenæ, add. Clus. cur. post. Ab
hac diversa est *Vitis agygartos*, Cam, cui vulgare
nomen Elbertrauben.

Vitis Americana quinquefolia. Fünffblettri-
ger Weinstock aus America. *Vitis Virginiana*, C.
B. & *Vitedera Virginiana*, Hort. Hafn. & Græ-
ning. *Ramulorum plerique quina*, pauci terna
promunt folia.

Vitis Americana folio juglandis. Americani-
scher Weinstock mit Nußblettern. *Vitis Canaden-
sis*, C.B. & *Vitis Indica trifolia*, Hort. Patav. *Folia*
terna junguntur uno pediculo ad similitudinem
foliorum trifolii aut phaseoli. Eorum quædama
margine integro, alia leviter sinuato donantur.

Ulmus campestris, C.B. * Kuster. *Ulmus*,
Trag. Matth. Dod. Lob. Clus. pruna, Tab. Semi-
na huic foliacea, & gallinis in cibum summopere
expetita: quod si ipsis abundanter vescantur, adeo
interdum pinguescunt, ut inde moriantur.

Urtica urens maxima, C.B. * Grosse Bren-
nessel/ Brandnessel. *Urtica major*, Tab. secunda,
Matth. *urens altera*, Dod. *sylvestris asperior*.

Lob. Crescit etiam caule parum rubente.

Urtica urens minor, C.B. * Kleine Brennessel.

Urtica minor, Tab. tertia, Trag. Matth. urens minima, Dod. minor acrior, Lob.

Urtica urens pilulas ferens, C.B. Welsche Nessel / quibusdam jocosè Spanischer Majoran / ad fallendum incautos, ut specie nominis illusi, naribus ramulū decerptū admoveant. *Urtica prima*, Matth. prima semine lini, Dioisc. Romana, Trag. Eyst. Romana vel mascula, Lob. Tab. Clus. urēs prior, Dod.

Urtica aculeata folijs serratis, C.B. * Hanffnessel, Cannabis sylvestris, Trag. sylvestris spuria altera, Lob. ic. Cannabina alba, Tab.

Urtica aculeata folijs serratis altera, C.B. * Hanffnessel eine ander art. *Urtica mortua quarta*, Dod. poster. Cannabis sylvestris spuria tertia, Lob. ic. Alyssum arvense album, Tab.

Ustilago secalis, C.B. * Roggebrand. *Ustilago*, Trag. Dod. Lon. Lob. secalina, Tab. Hæc, sicut & sequentes binæ, non sunt species, sed stirpium suarum vitia, ex uredine seu rubigine nata.

Ustilago hordei, C.B. * Gerstebrand. *Ustilago hordeacea*, Tab. polystichi, & hordei distichi, Lob. ic.

Ustilago avenæ, C.B. * & Lob. ic. Haberbrand. *Ustilago avenacea*, Tab.

Yucca folijs Aloës, C.B. Zucca. Hiucca, aliorum: *Yucca nova gloriose elata*, Lob. adv. part. alt. *Yucca* ~~radix~~ occidentalis planta, Horti Parisiensis.

Zeoa

Zeopyron seu Triticospeltum, C.B. Speltweizen/Mackende Gerste, Zeopyron, Dod. Lob. Tab. Speltæ species tertia, Trag. Hordeum glabrum, Cord. nudum, Ges. gymnocrithon, Cam.

Ziziphus sativa fructu oblongo. Brustbeerbaum/Zieserlein. Jujubæ, Trag. Tab. Arabum, Lob. majores oblongæ, C.B. Ziziphus, Dod. Clus. Zizipha, Matth.

EXPLICATIO NOTARUM,

Quibus integra citatorum Auctorum nomina designantur.

Adv. Adversaria Penæ.	Clus. Carol. Clusii Historia rariorum.
Alpin. Prosper Alpinus.	
Bremb. Octavius Brem-	Clus. pan. Clusii Historia
batus.	Pannonica.
Brunt. Otho Brunfelsig.	Clus. hisp. Clusii Historia
Bry. Florilegium du	Hispanica.
Bry.	Clus. cur post. Clus. Cu-
C.B. Caspar. Bauhinus.	ræ posteriores.
Jo. B. Joan. Bauhinus.	Colum. Fabius Colu-
Cæsalp. Andr. Cæsalpi-	mna.
nus.	Cord. Valerius Cordus.
Cam. Joach. Camerarii	Diosc. Dioscorides.
Hortus.	Dod. Rembertus Do-
Cam. ep. Camerarii Epi-	donæus:
tome.	Eyst. Basil. Bessleri Hor-
Cast. Castor Durantes	tus Eystetenensis.

EXPLICATIO NOTARUM.

Ferrar. Jo. B. Ferrarius.	Plin. Plinii Historia Naturalis.
Fuch. Leonh. Fuchsi.	
Historia Latina.	Prodr. Caspari Bauhini
Ges. Conradus Gesnerus.	Prodromus.
Lob. Matth. Lobelii Observationes.	Rauv. Leonhardus Rauvolfius.
Lob. ic. Lobelii Icones seorsim cusæ.	Ruell. Joannes Ruellius.
Lon. Adamus Lonicerus.	Suert. Samuel Suertius.
Lugd. Historia generalis Lugduni impressa.	Tab. Tabernæmontani editio Bauhiniana.
Matth. Matthioli Latini editio Bauhiniana.	Thal. Joannes Thalius.
Monar. Nicolaus Monardes.	Trag. Hieronymus Tragugus.
	Vell. Joan. Vesslingius.

INDEX GERMANICUS,

In gratiam Tyronum pro faciliore inquisitione adjunctus: in quo tamen non singulæ Species, sed magnam partem Genera saltem Plantarum Marchicarum recensentur: quin & multa nomina non Germanica, vulgo tamen usitata admiscuntur.

Abbiß. Succisa.	Adelen. Aquilegia.
Abelmosch. Alceæ species.	Ackerflette. Caulis.
Abend Bioten. Hesperis.	Ackermünze. Calamintha.
Abraß. Alii spec.	Ackerzwiebel. Ornithogali spec.
Abutilon. Althææ spec.	Adamsapffel. Mali aurantia spec.
Acacia. Acacia.	Abrause. Abrotanum.
Acarne. Acacia.	

GERMANICUS.

Aegyptisch Mueskraut.	Balaustien. Mali Punicea
Corchorus.	spec.
Uhorn. Acer montanum.	Baldgreiß. Senecio.
Uland/ Ulauntwurz. Hel-	Baldrian. Valeriana.
nium.	Balsamkraut. Balsamina.
Ulandbeer/ Ulsesinge. Gros-	Balsmiste. Mentha spec.
sularia spec.	Bammia. Alcea spec.
Ulatern. Philyca.	Bärdille. Meum.
Alcea. Alcea.	Bärenklau welsch. Acanth.
Upranden. Solani spec.	Bärenklau teutsch. Sphon-
Upraute. Fumaria.	dylum.
Aloe. Aloe.	Bärohren. Sanicula alpina.
Alpen Salbey/ Alpenkraut.	Basilge. Ocimum.
Stachys spec.	Bathengel. Chamædrys.
Ußnach. Apii spec.	Baumbonen. Anagyris.
Androsace. Alfine spec.	Baum des Lebens. Thya.
Andorn. Marrubium.	Baumwolle. Gossypium.
Anemone. Anemone.	Baursenff. Thlaspi.
Aniß. Anisum.	Weinwell. Symphytū maj9.
Angelice. Angelica.	Weißkohl. Beta.
Anthyllis. Anthyllis.	Weißrüben. Beta spec.
Aphodil. Asphodelus.	Benedictenwurz. Caryo-
Aphodil-Elie. Lili spec.	phyllata.
Apffelbaum. Malus.	Berberiß. Berberis.
Apostemkraut. Scabiosa.	Bergmünze. Calamintha
Apricosen. Malus Armeni-	spec.
aca.	Berg Sanickel. Sanicula
Artshocken. Cinara;	montana.
Aschlauch. Porrum.	Beruffkraut. Conyza spec.
Aspe. Populi spec.	Besinge. Vitis Idæa spec.
Attig. Sambuci spec.	Besingkraut. Fragaria.
Augentrost. Eufragia.	Betonte. Betonica.
Aurin wild. Gratiola.	Bettfuß. Clinopodium.
Azedarach. Azedaracus.	Bensfuß. Artemisia.
B Achbungen. Anagallis	Bentkraut. Securigera.
aquatica.	Bilsenkraut. Hyoscyamus.

INDEX

- | | |
|----------------------------------|--|
| Bingelkraut. Mercurialis. | Cardinalsblume. Trachelium Americanum. |
| Binsen. Juncus. | Cardobenedicten. Cnici sp. |
| Bircke. Betula. | Castanie. Castanea. |
| Birnbaum. Pyrus. | Centifolie. Rosa spec. |
| Bischoffshut. Epimedium. | Cepee. Cepæa. |
| Bittersüß. Solani spec. | Cerinthe. Cerinthe. |
| Blasenerbsen. Pisum vesicarium. | Chamænerion. Lysimachia spec. |
| Blaue Distel. Eryngium. | Chermesbaum. Ilicis spec. |
| Bleykraut. Lepidii spec. | Chondrille. Chondrilla. |
| Blumen-rohr. Atundo Indica. | Circæa. Solanifolia. |
| Bocksbart. Tragopogon. | Cistus. Cistus. |
| Bockshorn. Fœnum græcū. | Citrouen. Malus Medica. |
| Bone. Faba. | Citrullen. Anguria. |
| Borrage. Buglossi spec. | Coccinellen Wegegras. Polygoni spec. |
| Brand. Ustilago. | Colocasia. Ari spec. |
| Brandnessel. Urtica urens. | Coriander. Coriandrum. |
| Braunwurz. Scrofularia. | Cornelbaum. Cornus. |
| Brombeern. Rubus. | Cortusa. Saniculæ spec. |
| Brunette. Adonis. | Kreuzbeer. Loniceri. Alni spec. |
| Brustbeerbaum. Ziziphus. | Kreuzblume. Polygala. |
| Bûche. Fagus. | Kreuz-Salben. Salvia spec. |
| Buchwetz. Erysimum cereale. | Kreuzkraut. Senecio. |
| Bucke. Artemisia. | Krupine. Chondrilla spec. |
| Burzeldorn. Tribulus terrestris. | Kypressenbaum. Cupressus. |
| Burzelkraut. Portulaca. | Kypressenkraut. Abrotanum fœmina. |
| Buxbaum. Buxus. | Attelbaum. Palma. |
| Calmus. Acorus. | Dentellaria. Lepidii spec. |
| Canarientkraut. Phalaris. | Diesemkraut. Geranii spec. |
| Caneelbaum. Lauri spec. | |
| Cappern. Capparis. | |

Distel. Anethum.	Enzianelle. Gentianella.
Diptam der falsche. Pseudodictamnus.	Ephew. Hedera arborea.
Diptam der weisse. Dictamnus albus.	Eppich. Apium.
Distel. Carduus.	Erbsen. Pisum.
Dost. Origanum.	Erdartschocken. Helenii sp.
Dotterblume. Caltha sp.	Erdbeer. Fragaria.
Dotterkraut. Erysimum vulgare.	Erdbeer-spinat. Actipl. sp.
Draba. Draba.	Erdrauch. Fumaria.
Dragune. Dracunculus.	Erdsinnenkraut. Phalang.
Draspe. Festuca spec.	Esche. Fraxinus.
Durchwachs. Perfoliata.	Esula Indica. Lapathi sp.
Dürrwurz. Conyza.	Färberbaum. Cotinus.
Dunnen-besing. Rhamni fructus.	Färberrothe. Rubia.
Bereschen. Sorbus.	Farenkraut. Filix.
Eberwurz. Carlina.	Faselen. Phaleolus.
Echium. Echium.	Faulbaum. Alnus nigra.
Edel Leberkraut. Trifolium hepaticum.	Feighonen. Lupinus.
Egelfraut. Nummularia.	Feigenbaum. Ficus.
Ehrenpreis. Veronica.	Feldrapängel. Valerian. sp.
Eibenbaum. Taxus.	Fendel. Foeniculum.
Eiche. Quercus.	Fette Hanne. Telephium.
Eichfaren. Filix querna.	Fenich/Fench. Panicum.
Einbeer. Solani spec.	Fichte. Pinus.
Eisenhütlein. Aconitum.	Fieberkraut. Lyfimachiz spec.
Eisenkraut/Eiserhart. Verbena.	Filzkraut. Cuscuta.
Else/Erle. Alnus.	Fingerkraut. Digitalis.
Endivien. Intybus.	Glack. Linum.
Eugelsüß. Polypodium.	Glackstrauch. Linaria.
Enztan. Gentiana.	Glacksdotter. Sesamum.
	Glieder. Sambucus.
	Gliederschwamm. Fungi spec.
	Glockblume. Iacea.
	Glöckkraut. Persicaria.

INDEX.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Franzosenholz. Lotus Afri- | Goldblume. Chrysanthe- |
| cana. | mum. |
| Frauenmünze. Mentha sp. | Gold-distel. Scolymus. |
| Frauenschue. Helleborina | Gottheil. Brunella. |
| spec. | Gottshülff. Marrubium |
| Frauenspiegel. Onobrychis | album. |
| arvensis. | Gräffinne. Coronopus. |
| Fritillarie. Fritillaria. | Granatenbaum. Malus |
| Fuchsschwanz. Panicum. | Punica. |
| Fühlendes Kraut. Herba | Gras. Gramen. |
| mimosa. | Gras-Isop/Gras-Poley. |
| Fünffinger-Kraut. Quin- | Hyssopifolia. |
| quefolium. | Graselulch. Festuca grami- |
| Gamander. Chamædrys. | nea. |
| Gänseblumen. Bellis syl- | Gratia Dei. Geranii spec. |
| vestris. | Grazede. Gratiola. |
| Gänserich/Gänsekraut. Po- | Grindwurz. Lapathū acutū |
| tentilla. | Guajacum Patavinum. |
| Gartenflee. Lotus hortensis. | Lotus Africana. |
| Garbe. Cumini spec. | Gulden Günsel. Consolida |
| Gauchheil. Anagallis. | media. |
| Geißbart. Barba capræ. | Gulden Lachen. Leucoid sp. |
| Geißblatt. Periclymenum. | Gulden Widertod. Poly- |
| Geißflee. Cytisus. | trichum aureum. |
| Geißraute. Galega. | Gunderman/Gundelrebe. |
| Gelber Btolen. Leucoid sp. | Hedera terrestris. |
| Gelbe Razenpoten. Heli- | Gurken. Cucumis. |
| chrysum. | Gürtelkraut. Musci spec. |
| Gemsenwurz. Doronicum. | Guter Henrich. Lapathi sp. |
| Gerberbaum. Rhus. | Haber. Avena. |
| Gerste. Hordeum. | Haberlulch. Festuca a- |
| Ginst. Genista. | venacea. |
| Glasakraut. Parietaria. | Haberschlehen. Pruni sylv. |
| Gliedkraut. Sideritis. | spec. |
| Glöcklein. Campanula. | Habertwurz. Tragopogi sp. |

GERMANICUS.

Habichtkraut. Hieracium.
 Hagebüche. Ostrya.
 Hagebutten. Rosa spec.
 Hagedorn. Mespili spec.
 Hanefuß. Ranunculus.
 Hanff. Cannabis.
 Harthem. Hyperici spec.
 Hartriegel. Corai spec.
 Haselnüsse. Corylus.
 Haselwurz. Asarum.
 Hasenkohl. Senechus.
 Hasenpfortlein. Trifolii sp.
 Hasenpappeln. Malva sylv.
 Haubechel. Anonis.
 Hauslaub/Hauswurz. Sedum.
 Hederich. Rapistrum.
 Hendelkraut. Alinae spec.
 Herbstrosen. Malva rosea.
 Herzfreude. Asperula.
 Herzgespann. Marrubii sp.
 Heydnisch Wundkraut. Virga aurea spec.
 Hendelkraut. Erica.
 Hendelbeer. Vitis Idæa.
 Hindbeern. Rubus Idæus.
 Hirschbrunst. Tubera cervina.
 Hirschkraut. Libanotis.
 Hirschzunge. Lingua cervina.
 Hirse. Milium.
 Holländische Zartuffeln. Solani spec.
 Hollwurz. Fumarix spec.

Holunder. Sambucus.
 Hopffe. Lupulus.
 Hufeisenkraut. Ferrum equinum.
 Hufslattig. Tussilago.
 Hülst. Ilicis spec.
 Hundszahn. Dens canis.
 Hundszunge. Cynoglossum.
 Hundedrage. Hedera terrestris.
 Hünerbiß. Alinae.
 Hyacinth. Hyacinthus.
 Jakobskraut. Jacobaea.
 Jasmin. Jasminum.
 Jbisch. Althæa.
 Je länger je lieber. Lupini spec.
 Jgelstnospen. Sparganium.
 Jlaub. Hedera arborea.
 Indiantische Feigen. Ficus Indica.
 Indianische Kresse. Nasturtium Indicum.
 Indianischer Pfeffer. Piper Indicum.
 Joannisbeer. Grossularia non spinosa.
 Joannisblut. Polygoni cocciferi grana.
 Joannisbrod. Siliqua edulis.
 Joanniskraut. Hypericum.
 Iris. Iris.
 Isop. Hyssopus.
 Jude. Tucea.

INDEX.

Judasbaum. Siliqua spec.	Ruhweizen. Melampyrum.
Judasohr. Fungi spec.	Rümmel. Cuminum.
Judendorn. Rhamni spec.	Rüribis. Cucurbita.
Judenfirschen. Solani spec.	Ublab Phaeoli spec.
Amillen. Chamamelum	Lachentknolauch. Scor-
Rannentraut.	dium.
Kartendistel. Diplacus.	Lactuke. Lactuca.
Käsepappel. Malva sylve-	Lampfane. Lampfana.
stria.	Lavendel. Lavandula.
Kellersbals. Laureola.	Leberbalsam. Ageratum.
Kerffel. Cezrophylum.	Leberblümlein. Gramen
Ketmia. Olcea arborescens.	Parnassi.
Kerzenkraut. Verbascum.	Leberflee. Trifolium he-
Reuschbaum. Vitex	patium.
Kenferkron. Lillii spec.	Leckrige. Glycyrrhiza.
Kichern. Cicer.	Leindotter. Sesamum.
Kirschen. Cerasus.	Leinkraut. Linaria.
Klapperrosen. Papaverer-	Leucoje. Leucorum.
raticum.	Leuskraut. Staphisagria.
Klebekraut. Aparine.	Liebstockel. Ligusticum.
Klee. Trifolium.	Lilienconvallien. Lilium
Kletten. Lappa.	convallium.
Knabenkraut. Telephium.	Lilie. Lilium.
Knauel. Polygoni spec.	Limonen. Malus limonia.
Knolauch. Allium.	Limonium. Limonium.
Knolauchkraut. Alliaria.	Linde. Tilia.
Knotenkraut. Scrophularia	Linsen. Lens.
Kohl. Brassica.	Linsenbaum. Colutea.
Kölle. Satureja.	Löffel-futteral. Ferrum
Königskerze. Verbascum.	quinum.
Kornblume. Cyanus.	Löffelkraut. Cochlearia.
Kräusenfuß. Coronopus.	Lorbeerbaum. Laurus.
Kresse. Nasturtium.	Lotus. Lotus.
Krusette. Crucjata.	Lotusbaum. Lotus Afri-
Küchenschelle. Puliatilla,	cana.

Löwen-

GERMANICUS.

Löwenmaul. Antirrhinum.	Meserich. Asperula.
Löwenzahn. Dens leonis.	Mespelbaum. Mespilus.
Lulch. Festuca.	Meur. Alnus spec.
Lulchgras. Gramen lolia- ceum.	Meusedorn. Ruscus.
Lungenkraut. Symphyti sp.	Meusepfaffer. Staphisagria.
Lungenmoß. Musci spec.	Meusefchwanz. Holotheo- affinis.
Lychnis. Lychnis.	Mexicanischer Nachtschat- ten. Solani spec.
Majoran. Majorana.	Meyenblümlein. Lilium convallium.
Mandelbaum. Amy- gdalus.	Meyer. Blitum.
Mangolt. Lapathum.	Milchglöcklein. Campanu- la Americana.
Maisblut. Androsmon.	Mistel. Viscum.
Mannstreu. Eryngium.	Mohn. papaver.
Marellen. Malus Arme- niaca.	Mohrenkraut. Æthiopis.
Massholder. Acer cæpestre.	Mohrrüben. pastinaca te- nuitolia.
Maßlieben. Bellis.	Moly. Moly.
Maßlichbaum. Lentiscus.	Momordica. Balsam. mas.
Maßlichkraut. Marum.	Monatrose. Rosa spec.
Maulbeerbaum. Morus.	Mondviole. Viola lunaria.
Maurfarn. Trichomanes.	Mondkraut / Mondraute. Lunaria.
Maurpfaffer. Sedi spec.	Morcheln. Fungi spec.
Meer-polium. Polium ma- ritimum.	Mosß. Muscus.
Meer-portulac. Halimus.	Mottenkraut. Blattaria.
Meerzwiebel. Scilla.	Münchrrhabarbar. Lapathi spec.
Megerkraut. Mollugo.	Münze. Menta.
Meisterwurz. Imperatoria.	Mutterkraut. Matricaria.
Melde. Atriplex.	Myrrhis. Myrrhis.
Melisse. Melissa.	Myrtenbaum. Myrtus.
Melone. Melo.	Myrtendorn. Ruscus.
Melochia. Corchorus.	
Merrettig. Raphani spec.	
Merzviole. Viola Martia.	

INDEX.

- N**abelkraut. Coryledon.
 Nachtschatten. Solanū.
 Nackende Gerste. Zeopyrō.
 Nägelein. Caryophyllus.
 Nagelkraut. Pilosellæ spec.
 Nägeleinwurz. Caryophyllata.
 Narciſſe. Narcissus.
 Natterwurz. Bistorta.
 Nepte. Calaminthæ spec.
 Nessel. Urtica.
 Niesewurz. Helleborus.
 Nigelle. Nigella.
 Noli-me-tangere. Balsaminæ spec.
 Nüsse. Nux juglans.
Ochsenauge. Buphtalmum.
 Ochsenzunge. Buglossum.
 Odermeñige. Eupatorii sp.
 Oelbaum. Olea.
 Oleander. Nerion.
 Orchis. Orchis.
 Orobis. Orobis.
 Osterluzie. Aristolochia.
Papagenfedern. Amarynthi spec.
 Pappelbaum. Populus.
 Pappelkraut. Malva.
 Passionblume. Clematidis spec.
 Pastinack. Pastinaca latifolia.
 Pavo. Anemonæ spec.
 Pechtanne. Picea.
 Pehden. Graminis spec.
 Pergamotten. Pyri spec.
 Perlkraut. Lithospermum.
 Persiantische Lilie. Lilium Persicum.
 Petersilge. Apium.
 S. Peterskraut. Parietaria.
 Petromarula. Rapunculi spec.
 Pfaffenröhrlein. Dens leonis.
 Pfaffenpint. Arum.
 Pfeben oder Peponē. Pepo.
 Pfefferkraut. Lepidium & Satureja.
 Peilkraut. Sagitta.
 Pfenigkraut. Nummularia
 Pfifferling. Fungi spec.
 Pfirsichen. persica.
 Pflaumenbaum. Prunus.
 Pfrimkraut. Genista.
 Piloselle. pilosella.
 Pimpernüsse. pistacia sylvestris.
 Pimpinelle. pimpinella.
 Pistaciē. pistacia peregrina
 Platterbsen. Lathyrus.
 Poeonte. poeonia.
 Posist. Fungi spec.
 Poley. pulegium.
 Polenenmünze. Calaminthæ spec.
 Pomeranzen. Malus aurantia.
 Portulac. portulaca.

GERMANICUS.

Post. Cisti spec.	Rosmarin. Rosmarinus.
Potscherben. Alni nigra spec.	Rossschwanz. Equisetum.
Psyllie. psyllium.	Rothe Rüben. Beta spec.
Pülze. Fungi spec.	Rother Steinbrech. Fili- pendula.
Pyramidal. Rapunculi sp.	Rothe Tanne. picea.
B amoclit. Jasmini spec.	Rübe. Rapa.
Quecken. Gramen caninū.	Rüberettig. Raphanus.
Quendel. Serpyllum.	Ruhrkraut. Gnaphalium.
Quittenbaum. Malus co- tonea.	Ruprechtiskraut. Geranii spec.
Quitzenbaum. Sorbus.	Rüster. Ulmus.
R üde. Lychnis spec.	S affran. Crocus.
Radieß. Raphani spec.	Salben. Salvia.
Rapünzel. Rapunculus.	Salbeyen-Wollkraut. Ver- basci spec.
Raucke. Eruca.	Salben-Scordium. Scor- dii spec.
Rauhbeer. Grossularia sp.	Samkraut. potamogeton.
Raute. Ruta.	Sammetblume. Tanacetū spec.
Reitscher. Fungi spec.	Sand-dorn. Rhamni spec.
Resede. Reseda.	Sanguisorba. pimpinellæ spec.
Rheinblume. Helichrysum	Sanickel. Sanicula.
Rheinfarn. Tanacetum.	Saturey. Satureja.
Rheinweide. Ligustrum.	Saurampff. Acetosa.
Ringelblum. Caltha.	Saurklee. Trifolii spec.
Ritterspor. Consolidida re- galis.	Scabiose. Scabiosa.
Rodel. pedicularis.	Schaffthew. Equisetum.
Rogge. Secale.	Schaffgarbe. Millefolium.
Roggeblume. Cyanus.	Scharbockskraut. Chelido- nia minor.
Rohr. Arundo.	Scharley. Horminum.
Rose. Rosa.	Schallachbaum. ilicis spec.
Rosentwurz. Radix rhodia.	S char-
Rosenpappel. Malva rosea.	
Rosinen. grossularia spec.	

INDEX

- Schartenkraut. Serratula.
 Schelkraut. Chelidonium.
 Schildkraut. Onobrychis.
 Schirling. Cicuta.
 Schirlingkraut. Cicuta-
 ria.
 Schlagkraut. Chamæpitys.
 Schlangenkraut. Dracun-
 culus.
 Schlangenzünglein. Ophi-
 oglossum.
 Schlehen. prunus sylve-
 stris.
 Schlingbaum. Rhus.
 Schlüsselblumen. Verbe-
 riculum.
 Schneeballen. Sambuci sp.
 Schneetropffen. Leucopium
 bulbosum.
 Schneckenklee. Trifolii spec.
 Schnitslauch. porri spec.
 Schwaden. Graminis spec.
 Schwalbenturz. Asclepias
 Schwarzkümmel. Nigella.
 Schwarzwurz. symphytum
 majus.
 Schweinbrod. Cyclamen.
 Schwertel. Gladiolus.
 Scorpionkraut. Scorpoid.
 Scorzonere. scorzonera.
 Scutellarie. Lamii spec.
 Seeblume. Nymphaea.
 Seidelbast. Chamæla.
 Seiffkraut. Saponaria.
 Seleri. Apii spec.
 Senff. Sinapi.
 Senfblatter. Colutea sp.
 Seßban Galega spec.
 Sevenbaum. Sabin.
 Seylwende. Salicis spec.
 Siebenzeit. Loti spec.
 Sichelkraut. Aloes spec.
 Sigmarstrauch. Alcea.
 Sinaw. Alchimilla.
 Singrün. Clematis.
 Sonnenblume. Helenium
 Indicum.
 Sonnentau. Ros folis.
 Sophora. Galega spec.
 Spanischer Glieder. Syrin-
 ga spec.
 Spanischer Hopffe. Origa-
 ni spec.
 Spanisch Majoran. Urri-
 ca spec.
 Spanisch Rohr. Arundinis
 spec.
 Spargen. Asparagus.
 Spartium. Spartium.
 Specklilie. periclymenum.
 Speltweizen. Zeopyron.
 Sperberbaum. Sorbus fat.
 Spenerlinge. sorbi lativæ
 fructus.
 Spergula. Alfine spec.
 Spica. Lavendula spec.
 Spilbaum. Evonymus.
 Spillinge. pruni spec.
 Spinat. Lapathi spec.
 Spinnweb. ledi spec.

Spil

GERMANICUS.

Spiräa. Spiraea.	Zaschekraut. Bursa pastoris.
Sporäpfel. torbi sativa fructus.	Zaube Nessel. Lamium.
Springkörner. Labyrinth.	Zauerbaum. Rhus.
Stabwurz. Strobilium.	Zausendgüldenraut. Centaureum.
Stachelbeer. Grossularia.	Zausendknoten. polygonum.
Stallkraut. Anonis.	Zausendkorn. polygoni sp.
Stechasakraut. Stoechas.	Zausendschön. Amaranth.
Stechende Winde. Smilax aspera.	Zerpethinbaum. Terebint.
Stechpalmen. Illicis spec.	Teucrium. Teucrium.
Stechrüben. Napus.	Teutsch Ingber. Arum.
Steigbönen. phaseoli spec.	Thanne die weisse. Abies.
Steinbrech. Saxifraga.	Thanne die rothe. picea.
Steinfeder. Trichomanes.	Thymian. Thymus.
Steinflee. Melilotus.	Zolläpfel. solani spec.
Steintresse. Coronopi spec.	Tormentille. Tormentilla.
Steinmoß. Lichen petra.	Traubelweize. Triticum spica multiplici.
Steinrößlein. Thymelaea officinis.	Traubenkraut. a Botrys.
Sternkraut. Aster.	Türkische bonē. phaseoli sp.
Störbe. Stoebe.	Türkischer Bund. Lili sp.
Storchschnabel. Geranium.	Tulpe. Tulipa.
Stramonie. solani spec.	V iole. Viola.
Streichkraut. Luteola.	Vogelfuß. Ornithop.
Sinraßbaum. Sytax.	Vogelmilch. Ornithogalū.
Süßholz. Glycyrrhiza.	Vogelneß. pastinaca spec.
Syrinae. Syringa.	W acholder. juniperus.
Syrischer Pappelbaum Aloe spec.	Waldmeister. Asper.
T aback. Nicotiana.	Waldrebe. Clematitis.
Tamarissen. Tamarix.	Walnüsse. Nucis juglandis spec.
Tag und Nacht. parietaria.	Wallstroh. gallium.
Tartuffeln aus Holland. solani spec.	Wallwurz. symphy- tum.

Wiss

INDEX GERMANICUS.

Wasserdoſt. Eupatorium.	Winterblumen. Helichryſ.
Wafferſolb. Typha paluſtr.	Wintergrün. pyrola.
Wafferlilie gelb. acori ſp.	Winter-rapünzel. Valeria-
Waffermerck. Apii ſpec.	na ſpec.
Waffermerck mit längliche	Wirbeldoſt. Clinopodium.
blettern. Sion.	Wirbelkraut. Aſtragalus.
Waffernüſſe. Tribulus a	Wolfsbeer. Solani ſpec.
quaticus.	Wolffsmilch. Tithymalus.
Webediſtel. Spina alba.	Wolgemut. Origanum.
Wegedorn. Rhamnus.	Wollkraut. Verbascum.
Wegegras. polygouum.	Wunderbaum. Ricinus.
Wegerich / Wegebreit.	Wundkraut. Virga aurea.
plantago.	Wundkraut dem Loto ver-
Wegesenſſ. Eryſimū vulg.	wand. Loto affinis.
Wegewart. Cichorium.	WurzelRapünzel. Rapun-
Weide. Salix.	culus eſculentus.
Weidendorn. Rhamni ſp.	Zahnkraut / Zahnwurz.
Weinſtock. Vitis vinifera.	Orobanche.
Weinſtock aus America.	Zapffenkraut. Laurus A-
Vitis Americana.	lexandrina.
Weißdorn. Meſpili ſpec.	Zaunrübe. Bryonia.
Weißwurz. polygonatum.	Zehrwurz. Arum.
Weize. Triticum.	Zeisigkraut. Anagallis ſpec.
Welfamen. Naſturtii ſpec.	Zeitloſen. Colchicum.
Welfche Bonē. phaſcoli ſp.	Ziegenraute. Galega.
Wermuth. Abſinthium.	Zieferlein. Ziziphus.
Wenderich. Lyſimachia.	Ziland. Chamelza.
Wicken. Vicia.	Zuckerrüben. Siſarum.
Wiederſtoß. Lychnis ſpec.	Zuckerschoten. piſi ſpec.
Wiepen. Roſa ſpec.	ZwergRingelblume. Cal-
Wiefenraute. ThaliArum.	hæ ſpec.
Wild Aurin. Gratiola.	Zwerckweide. Salicis ſpec.
Wilder Saſſfran. Cnicus.	Zweyblat. Ophris bifolia.
Winde. Convolvulus.	Zwiebel. Cēpa.
Windröſlein. Anemone.	Zymbelkraut. Cymbalaria.





